



کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس تجربی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخم

مرضیه باقری^۱, محمد امیر کریمی ترشیزی^۲ و محمدجواد رسایی^۳

^{۱-۳}- دانشجویی کارشناسی ارشد و استاد، دانشگاه تربیت مدرس

^۲- دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، (تویسته مسؤول: karimt@modares.ac.ir)

تاریخ دریافت: ۹۳/۰۷/۱۸ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۸/۰۴

چکیده

این تحقیق در دو مرحله با اهداف تولید و استخراج پادتن علیه سه آفلاتوکسین B_1 در زرده تخم بلدرچین تخم گذار و هم‌چنین ارزیابی کارایی مصرف خوراکی پادتن زرده تولید شده در کاهش عوارض آفلاتوکسیکوز تجربی در حال رشد انجام شد. در آزمایش اول IgY ضد آفلاتوکسین B_1 تولید و میزان کاهندگی سه توسط پادتن استخراج شده از زرده ایمن و غیرایمن بررسی شد. در تمامی غلظت‌ها میزان کاهش در زرده ایمن شده علیه آفلاتوکسین B_1 بیشتر از زرده غیرایمن بود ($P < 0.05$). در مرحله دوم تعداد ۱۲۰ قطعه جوجه یکروزه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار، ۵ تکرار و ۶ جوجه در هر قفس مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل ۱- شاهد منفی، تغذیه با دان غیرآلوده، ۲- شاهد مثبت- تغذیه با دان آلوده به دو پی‌پی‌ام آفلاتوکسین B_1 ، ۳- دان آلوده + آب آشامیدنی حاوی $4/4$ درصد زرده دارای ضد آفلاتوکسین B_1 ، ۴- دان آلوده + آب آشامیدنی حاوی $4/4$ درصد زرده ایمن نشده علیه AFB₁ بودند. مصرف جبره آلوده موجب کاهش معنی‌دار پروتئین تام، آلبومین، HDL، تری‌گلیسرید، کلسترول و گلوكز سرم شد. تنها میزان کراتینین سوم در پرنده‌گان گروه شاهد مثبت افزایش نشان داد ($P < 0.05$). مصرف زرده ایمن از ایجاد این تغییرات جلوگیری نمود. پاسخ‌های ایمنی سلولی و همورال پرنده‌گان تحت تاثیر مصرف جبره آلوده کاهش یافت و مصرف زرده ایمن و غیرایمن این تأثیر منفی را تا حد مشابه با گروه شاهد منفی بهبود داد ($P < 0.05$).

واژه‌های کلیدی: آفلاتوکسین B_1 , پادتن، بلدرچین ژاپنی، زرده تخم

مقدمه

گزارش منتشره در سال ۲۰۱۱ مایکوتوكسین‌ها را به عنوان یک مشکل فراگیر در جهان معرفی نمود (۳). خوردن مایکوتوكسین‌ها توسط حیوانات به عوارض پاتولوژیکی از جمله سرکوب سیستم ایمنی منجر می‌شود. آفلاتوکسین B_1 از طریق آسیب به کبد، تحلیل اندام‌های مرتبط با ایمنی و سرکوب ایمنی- سلولی پاسخ ایمنی را تعزیف می‌نماید و به بالا رفتن حساسیت حیوان به عفونتها منجر می‌شود (۹). برای کاستن از آفلاتوکسین‌ها تیمارهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به کار گرفته می‌شوند، البته هیچ کدام از این روش‌ها به طور صدرصد مؤثر و کاربردی نبوده‌اند (۱۰). استفاده از افزودنی‌های جاذب سوم قارچی رایج‌ترین راهبرد عملی در مواجهه با این سوم در مزارع است. جاذبهای می‌توانند ماهیت معدنی (۲۴)، آلی (۱) یا ترکیبی از این دو داشته باشند. اخیراً روش‌های زیستی به خاطر قابلیت استفاده آسان و کم‌هزینه، توجه محققین را جلب کرده است برای مثال برخی از پروبیوتیک‌ها، به درجات متفاوتی اثر کاهندگی سم را نشان داده‌اند (۲). در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، منابع خوراکی مختلف در جاتی از آلودگی به آفلاتوکسین‌ها را دارند و نبودن سیستم کترلی دقیق به همراه محدودیت منابع موجب ورود این سم به چرخه غذایی انسان می‌شود (۱۵).

زرده تخم مرغ سرشار از پادتن‌های پلی‌کلونال است که این پادتن‌ها ایمونوگلوبولین Y (ایمونوگلوبولین زرده^۱ یا IgY) نامیده می‌شوند. استفاده از IgY جهت مقابله یا پیش‌گیری از عوامل بیماری‌زا نظریر سالمونلا (۴) و آنفلوانزای پرنده‌گان (۲۲)،

توسط محققان بررسی شده است. هم‌چنین جهت تشخیص سوموم قارچی مختلف با استفاده از تکنیک الایزا از IgY استفاده شده است (۱۸). با توجه به عدم وجود گزارشی مبنی بر استفاده درمانی یا پیش‌گیرانه از پادتن خوراکی به دست آمده از تخم، در صورتی که مصرف خوراکی IgY ضد AFB_1 در کاستن از جذب یا بروز عوارض سه کارایی داشته باشد استفاده از آن به منظور پیش‌گیری و مقابله با عوارض آفلاتوکسیکوز را می‌توان به فهرست روش‌های زیستی مقابله با مایکوتوكسین‌ها افزود.

مواد و روش‌ها

در بخش اول آزمایش ایمن‌سازی پرنده‌گان تخم گذار با استفاده از کونثوگه آفلاتوکسین B_1 -آلبومن سرم گاوی (AFB_1 -BSA conjugate) (AFC-BSA) انجام شد. تعداد ده قطعه بلدرچین تخم گذار در سن چهار هفتگی با کونثوگه (*Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany*) AFB_1 -BSA ایمن شدند. این تیمار به پنج قطعه بلدرچین مشابه دیگر نیز اعمال شد، با این تفاوت که ماده تزریقی فاقد کونثوگه بود (گروه شاهد). تزریق طی چهار مرحله و به فواصل ده روز و به روش عضلانی در دو نقطه از سینه انجام شد. کونثوگه به ترتیب با 0.2 میلی‌لیتر یاور کامل فروند در تزریق اول و یاور ناقص فروند در تزریقات بعدی همراه بود، تا پاسخ ایمنی مناسب‌تری به دست آید. مقدار تزریق کونثوگه در مراحل اول و دوم $200 \mu\text{g}$ و در مراحل سوم و چهارم $100 \mu\text{g}$ بهازای هر پرنده بود. پس از آخرین ایمن‌سازی، تخم‌های تولیدی هر تیمار طی یک ماه به طور جداگانه جمع‌آوری و در یخچال

IgY و آفلاتوکسین B1 متصل به آن با استفاده از سانتریفیوژ در $\times 10,000$ رسوب داده شد. میزان سه غیرمتصل باقیمانده در مایع روبی پس از استخراج با 50 میکرولیتر کلروفرم به روش کروماتوگرافی نازک لایه و روی صفحات TLC Silica gel 60 F254, Merck, (Silykazil) (Germany) اندازه‌گیری شد (۲). از مatanول 55 درصد از فاز متحرک استفاده شد (۱۱۰). با استفاده از نمودار چگالی^۱ مربوط به لکه‌های سه در قبل و بعد از انکوباسیون میزان کاهش سه آزاد محاسبه شد. از نرم‌افزار Photocapt برای کمک، کردن لکه‌ها استفاده شد.

در بخش دوم آزمایش تعداد ۱۲۰ قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه تهیه شد. جوجه‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی، با چهار گروه آزمایشی و هر گروه با پنج تکرار و در هر واحد آزمایشی شش قطعه جوجه مورد بررسی قرار گرفتند. میزان استفاده از زرده تخمر غیر اساس تحقیق فولتن چهار گرم در لیتر تعیین شد (۱۳). گروه‌های آزمایشی شامل: ۱- شاهد منفی: دان غیرآلوده، ۲- شاهد مثبت: دان آلوده به دو پی‌پی‌ام آفلاتوکسین B₁, ۳- دان آلوده + آب آشامیدنی حاوی ۰/۴ درصد (V/V) زرده دارای IgY ضد آفلاتوکسین B₁, ۴- دان آلوده + آب آشامیدنی حاوی ۰/۴ درصد (V/V) زرده ایمن نشده علیه آفلاتوکسین B₁ بودند. به جیره تیمارهایی که از دان آلوده استفاده می‌کردند ۲۲/۷۳ گرم در کیلوگرم از برنج آلوده به آفلاتوکسین B₁ اضافه شد تا مقدار دو پی‌پی‌ام سه آفلاتوکسین B₁ تأمین شود و به جیره گروه شاهد منفی به همان میزان برنج غیرآلوده اضافه شد. جیره مصرفی نیز به صورت کرامبل پیش‌آغازین ویژه از شرکت چینه تهیه شد. تجزیه شبیهای جیره در جدول ۱ آورده شده است. با استفاده از کیت الایزا عاری بودن دان تهیه شده از آفلاتوکسین B₁ Ridaseen Aflatoxin B1, R-Biopharm, تأیید شد (Germany).

Table 1. Chemical analysis of diets

| Table 1: Chemical analysis |
|----------------------------|
| 31.00 |
| 22 |
| 6 |
| -1.54 |
| 1.4 |
| 1 |
| 1 |
| -1.45 |
| -1.2 |

سیستم اینمی جوچه‌ها استفاده شد. در روز ۲۸ پرورش به تعداد دو قطعه بلدرچین نر موجود در هر واحد آزمایشی مقدار ۱/۰ میلی لیتر از سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفند پنج درصد در بافر فسفات استریل از طریق عضله سینه تزریق شد. هفت روز بعد از تزریق از همان پرنده‌ها از طریق ورید بال خونگیری شد (۳۳،۰۶). جهت اینمان سازی علیه ویروس نیوکاسل در روز ۲۱ به تمام بلدرچین‌های هر واحد آزمایشی مقدار یک دز نیوکاسل (B₁) به صورت قطره چشمی داده شد. سپس ۱۴ روز بعد از اینمان سازی از همان پرنده‌ها از طریق ورید بال

نگهداری شدند. در پایان دوره گردآوری، استخراج IgY طبق روش فولتن و همکاران انجام گرفت (۱۳). به اختصار ابتدا زرده تخم مرغ به طور کامل از سفیده جدا شد و غشای محافظه زرده نیز جدا شد. هم حجم زرده به دست آمده محلول با فر فسفات نمکی افزوده و مخلوط حاصل به مدت سه دقیقه با سرعت بالا در دستگاه مخلوطکن همگن شد و سپس در دمای ۴ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه و با بیبروی در ۱۸۰۰× سانتریفیوز شد. پس از سانتریفیوز لایه میانی حاوی IgY جمع آوری شد.

جهت تولید آفالاتوکسین B₁ از یک ویال استاندارد Aspergillus parasiticus PTCC-5286 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران) استفاده شد. برای تعیین قابلیت زرده ایمن شده در کاهش سم آفالاتوکسین B₁ از محلول سم آفالاتوکسین تولیدی که به روش BF استخراج و تعیین غلظت شده بود، استفاده شد (۲). روش استخراج به اختصار عبارت بود از: ۱۰ گرم برجج با ۲۰۰ میلی لیتر متابول ۵۵٪ به طور کامل در داخل یک ارلن مخلوط شد. سپس ۱۰۰ میلی لیتر هگران نرمال به مخلوط فوق (برجج و متابول) اضافه شد و ارلن به مدت ۱۵ دقیقه تکان داده شد. مخلوط در ۲۰۰۰ دور در دقیقه برای مدت پنج دقیقه سانتریفیوژ شد. در این مرحله فاز متابولی-آبی به آرامی از سایر فازها جدا شد. حجم مساوی کلروفرم افزوده شد و به مدت ۱۵ دقیقه مخلوط شد. فاز کلروفرم جداسازی و پس از تغییط در یخچال نگهداری شد (۲۷).

مقدار ۵۰ میکرولیتر از زرده استخراج شده از تخم پرندگان ایمن و غیرایمن پس از رقیق سازی در غلظت های ۱۲، ۴، ۲۴، ۴۸ و ۹۶ گرم در لیتر به یک میلی لیتر بافر فسفات حاوی پنج میکروگرم در میلی لیتر آفلاتوکسین B₁ افزوده شد. از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. پس از یک ساعت انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سلسیوس، با استفاده از ۱۰۰ میکرولیتر محلول اسید تری کلرواستیک ده درصد، مجموعه

حدوٰ، ۱- تحزیہ شیمسیاں، حبّہ

(kcal/kg) انرژی متابولیسمی (%)
 پروتئین خام (%)
 چربی خام (%)
 حداقو میتوئین (%)
 لیزین (%)
 میتوئین + سیستین (%)
 کلسیم (%)
 فسفر قابل دسترس (%)
 سدیم (%)

برای اندازه‌گیری شاخص‌های بیوشیمیابی سرم در سن ۳۵ روزگی از هر گروه آزمایشی چهار پرنده به صورت تصادفی انتخاب و از ورید بال در حدود دو میلی‌لیتر خون گرفته شد. غلظت پروتئین تام، الومین، اسید اوریک، کراتینین، گلوکز، کلسیتروول و تری‌گلیسرید موجود در نمونه‌های سرم خون با کیت آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون و دستگاه اسپکتروفوتومتر Jenway Genova MK3, UK تعیین شد.

برای بررسی عملکرد اینمی هموار از تزریق گلبول قرمز گوسفند و واکسن نیوکاسل به عنوان یادگار، جهت تحریک

مخالف بود. همچنین در غلظت‌های ۲۴ گرم در لیتر و بیشتر این تفاوت به صورت معنی‌داری مشاهده شد ($p<0.01$). زرده ایمن و غیرایمن در غلظت‌های ۷۶۸ و ۱۰۰۰ گرم در لیتر هیچ لکه‌ای روی TLC نشان ندادند که گواه بر حذف کامل آفلاتوکسین در این غلظت‌ها می‌باشد. با توجه به این که غلظت زرده استفاده شده در مزرعه (چهار گرم در لیتر) تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های دریافت‌کننده زرده ایمن و غیرایمن را نشان نمی‌دهد ولی اعداد به دست آمده نشان‌دهنده کاهش ۱۰/۹ درصد آفلاتوکسین توسط زرده ایمن نشده و ۱۹/۵ درصد کاهش سم در زرده ایمن شده می‌باشد.

اثر آفلاتوکسین B₁, زرده ایمن و غیرایمن علیه AFB₁ بر شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین ژاپنی تفاوت معنی‌داری در غلظت پروتئین کل و آلبومین گروه‌های مختلف نشان داد ($p<0.01$). بالاترین غلظت این دو فراسنجه در گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین به همراه زرده ایمن شده علیه آفلاتوکسین مشاهده شد و پائین‌ترین مقدار آن نیز مربوط به گروه شاهد مثبت بود. سطح کراتینین در سرم نیز تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد ($p<0.05$). دریافت سم در گروه‌های شاهد مثبت و زرده غیرایمن موجب افزایش غلظت کراتینین شد.

اثر آفلاتوکسین B₁, زرده ایمن و غیرایمن علیه آفلاتوکسین B₁ بر شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین ژاپنی تفاوت معنی‌داری در غلظت پروتئین کل و آلبومین گروه‌های مختلف نشان داد ($p<0.01$).

جدول ۲- مقایسه میزان درصد کاهنده‌ی سم آفلاتوکسین B₁ توسط زرده ایمن و غیرایمن علیه آفلاتوکسین B₁ در غلظت‌های مختلف
Table 2. Comparison of toxin reduction rate by anti-aflatoxin B₁ immune and un-immune yolk at various concentrations

| | غلظت زرده (g/L) | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | زرده ایمن شده | زرده ایمن شده علیه آفلاتوکسین B ₁ | P-value | خطای معیار میانگین | خطای معیار میانگین | خطای معیار میانگین | خطای معیار میانگین |
| ۳۴ | ۱۲ | ۹۶ | ۴۸ | ۲۴ | ۱۲ | ۴ | |
| ۵۵/۹ ^b | ۴۴/۷ ^b | ۴۲/۱ ^b | ۲۹/۷ ^b | ۱۷/۰ ^b | ۱۲/۶ | ۱۰/۹ | |
| ۷۳/۲ ^a | ۷۲/۵ ^a | ۶۵/۴ ^a | ۴۹/۷ ^a | ۲۸/۷ ^a | ۲۲/۲ | ۱۹/۵ | |
| .۰/۰۰۱ | <.۰۰۰۱ | .۰۰۰۸ | .۰/۱ | <.۰۰۰۱ | .۰/۱۰ | .۰/۱۲ | |
| .۰/۴ | .۰/۶ | .۰/۵ | .۰/۰۵ | .۰/۰۳۴ | .۰/۰۳ | .۰/۳ | |

*: ۴ گرم در لیتر آب آشامیدنی در واقع غلظت زرده استفاده شده در مزرعه می‌باشد.
میانگین‌های دارای حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر اختلاف معنی‌دارند.

بین تیمارها در گروه شاهد مثبت از کمترین غلظت برخوردار بود و استفاده از زرده‌های ایمن و غیرایمن موجب افزایش غلظت این متabolیت‌ها در سرم در مقایسه با گروه شاهد مثبت شد. در بین تیمارها غلظت hdl تفاوت معنی‌داری نشان داد ($p<0.05$). کمترین مقدار مربوط به گروه دریافت‌کننده زرده ایمن بود (جدول ۳).

با توجه به نتایج موجود در این برسی زرده ایمن شده باعث افزایش برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم مانند پروتئین تام، آلبومین و تری گلیسرید و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شد. آفلاتوکسین باعث جلوگیری از سنتر پروتئین‌ها می‌شود (۱۱)، در نتیجه، کاهش پروتئین سرم یکی از پیامدهای معمول آفلاتوکسیکوز می‌باشد، بهطوری که کاهش در سطوح پروتئین تام و آلبومین سرم شاخص آفلاتوکسیکوز مطرب محسوب می‌شود (۲۵). پروتئین تام و آلبومین سرم در جوچه‌هایی که جیره آفلاتوکسین‌دار به همراه مواد جاذب مصرف کردنده بهبود یافت که این بهبود، حاصل کاهش

بالاترین غلظت این دو فراسنجه در گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین به همراه زرده ایمن شده علیه آفلاتوکسین مشاهده شد و پائین‌ترین مقدار آن نیز مربوط به گروه شاهد مثبت بود. سطح کراتینین در سرم نیز تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد ($p<0.05$), دریافت سم در گروه‌های شاهد مثبت و زرده غیرایمن موجب افزایش غلظت کراتینین شد. در گروه زرده ایمن میزان کراتینین در حد گروه شاهد بدون سم کاهش نشان داد. تفاوت غلظت اسید اوکیک سرم در بین تیمارهای مختلف معنی‌دار نبود. تفاوت معنی‌داری در غلظت گلوكز گروه‌های مختلف مشاهده شد ($p<0.01$). بالاترین غلظت گلوكز مربوط به گروه زرده غیرایمن بود که با گروه‌های شاهد منفی و زرده ایمن تفاوتی را نشان نمی‌دهد. کمترین غلظت گلوكز مربوط به پرنده‌گان گروه شاهد مثبت می‌باشد ($p<0.01$). گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین به همراه زرده‌های ایمن و غیرایمن باعث افزایش غلظت گلوكز در مقایسه با شاهد مثبت شد. میزان تری گلیسرید و کلسترول در

افزایش و کلسترول کاهش یافت. دنلی و همکاران (۷) گزارش کردند جیره حاوی آفلاتوکسین باعث کاهش معنی‌دار تری‌گلیسرید و کلسترول سرم نسبت به گروه کنترل می‌شود. گزارش شده که آفلاتوکسین‌ها باعث کاهش میزان گلوکز سرم می‌شوند (۲۳). مشابه این نتیجه در آزمایش حاضر نیز مشاهده شد.

اثرات سمی آفلاتوکسین B₁ از مواد جاذب بود (۲۵). لیپیدهای گردش خون، از جذب روده‌ای لیپیدهای جیره غذایی و سنتز کبدی، یا بسیج آنها از اندوخته‌های چربی بدن مشاهد می‌گیرند. تغییر در میزان کلسترول سرم در بیماری‌های کبدی گزارش شده است (۱۲). سانتوریو (۲۳) گزارش کرد با مصرف آفلاتوکسین‌ها، تری‌گلیسرید سرم

جدول ۳- اثر سم آفلاتوکسین B₁ و زرده‌های اینمن و غیرایمن بر شاخص‌های بیوشیمیای سرم

| گروه‌ها | آفلاتوکسین B ₁ زرده مصرفی در آب (mg/kg) | پروتئین تام (g/dl) | گلوكز (mg/dl) | کراتینین اوریک اسید (mg/dl) | البومین (mg/dl) | HDL | کلسترول (mg/dl) | تری‌گلیسرید (mg/dl) |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| شاهد مثبت | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شاهد منفی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زرده اینمن | ۲ | ۴ | ۲/۰۸ ^a | ۰/۵۱ ^b | ۲/۱۷ ^a | ۳/۵۲ ^{ad} | ۶/۳۱ | ۵۶/۰۶ ^c |
| زرده غیرایمن | ۲ | ۴ | ۲/۲۱ ^a | ۰/۵۷ ^b | ۲/۲۱ ^a | ۳/۲۱ ^a | ۶/۲۱ | ۵۷/۶۸ ^c |
| P-value | - | - | - | - | - | - | - | - |
| خطای معیار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| میانگین | - | - | - | - | - | - | - | - |

میانگین‌های دارای حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر اختلاف معنی‌دارند.

آفلاتوکسین به تنهایی بود. عوامل مختلفی ممکن است به سرکوب سامانه اینمن منجر شوند که در بی آن پرنده پاسخ مناسبی نسبت به عامل آسیب‌رسان نشان نخواهد داد که از جمله این عوامل می‌توان به عوامل عفونی (بیروس‌های گاممورو، کم‌خونی عفونی، مارک، نفریت پرنده‌گان، لکوز پرنده‌گان، آدنوبیروس‌ها و رئوبیروس‌ها)، عوامل غیرعفونی (آفلاتوکسین، اکراتوکسین، سیتروکسین و سایر سموم قارچی) و اختلالات گوارشی و تغذیه‌ای اشاره کرد (۶). آفلاتوکسین‌ها تأثیر معنی‌داری بر اینمن هومورال می‌گذارند که این می‌تواند در اثر آسیب‌های شدید کبدی و کاهش تولید اینامون‌گلوبولین‌ها باشد (۱۴). بورس فابریسیوس یکی از اندازه‌های لنفوئیدی است که لنفوسیت‌های B را تولید می‌کند. عدم توسعه این اندام باعث کاهش تولید لنفوسیت‌های B و در نتیجه تضعیف اینمن هومورال می‌شود (۲۸). گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که آفلاتوکسین‌ها باعث تحلیل بورس فابریسیوس می‌شوند و در نتیجه اینمن هومورال تضعیف می‌شود (۱۷). آفلاتوکسین‌ها با جلوگیری از سنتز پروتئین‌ها موجب کاهش تولید پادتن در بدن پرنده می‌شوند (۳۰). آفلاتوکسین‌ها پاسخ به واکسن را کاهش داده و باعث وقوع بیماری‌های عفونی می‌شوند (۵). از لحاظ افزایش ضخامت پوست در چالش با DNCB و فیتوههماکلوتینین گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین به طور معنی‌داری کمتر از سایر گروه‌ها بود. بیشترین مقدار افزایش ضخامت پوست به ترتیب در گروه شاهد منفی، دریافت‌کننده آفلاتوکسین به همراه زرده اینمن شده عليه آفلاتوکسین B₁ و دریافت‌کننده آفلاتوکسین به همراه زرده اینمن نشده عليه آفلاتوکسین B₁ را نشان دادند. همچنین در چالش با فیتوههماکلوتینین-P ضخامت پوست در گروه شاهد منفی به طور معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (جدول ۴). افزودن ۵۰ و ۲۰۰ میکروگرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B₁ به جیره جوجه‌های گوشتی باعث کاهش معنی‌دار عیار پادتن تولیدی علیه واکسن نیوکاسل در مقایسه با گروه کنترل شد (۲۹). هاشمی و همکاران (۱۶) نشان دادند که افزودن ۱۰۰ الی ۳۰۰ ppb آفلاتوکسین با و بدون دیواره

استفاده از زرده اینمن تأثیر سم بر تغییر متabolیت‌های سرم را مهار نمود که می‌تواند به علت جذب سم توسط پادتن موجود در زرده اینمن باشد. کاهش سم توسط زرده غیرایمن را با توجه به اجزاء سازنده آن می‌توان به واکنش اجزاء پروتئینی و تاحدی کربوهیدرات موجود در زرده نسبت داد، زیرا ترکیب زرده عبارتست از: چربی ۵/۵-۳۵/۵-۳۱/۸-۴۸/۷ درصد، آب ۱۵/۷-۱۶/۶ درصد، مواد معدنی ۱/۱ درصد و کربوهیدرات ۰/۲-۰/۰ درصد می‌باشد (۱۹). با در نظر گرفتن شیوه استخراج (۱۳) جزء عمدۀ چربی و مواد جامد در قسمت استخراج شده حذف شده است و تنها پروتئین، مواد معدنی و کربوهیدرات‌ها بر جای می‌مانند. در پرنده‌گان مبتلا به نارسایی کلیه به علت کاهش دفع اسید اوریک توسط کلیه‌ها انتظار می‌رود که میزان اسید اوریک سرم افزایش یابد (۳۱). سانتوریو (۲۳) گزارش کرد مصرف جیره‌های آلوده به آفلاتوکسین موجب افزایش معنی‌داری در میزان اسید اوریک و کراتینین سرم جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی شد که دلیل این افزایش می‌تواند آسیب کلیه‌ها در اثر مصرف آفلاتوکسین باشد. در آزمایش حاضر استفاده از زرده اینمن شده توансنت جلوی افزایش سطح کراتینین سرم را بگیرد، در حالی که در مورد زرده غیرایمن میزان افزایش کراتینین مهار نشد.

تأثیر تیمارهای مختلف بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در ۳۵ روزگی در جدول ۴ نشان داده شد. عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در ۳۵ روزگی در گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین به طور معنی‌داری کمتر از گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین همراه افزودنی‌ها بود ($p < 0.05$). تأثیر تیمارهای مختلف بر عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند در ۳۵ روزگی در جدول ۴ نشان داده شده است. میزان پادتن تولید شده بر علیه گلبول قرمز گوسفند تفاوت معنی‌داری در بین تیمارهای مختلف داشت ($p < 0.01$) و بالاترین عیار پادتن به ترتیب مربوط به گروه دریافت‌کننده آفلاتوکسین به همراه زرده اینمن علیه آفلاتوکسین B₁ و زرده غیرایمن بود و کمترین مقدار مربوط به گروه دریافت‌کننده

سلولی مخمر تأثیر معنی‌داری روی عیار پادتن تولیدی علیه واکسن نیوکاسل نداشت. وجود یک پی‌بی‌ام آفلاتوکسین در جیره چوجه‌های گوشتی باعث کاهش معنی‌دار عیار پادتن بر

جدول ۴- اثر سه آفلاتوکسین B₁ و زرده‌های ایمن و غیرایمن بر پاسخ‌های ایمنی سلولی و همورال
Table 4. Effect of aflatoxin B₁, anti-aflatoxin B₁ immune and un-immune yolks on humoral and cell mediated immune responses

| گروه‌ها | آفلاتوکسین B ₁ (mg/kg) | زرده مصرفی در آب (g/l) | افزایش خصامت پوست (mm) | دی‌نیتروکلروبنزن فیتوهمالوتینین | عیار پادتن (log ₂) | نیوکاسل | SRBC |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| شاهد مثبت | ۲ | . | ۱/۸۰ ^b | ۲/۰۳ ^b | ۲/۰۰ ^b | ۲/۲۵ ^c | ۲/۰۰ ^b |
| شاهد منفی | ۰ | . | ۲/۲۲ ^a | ۲/۰۳ ^a | ۰/۰۱ | ۴/۰۵ ^a | ۲/۷۵ ^{ab} |
| زرده ایمن | ۲ | ۴ | ۲/۱۶ ^a | ۲/۰۹ ^{ad} | ۰/۰۹ | ۲/۲۵ ^a | ۳/۲۵ ^a |
| زرده غیرایمن | ۲ | ۴ | ۲/۱۰ ^a | ۲/۱۲ ^b | ۰/۰۵ ^c | ۲/۷۵ ^{bc} | ۳/۰۰ ^a |
| P-value | | | | | ۰/۰۴ | ۰/۰۲ | ۰/۰۰۳ |
| خطای معيار ميانگين | | | | | | ۰/۱۵ | ۰/۰۱ |

ميانگين‌های دارای حروف متفاوت در هر ستون با يكديگر اختلاف معنی‌دارند.

جیره مسموم را مهار نمود و تأثیر زرده ایمن در مقایسه با زرده غیرایمن بیشتر بود. افزودن ۰/۵، یک و دو میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین به جیره چوجه‌های گوشتی باعث کاهش معنی‌دار خصامت پوست در ناحیه چالش با DNB شد و DNB شد و غلظت سه تأثیری در کاهش خصامت پوست نداشت (۳۲). در این آزمایش شان داده شد که استفاده خوراکی از زرده تخم می‌تواند میزان عوارض ناشی از آفلاتوکسیکوز B₁ بر اساس شاخص‌های مرتبه با بیوشیمی خون و سیستم ایمنی را در بلدرچین کاهش دهد و احتمالاً تأثیرگذاری زرده در تخمهای ایمن شده نسبت به تخم غیرایمن بیشتر می‌باشد.

همچنان آفلاتوکسین‌ها تأثیر معنی‌داری روی ایمنی سلولی چوجه‌ها می‌گذارند. برای ارزیابی ایمنی با واسطه سلولی می‌توان از تست‌هایی چون افزایش حساسیت نوع تأخیری پوست به دی‌نیتروکلروبنزن (DNB) و فیتوهمالوتینین-P (PHP) استفاده نمود. گزارش‌های پیشین نشان دادند که این واکنش ناشی از فعالیت لنفوسیت T بوده و از مشخصات فعلیت لنفوسیت B نمی‌باشد (۸). در آزمایش حاضر میزان افزایش خصامت پوست در گروهی که آفلاتوکسین B₁ را بدون افزودنی دریافت کرده بود بهطور معنی‌داری کمتر از سایر گروه‌ها بود. افزودن زرده ایمن و غیرایمن جلوی کاهش در پاسخ‌های ایمنی ناشی از تعذیب

منابع

- Ahmadi, M. and M.A. Karimi Torshizi. 2016. Effects of dietary vermi-humus in comparison to virginiamycin on performance and small intestinal morphometric parameters in Japanese quail. Research on Animal Production, 7: 77-86 (In Persian).
- Bagherzadeh Kasmani, F., M.A. Karimi Torshizi, A. Allameh and F. Shariatmadari. 2012. A novel aflatoxin-binding bacillus probiotic: performance, serum biochemistry and immunological parameters in Japanese quail. Poultry Science, 91: 1846-1853.
- Biomin. 2011. BIOMIN's Mycotoxin Survey. Annual Report 2010.
- Chalghoumi, R., Y. Beckers, D. Portetelle and Z. Théwis. 2009. Hen egg yolk antibodies (IGY), production and use for passive immunization against bacterial enteric infections in chicken. Biotechnology, agronomy, Society and Environment, 13: 295-308.
- Corrier, D.E. 1991. Mycotoxicosis: mechanism of immunosuppression. Veterinary immunology and immunopathology, 30: 71-87.
- Davison, F., B. Kaspers and K.A. Schat. 2009. Avian Immunology. Academic Press. London. Great Britain, 481pp.
- Denli, M., J.C. Blandon, M.E. Guynot, S. Salado and J.F. Perez. 2009. Effects of dietary afladetox on performance, serum biochemistry, histopathological changes, and aflatoxin residues in broilers exposed to aflatoxin B₁. Poultry Science, 88: 1444-1451.
- Diaz, D.E., W.M. Hagler, J.T. Blackwelder, J.A. Eve, B.A. Hopkins and K.L. Andersen. 2004. Aflatoxin binders II: reduction of aflatoxin M₁ in milk by sequestering agents of cows consuming aflatoxin in feed. Mycopathologia, 157: 233-241.
- Diertert, R.R., K.A. Golemboski and R.E. Austic. 1994. Environment-Immune interactions. Poultry Science, 73: 1062-1076.
- El-Nezami, H., P. Kankaanpää, S. Salminen and J. Ahokas. 1998. Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind a common food carcinogen, aflatoxin B₁. Food and Chemical Toxicology, 36: 321-326.
- El-Nezami, H., H. Mykkänen, P. Kankaanpää, S. Salminen and J. Ahokas 2000. Ability of lactobacillus and propionibacterium strains to remove aflatoxin B₁, from the chicken duodenum. Journal of Food Protection, 63: 549-552.
- Fernandez, A., T.V. Maria, M. Gascon, J. Ramos, J. Gomez, D.F. Luco and G. Chavez 1994. Variations of clinical biochemical parameters of laying hens and broiler chickens fed aflatoxin containing feed. Avian Pathology, 23: 37-47.

13. Fulton, R.M., B.N. Nersessian and W.M. Reed. 2002. Prevention of *salmonella* enteritidis infection in commercial ducklings by oral chicken egg-derived antibody alone or in combination with probiotics. *Poultry Science*, 81: 34-40.
14. Giambrone, J.J., D.L. Ewert, R.D. Wyatt and C.S. Eidson. 1978. Effect of aflatoxin on the humoral and cell-mediated immune system of the chicken. *American Journal of Veterinary Research*, 39: 305-308.
15. Hadiani, M.R., H. Yazdanpanah, M. Amirahmadi, H. Soleimani, S. Shoeibi and R. Khosrokhavar. 2009. Evaluation of aflatoxin contamination in maize from mazandaran province in Iran. *Journal of Medicinal Plants*, 8:109-114.
16. Hashmi, I., T.N. Pasha, M.A. Jabbar, M. Akram and A.S. Hashmi. 2006. Study of adsorption potential of yeast sludge against aflatoxins in broiler chicken. *Journal of Animal and Plant Sciences*, 16: 12-14.
17. Kubena, L.F., R.B. Harvey, R.H. Bailey, S.A. Buckley and G.E. Ronninghaus. 1998. Effect of hydrated sodium calcium aluminosilicate (t-bintm) on mycotoxicosis in young broiler chickens. *Poultry Science*, 77: 1502-1509.
18. Lee, E.N., H.H. Sunwoo, K. Menninen and J.S. Sim. 2002. *In Vitro* studies of chicken egg yolk antibody (IGY) against *salmonella* enteritidis and *salmonella* typhimurium. *Journal of Poultry Science*, 81: 632-641.
19. Mine, Y. 2008. Egg Bioscience and Biotechnology. 1st Edition. John Wiley and Sons, Inc; Hoboken, NJ, USA.
20. Park, D.C. 1993. Controlling Aflatoxin in Food and Feed. *Food Technology*, 47: 92-96.
21. Peterson, A.L., M.A. Qureshi, P.R. Ferket and J.C. Fuller. 1999. Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of -Hydroxy- -Methylbutyrate. *Immunopharmacology and Immunotoxicology*, 21: 307-330.
22. Rahimi, Sh., Z. Moghadam Shiraz, T. Zahraei Salehi, M.A. Karimi Torshizi and J.L. Grimes. 2007. Prevention of salmonella infection in poultry by specific egg-derived antibody. *International Journal of Poultry Science*, 6: 230-235.
23. Santurio, J.M. 1999. Effect of sodium bentonite on the performance and blood variables of broiler chickens intoxicated with aflatoxins. *British Poultry Science*, 40: 115-119.
24. Shabani, A., B. Dastar, M. Khomeiri, B. Shabanpur and S. Hasani. 2010. Effect of nanozeolite on performance, some blood parameters and ileal bacteria population in broiler chicks fed aflatoxin contaminated diets. *Research on Animal Production*, 1: 58-68 (In Persian).
25. Shi, Y.H., Z.R. Xu, J.L. Feng and C.Z. Wang. 2006. Efficacy of modified montmorillonite nanocomposite to reduce the toxicity of aflatoxin in broiler chicks. *Animal Feed Science and Technology*, 129: 138-148.
26. Shivachandra, S.B., R.L. Sah, S.D. Singh, J.M. Kataria and K. Manimaran. 2003. Immunosuppression in broiler chicken fed aflatoxin and inoculated with fowl adenovirus serotype-4 (fav-4) associated with hydropericardium syndrome. *Veterinary Research Communication*, 27: 39-51.
27. Shotwell, O.L., C.V. Hesseltine, R.D. Stubblefield and W.G. Sorenson. 1966. Production of aflatoxin on rice. *Applied and Environmental Microbiology*, 14: 425-428.
28. Sur, E. and I. Celik. 2003. Effect of aflatoxin b₁ on the development of the bursa of fabricius and blood lymphocyte acid phosphatase of the chicken. *British Poultry Science*, 44: 558-566.
29. Tessari, E.N.C., C.A.F. Oliveira, A.L.S.P. Cardoso, D.R. Ledoux and G.R. Rottinghaus. 2006. Effect of aflatoxin b₁ and fumonisin b₁ on body weight, antibody titres and histology of broiler chicks. *British Poultry Science*, 47: 357-364.
30. Tung, H.T., F.W. Cook, R.D. Wyatt and P.B. Hamilton. 1975. The anemia caused by aflatoxin. *Poultry Science*, 54: 1962-1969.
31. Tung, H.T., R.D. Wyatt, P. Thaxton and P.B. Hamilton. 1973. Impairment of kidney function during aflatoxicosis. *Poultry Science*, 52: 873-878.
32. Verma, J., T.S. Johri, B.K. Swain and S. Ameena. 2004. Effect of graded levels of aflatoxin and their combination on the performance and immune response of broilers. *British Poultry Science*, 45: 512-518.
33. Wegmann, T. and O. Smithies. 1966. A simple hemagglutination system requiring small amounts of red cells and antibodies. *Transfusion*, 6: 67-75.

Amelioration of Experimental B₁ Aflatoxicosis in Japanese Quails by Yolk Derived Specific Antibody

Marzieh Bagheri¹, Mohammad Amir Karimi Torshizi² and Mohammad Javad Rasaee³

1 and 3- M.Sc. Student and Professor, Tarbiat Modares University

2- Associate Professor, Tarbiat Modares University, (Corresponding author: karimitm@modares.ac.ir)

Received: June 8, 2014

Accepted: October 26, 2015

Abstract

Two experiments were carried out to determine the potential of oral yolk derived specific antibody against aflatoxin B₁ in Japanese quails. In the first experiment egg yolk derived antibody against aflatoxin B₁ was produced in layer quails. The potential of aflatoxin absorbent of the eggs from immunized and non-immunized layers was assayed *in vitro*. Egg yolk extracts derived from aflatoxin-BSA conjugate immunized layers absorbed more aflatoxin B₁ compared to that of non-immunized birds in concentrations over 24 g/l (P <0.05). In the second experiment 120, one-d-old quails were randomly attributed to four experimental groups with five replications of six chicks. The experimental groups consisting: 1- negative control- fed uncontaminated feed. 2- Positive control- fed aflatoxin B₁ (2 mg/kg) contaminated feed. 3- AFB₁+SY- fed contaminated feed and 4 g/l yolk extract form immunized layers in drinking water. 4- AFB₁+NY- fed contaminated feed and 4 g/l yolk extract form non-immunized layers in drinking water. Feeding aflatoxin without yolk extract lowered serum concentrations of total protein, albumin, HDL, triglyceride, cholesterol and glucose. Oral yolk extracts restored the aflatoxicosis-induced alteration of serum metabolits to the normal levels similar to negative control. The yolk extract derived from immunized layers was more efficient compared to that of non-immunized birds. Aflatoxicosis diminished the studied cellular and humoral immune responses (P < 0.05), while oral yolk extracts boosts the immune responses to a level comparable to negative control.

Keywords: Aflatoxin B₁, Antibody, Egg Yolk, Japanese quail