



"مقاله پژوهشی"

پاسخ عملکرد تولیدی، گوارش پذیری مواد مغذی و شاخص‌های متابولیک به نسبت‌های متفاوت اسید پالمیتیک به استتاریک در جیره گاوهای هلستاین

امید رضانی آفرانی^۱، ابوالفضل زالی^۲ و مهدی دهقان بنادکی^۳

۱- دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

۲- دانشیار، دانشگاه تهران، (نویسنده مسوول: a.zali@ut.ac.ir)

۳- استاد، دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۶/۲۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۸/۱۹

صفحه: ۶۹ تا ۷۶

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نسبت‌های مختلف اسید پالمیتیک به اسید استتاریک در جیره گاوهای شیری بود. هشت راس گاو شیری (دفعات زایش $3/2 \pm 0/6$)، تولید شیر 4 ± 3 کیلوگرم و میانگین روز شیردهی 56 ± 13 در قالب طرح مربع لاتین 4×4 در دوره‌های آزمایشی ۲۱ روزه استفاده شدند. جیره‌های آزمایشی حاوی نسبت‌های مختلف چربی عبارت بودند از ۱- جیره $100P$ به‌عنوان شاهد (100 درصد اسید پالمیتیک)، ۲- جیره $33S67P$ (33 درصد اسید استتاریک و 67 درصد اسید پالمیتیک)، ۳- جیره $67S33P$ (67 درصد اسید استتاریک و 33 درصد اسید پالمیتیک) و ۴- جیره $100S$ (100 درصد اسید استتاریک). در هفته آخر دوره آزمایش، ماده خشک مصرفی اندازه‌گیری شد و مقدار شیر تولید شده در سه وعده دوشش به‌صورت انفرادی ثبت شد. گوارش‌پذیری طی سه روز متوالی در هفته آخر آزمایش با نمونه‌گیری مدفوع از رکتوم و قبل از شیردوشی وعده صبح اندازه‌گیری شد. نمونه‌های خون جمع‌آوری شده از ورید دمی در روز ۱۹ آزمایش برای سنجش فراسنج‌های متابولیک و هورمونی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که ماده خشک مصرفی، گوارش‌پذیری ماده خشک، چربی، پروتئین و ایفای شوینده خنثی، تولید شیر و شیر تصحیح شده برای انرژی، تولید و درصد پروتئین و لاکتوز شیر تحت تأثیر نسبت‌های مختلف اسید پالمیتیک و اسید استتاریک قرار نگرفت. جایگزینی اسید پالمیتیک با استتاریک سبب کاهش شیر تصحیح شده برای چربی، درصد چربی و نسبت چربی به پروتئین شد ($p < 0/05$). غلظت NEFA پلاسما در جیره $33S67P$ در مقایسه با جیره‌های $100S$ و $67S33P$ بود تمایل به افزایش داشت ($p = 0/07$). به‌طور کلی نتایج نشان داد افزایش سطح اسیداستتاریک در جیره منجر به کاهش درصد چربی و لاکتوز در شیر بدون تاثیر بر راندمان تولید شیر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: اسید استتاریک، اسید پالمیتیک، گاوهای شیرده، مکمل چربی

مقدمه

صنعت پرورش گاو شیری طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و به‌ویژه، تولید شیر در مقایسه با قبل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است (۳۱). برای پرورش دهندگان صنعت گاو شیری، تولید شیر گاو یکی از صفات مهم و درآمدزا می‌باشد (۳۰) که به‌شدت به نوع اقلام جیره وابسته است (۱۴). از این‌رو متخصصین تغذیه استفاده از اقلام پر انرژی در خوراک نظیر نشاسته و چربی را در جیره گاوهای شیری در مرحله شیردهی توصیه نموده‌اند (۱۹). با این وجود انرژی محدود‌کننده‌ترین ماده مغذی جیره در گاوهای شیری پر تولید می‌باشد. افزودن مکمل‌های چربی معمول‌ترین راه تأمین احتیاج گاوهای شیری پر تولید به انرژی می‌باشد (۳۳). با این وجود، افزایش بار چربی جیره به‌ویژه پس از زایش، خطر تغییر در متابولیسم شکمبه، مصرف خوراک و اختلالات متابولیک را افزایش می‌دهد (۱۶). همچنین افزایش سطح اسیدهای چرب ناشباع در جیره خطر اختلال در عملکرد شکمبه (۱۵، ۱۸)، افت مصرف خوراک، افزایش سطح انسولین پلاسما، تغییر در فرآیند هیدروژناسیون زیستی شکمبه و سهم‌بندی انرژی برای بافت‌های ذخیره‌ای را افزایش می‌دهد (۶، ۱۲).

در حالی‌که چربی‌های اشباع اثر منفی کمتری بر غشای پلاسمایی باکتری‌های شکمبه و در نتیجه عملکرد شکمبه دارند (۱۳). آلن (۱) و دسوزا و لوک (۶) گزارش کردند که تأثیر منفی اسیدهای چرب اشباع بر مصرف ماده خشک خوراک کمتر از اسیدهای چرب ناشباع بوده و سبب افزایش خروجی انرژی در شیر شدند. اسید پالمیتیک فراوان‌ترین اسید چرب موجود در چربی شیر می‌باشد و منابع جیره‌ای حاوی پالمیتیک اسید به‌عنوان منبع انرژی برای تولید شیر و جبران وزن از دست رفته بدن حین دوره توازن منفی انرژی مورد توجه می‌باشند و عموماً سبب افزایش تولید چربی شیر می‌شوند. اسید استتاریک فراوان‌ترین اسید چرب تأمین شده در روده برای گاوهای شیری است که در تولید شیر، تعادل انرژی و تولید چربی شیر نقش دارد. لفتن و همکاران (۱۷) بیان کردند که کیفیت انتقال اسیدهای چرب از جیره به چربی شیر به‌وسیله ساخت درون‌بافتی اسید پالمیتیک و غیر اشباع شدن استتاریک به اسید اولئیک در غده پستان پیچیده‌تر می‌شود. به‌علاوه، مشارکت این دو اسید چرب در چربی شیر به‌وسیله احتیاج گاوهای شیری برای حفظ سیالیت شیر که نیازمند تعادل بین اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع است، محدود می‌گردد. چربی‌ها اغلب حاوی مقادیر زیادی اسیدهای

گردید. گاوها از یک هفته قبل از شروع آزمایش جهت سازگاری در جایگاه های انفرادی 4×3 متر مربع با بستر خاک اره و تراشه چوب نگهداری شدند و در تمام طول دوره ی آزمایش دسترسی آزاد به آب داشتند. خوراک به صورت کاملاً مخلوط دو بار در روز در ساعات ۰۸:۰۰ و ۱۷:۰۰ در اختیار گاوها قرار گرفت به طوری که ۱۰ درصد خوراک در آخور باقی بماند.

ترکیب چربی مورد استفاده و اقلام خوراکی جیره و ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی در جداول ۱ و ۲ آورده شده است. **مصرف خوراک، ترکیب خوراک مصرفی و گوارش پذیری مواد مغذی**

در مرحله آزمایش، ۱۴ روز ابتدای آزمایش به عنوان مرحله عادت پذیری به جیره های آزمایشی در نظر گرفته شد و ماده خشک مصرفی از روز ۱۵ تا ۲۱ آزمایش بر اساس اختلاف بین مقدار خوراک عرضه شده و باقی مانده آن برای هر گاو اندازه گیری و ثبت شد. برای تعیین درصد ماده خشک و ترکیبات شیمیایی، در هفته سوم نمونه هایی از خوراک و باقی مانده خوراک هر گاو گرفته شد. همچنین طی سه روز از هفته آخر آزمایش، نمونه های مدفوع از رکتوم و قبل از شیردوشی وعده صبح جمع آوری شد به طوری که برای هر دام در هر دوره هشت نمونه مدفوع جمع آوری و در کیسه های پلاستیکی در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی گراد ذخیره شد. میزان ماده خشک خوراک و باقی مانده و مدفوع با خشک کردن نمونه در آون با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد در مدت ۴۸ ساعت تعیین شد. نمونه های خشک شده با استفاده از آسیاب دارای غربال با الک یک میلی متر آسیاب شدند. محتوای پروتئین خام، عصاره اتری، خاکستر (۲)، لیاف شوینده خنثی (با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت) و لیاف شوینده اسیدی (۲۹) با استفاده از سه تکرار و دستگاه فایبرتک (Fibertec, Tecator, 1010, Denmark) تعیین شد.

چرب بلند زنجیر به ویژه اسید پالمیتیک، استئاریک، اولئیک و لینولئیک هستند. مطالعات متعددی اثر مکمل سازی چربی برای گاوهای شیری را مورد بررسی قرار داده اند اما اغلب این مطالعات حاوی ترکیبی از اسیدهای چرب می باشند و مطالعات اندکی بر تغذیه تنها یک نوع اسید چرب تمرکز دارند. همچنین در مواردی نتایج این مطالعات بر ماده خشک مصرفی، نمره وضعیت بدنی و تولید و ترکیبات شیر متناقض بوده است (۵،۲۱،۲۲). هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سطوح متفاوت اسید پالمیتیک و استئاریک در جیره گاوهای شیری بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر و گوارش پذیری مواد مغذی در اوایل دوره شیردهی بود.

مواد و روش ها

مکان، دام ها و گروه های آزمایشی

در این آزمایش هشت راس گاو شیری با میانگین دفعات زایش $3/2 \pm 0/6$ ، روز شیردهی 56 ± 13 ، نمره ی وضعیت بدنی $3/48 \pm 0/28$ و تولید شیر 40 ± 3 کیلوگرم در روز و در قالب طرح پایه مربع لاتین 4×4 با چهار تیمار در دوره آزمایشی ۲۱ روزه استفاده شدند. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. گاوها در بدو ورود به آزمایش به طور تصادفی به یکی از چهار جیره ی آزمایشی اختصاص یافتند. جیره های مورد استفاده عبارت بودند از: ۱- جیره ۱۰۰P به عنوان شاهد (جیره ی حاوی ۱۰۰ درصد اسید پالمیتیک به عنوان منبع چربی)، ۲- جیره ۳۳S۶۷P (حاوی ۳۳ درصد اسید استئاریک و ۶۷ درصد اسید پالمیتیک)، ۳- جیره ۶۷S۳۳P (حاوی ۶۷ درصد اسید استئاریک و ۳۳ درصد اسید پالمیتیک) و ۴- جیره ۱۰۰S (جیره ی حاوی ۱۰۰ درصد اسید استئاریک). جیره ها از نظر محتوای انرژی و پروتئین خام مشابه بودند. مکمل اسید استئاریک از هیدروژناسیون روغن اولئیک اسید در شرکت کیمیا دانش الوند تهیه شد و پودر چربی پالم از محصول تجاری پالمک تهیه

جدول ۱- ترکیب اسیدهای چرب در مکمل چربی در جیره های آزمایشی (در ۱۰۰ گرم)

منبع چربی مورد استفاده	پودر چربی پالمیتیک	پودر چربی استئاریک
ترکیب چربی محصول تجاری	۸۸/۷۰	۶/۰۰
اسید پالمیتیک	۰/۵۰	۸۶/۰۰
اسید استئاریک	۷/۹۰	۴/۰۰
اسید اولئیک	۲/۰۰	۱/۸۰
اسید لینولئیک		

نمونه گیری از خون، شیر و تعیین ترکیبات شیر

طی سه روز متوالی در هفته آخر دوره آزمایش، نمونه خون با استفاده از لوله های خلاء حاوی ماده ضد انعقاد EDTA ($10/5$ میلی لیتر ونوجکت) از سیاهرگ دمی گرفته شد. نمونه های خون روز ۱۹ آزمایش به مدت ۲۰ دقیقه در دمای چهار درجه سانتی گراد و سرعت 3000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و پلاسما (سه میکروتیوپ از هر نمونه) جدا شده و تا زمان تجزیه آزمایشگاهی در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نمونه های پلاسما با استفاده از کیت تجاری پارس آزمون برای اندازه گیری گلوکز (شماره کاتالوگ: ۱۷-۵۰۰-۰۱)، تری گلیسرید (شماره کاتالوگ: ۳۳-۰-۱) و کلسترول (شماره کاتالوگ: ۱۰-۵۰۰-۰۱) مورد

بررسی قرار گرفتند. سطح انسولین با استفاده از دستگاه الایزا و کیت آزمایشگاهی دیپلاس (شماره کاتالوگ DP2416 با حساسیت $0/5 \text{ IU} \mu$ انسولین در میلی لیتر) اندازه گیری شد. غلظت NEFA و BHBA پلاسما با استفاده از روش رنگ سنجی آنزیمی^۱ (کیت تجاری رندوکس شماره کاتالوگ FA115 و RB1007) اندازه گیری شدند. غلظت مالون دی آلدئید در نتیجه واکنش MDA با ۲-تیوباربتوریک اسید (شرکت سیگما، T5500) در محیط اسیدی کمپلکس رنگی تشکیل می شود که با استفاده از روش اسپکتوفوتومتری قابل شناسایی است. برای تعیین شاخص حساسیت انسولین (RQUICKI) از رابطه ۱ استفاده شد. گاوها سه بار در روز در ساعات ۰۸:۰۰، ۱۶:۰۰ و ۲۴:۰۰ دوشش شدند و همچنین طی

1- Enzymatic colorimetric method

2- Thiobarbituric acid

MilkoScan 134BN; FossElectric, Hillerød,)
(Denmark) تجزیه شد. درصد ماده جامد فاقد چربی شیر از
تفاضل درصد ماده جامد و درصد چربی شیر برای هر نمونه
محاسبه شد. شیر تصحیح شده برای چربی و انرژی بر اساس
رابطه‌های ۲ و ۳ محاسبه شد.

سه روز متوالی از هفته آخر دوره آزمایش، مقدار تولید شیر هر
نوبت شیردوشی به صورت انفرادی ثبت شد و نمونه‌های شیر
در پایان هر سه وعده دوشش جمع‌آوری و با نگهدارنده ۲-
برومو ۲-نیتروپروپان ۱ و ۳ دی‌ال (دی‌کرومات پتاسیم) در
چهار درجه سانتی‌گراد ذخیره شد و برای تعیین درصد چربی،
پروتئین، لاکتوز و ماده جامد با استفاده از دستگاه میلکو اسکن

$$\text{NEFA} = \text{NEFA} (\text{mmol/L}) \quad I = \text{insulin} (\mu\text{U/mL}) \quad \text{RQUICKI} = 1/[\log(G) + \log(I) + \log(\text{NEFA})] \quad G = \text{glucose} (\text{mg/dL}) \quad (\text{رابطه ۱})$$

$$\text{FCM}_{3.5\%} = (0.4324 \times \text{kg of milk}) + (16.216 \times \text{kg of milk fat}) \quad (\text{رابطه ۲})$$

$$\text{ECM} = (0.327 \cdot \text{kg of milk}) + (12.95 \cdot \text{kg of milk fat}) + (7.20 \cdot \text{kg of milk protein}) \quad (\text{رابطه ۳})$$

جدول ۲- اقلام خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی

Table 2. Ingredients and chemical composition of experimental diets

جیره‌های آزمایشی				اقلام خوراکی (درصد از ماده خشک)
۱۰۰S	۶۷S۳۳P	۳۳S۶۷P	۱۰۰P	
۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	یونجه
۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	سیلاژ ذرت
۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	دانه جو
۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	دانه ذرت
۱۶/۷۰	۱۶/۷۰	۱۶/۷۰	۱۶/۷۰	کنجاله سویا
۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	گلوتن ذرت
۲/۰۰	۱/۳۰	۰/۶۸	۰/۱۰۰	پودر چربی استتاریک
۰/۰۰	۰/۶۸	۱/۳۰	۲/۰۰	پودر چربی پالمیتیک
۰/۸۰۰	۰/۸۰۰	۰/۸۰۰	۰/۸۰۰	کلسیم کربنات
۰/۱۶۰	۰/۱۶۰	۰/۱۶۰	۰/۱۶۰	منیزیم اکسید
۰/۱۶۰	۰/۱۶۰	۰/۱۶۰	۰/۱۶۰	دی کلسیم فسفات
۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	سدیم بی‌کربنات
۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	نمک
۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مکمل معدنی-ویتامینی
				ترکیب شیمیایی (درصد از ماده خشک)
۵۱/۶۰	۵۵/۵۰	۵۱/۶۰	۵۳/۲۰	ماده خشک
۱۷/۲۰	۱۷/۲۰	۱۷/۵۰	۱۷/۳۰	پروتئین خام
۷/۵۰	۷/۲۰	۷/۱۰	۷/۶۰	خاکستر
۴/۲۰	۴/۴۰	۴/۲۰	۴/۲۰	عصاره اتری
۳۰/۰۰	۳۰/۶۰	۳۰/۲۰	۳۰/۶۰	الیاف شوینده خنثی
۱۴/۲۰	۱۴/۷۰	۱۴/۲۰	۱۴/۵۰	الیاف شوینده اسیدی

۱- جیره ۱۰۰P به عنوان شاهد (۱۰۰ درصد اسید پالمیتیک)، ۲- جیره ۳۳S۶۷P (۳۳ درصد اسید استتاریک و ۶۷ درصد اسید پالمیتیک)، ۳- جیره ۶۷S۳۳P (۶۷ درصد اسید استتاریک و ۳۳ درصد اسید پالمیتیک) و ۴- جیره ۱۰۰S (۱۰۰ درصد اسید استتاریک).

اثر تصادفی زامین حیوان در μ_m مربع، T_k : اثر ثابت k آمین تیمار، $e_{ij(k)m}$: اشتباه تصادفی با میانگین صفر و واریانس σ^2 .

نتایج و بحث

اثر جیره‌های آزمایشی بر مصرف ماده خشک و تولید شیر

ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز) در گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰۰ درصد اسید استتاریک تفاوت معنی‌داری با جیره حاوی اسید پالمیتیک نداشت. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که ماده خشک مصرفی تحت تاثیر نسبت‌های ۳۳ درصد یا ۶۷ درصد اسید پالمیتیک با استتاریک قرار نگرفت. بیشتر سمیعی ظفرقندی و همکاران (۲۵) با بررسی اثر جیره‌های حاوی ۱/۸ درصد مکمل غنی از اسید استتاریک یا پالمیتیک به تنهایی و یا همراه با ۰/۳ درصد آلفا-لینولئیک گزارش کردند که مکمل سازی اسید استتاریک به تنهایی سبب افزایش ماده خشک مصرفی در گاوهای تازه‌زا شد (۲۴/۷۰ کیلوگرم) که در مقایسه با مقدار ثبت شده در مطالعه حاضر نیز بیشتر بود. دسوزا و همکاران (۸) اثر زمان

آنالیز آماری داده‌ها

آزمایش در قالب طرح پایه مربع لاتین ۴×۴ تکرار شده با دو تکرار و دوره آزمایشی ۲۱ روزه اجرا شد. داده‌های مربوط به هر فراسنجه با رویه مدل مختلط Proc MIXED نرم‌افزار آماری SAS (۲۵) تجزیه و تحلیل شد. اثر مربع، دوره، حیوان داخل مربع و تیمار در مدل لحاظ شد و اثر مربع و تیمار به عنوان اثرات ثابت و اثر حیوان در مربع و تیمار به عنوان اثر تصادفی در مدل قرار گرفتند. توزیع نرمال داده‌ها و همگنی واریانس برای باقی‌مانده‌ها با رویه UNIVARIATE مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها با روش توکی انجام شد. سطح معنی‌داری مقایسه‌های مستقل برای تیمار به صورت خطی و درجه دوم گزارش شد. سطح $p \leq 0.05$ معنی‌دار و $p \leq 0.10$ $< p \leq 0.05$ تمایل به معنی‌داری در نظر گرفته شد. مدل آماری استفاده شده در رابطه ۴ آمده است.

(رابطه ۴)

$$Y_{ij(k)m} = \mu + S_m + P_i + A(S)_{jm} + T_k + e_{ij(k)m}$$

$$i, j, k = 1, \dots, T; m = 1, \dots, b$$

که در آن $Y_{ij(k)m}$: مقدار مشاهده شده، μ : اثر میانگین کل، S_m : اثر ثابت m آمین مربع، P_i : اثر ثابت i آمین دوره، $A(S)_{jm}$:

مکمل کردن ۱/۵ درصد پالمیتیک اسید در جیره را در بازه ۱ تا ۲۴ یا ۶۷ روز شیردهی (پیک تولید شیر) بررسی کردند و گزارش کردند ماده خشک مصرفی و تولید شیر در ۲۴ روز اول آزمایش تحت تأثیر تیمار آزمایشی قرار نگرفت. همان طور که در جدول ۳ نشان داده شده است، مقدار تولید شیر در گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰۰ درصد اسید استتاریک تفاوت معنی داری با جیره حاوی ۱۰۰ درصد اسید پالمیتیک نداشت. بر خلاف نتایج پژوهش حاضر، پیانتونی و همکاران (۲۰) گزارش کردند صرف نظر از پتانسیل تولید شیر، مکمل سازی استتاریک اسید سبب افزایش ماده خشک مصرفی، تولید شیر، کارایی مصرف خوراک، تولید چربی، پروتئین و لاکتوز شیر در مقایسه با گروه شاهد شد.

در پژوهش حاضر، ۱۰۰ درصد استتاریک سبب کاهش شیر تصحیح شده برای چربی، درصد چربی و نسبت چربی به پروتئین شد ($p < 0.05$) ولی کاهش شیر تصحیح شده برای انرژی بین گروه های مختلف تمایل به معنی داری داشت ($p = 0.08$). درصد و تولید پروتئین و لاکتوز شیر بین گروه ها معنی دار نبود. این نتایج را می توان با فرضیه زومپا-سوسا و همکاران (۲۸) همسو دانست که بیان کردند افزایش فراهمی اسید پالمیتیک در سلول های اپیتلیال پستان سبب افزایش فعالیت گلیسرول-۳ فسفات آسیل ترانسفر از در غده پستان می شود که با افزایش نسبت پالمیتیک آسیده شده، ساخت تری آسیل گلیسرول را افزایش می دهد. در این رابطه، ریکو و همکاران (۲۳) گزارش کردند که تغذیه ۶۴۲ گرم در روز پالمیتیک در مقایسه با ۶۴۶ گرم اسید استتاریک خالص سبب افزایش شیر تصحیح شده برای چربی، غلظت چربی و تولید چربی شیر و کاهش نسبت اسیدهای چرب ۶ تا ۱۴ کربن شد. پیانتونی و همکاران (۲۱) گزارش کردند که استفاده از مکمل چربی حاوی اسید پالمیتیک و استتاریک در ۲۹ روز ابتدای

شیردهی در گاوهای تغذیه شده با جیره کم علوفه سبب سهم بندی انرژی به نفع ذخایر بدنی شد و تولید شیر را کاهش داد. برخلاف آنچه در مطالعه حاضر مشاهده شد که جایگزینی نسبی یا کامل اسید استتاریک اثری بر تولید چربی شیر نداشت، استیل و مور (۲۷) با ارزیابی اثر مکمل سازی چهار درصد اسید استتاریک (خلوص ۹۴ درصد) به ماده خشک جیره بیان کردند که استتاریک سبب افزایش تولید چربی شیر شد ولی بر تولید شیر و درصد چربی شیر اثر نداشت. در توافق با نتایج مطالعه حاضر، دسوزا و لوک (۸) نشان دادند که جیره حاوی اسید پالمیتیک سبب افزایش تولید شیر تصحیح شده برای چربی و انرژی (به مقدار ۵/۳۰ و ۴/۷۰ کیلوگرم در روز)، محتوای چربی شیر تا ۰/۴۱ درصد، تولید چربی و پروتئین شیر (تا ۲۸۰ و ۱۰۰ گرم در روز) شد. لذا به نظر می رسد که مکمل کردن اسید پالمیتیک در ۲۴ روز اول عامل تولید اسیدهای چرب ۱۶ کربنه از مسیر ساخت درون بافتی و پلازما و تشکیل چربی شیر می باشد. هارواتین و آلن (۱۱) بیان کردند پاسخ به مکمل سازی اسیدهای چرب اشباع و نااشباع در اواسط دوره شیردهی به مقدار تولید شیر بستگی دارد، به طوری که گاوهای پرتولید پاسخ بهتری به مکمل سازی اسیدهای چرب اشباع و گاوهای با پتانسیل تولید شیر کمتر پاسخ بهتری به مکمل سازی اسیدهای چرب نااشباع دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تولید چربی، پروتئین، درصد و تولید لاکتوز شیر تحت تأثیر جایگزینی نسبی یا کامل اسید استتاریک قرار نگرفت. دسوزا و همکاران (۶،۷) در توافق با نتایج این مطالعه گزارش کردند مکمل اسید پالمیتیک به تنهایی در مقایسه با نسبت های مختلف اسید پالمیتیک و استتاریک یا اسید پالمیتیک و اولئیک سبب افزایش تولید چربی شیر و شیر تصحیح شده برای چربی شد که بیشتر در نتیجه افزایش اسیدهای چرب ۱۶ کربن بود.

جدول ۳- اثر جایگزینی پالمیتیک اسید با اسید استتاریک بر مصرف ماده خشک، تولید شیر و ترکیب شیر

P-Value	خطی	SEM	جیره های آزمایشی			فراسنجه	
			100S	67S33P	33S67P		
0.238	0.91	0.70	22/96	23/59	23/50	22/88	ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)
0.56	0.57	1.10	35/78	34/75	36/01	36/31	تولید شیر (کیلوگرم در روز)
0.78	<0.05	0.96	34/89 ^D	35/14 ^{abD}	36/70 ^{abD}	37/47 ^{aD}	شیر تصحیح شده برای ۳/۵ درصد چربی (کیلوگرم در روز)
0.78	0.08	0.96	35/00	35/22	36/42	37/19	شیر تصحیح شده برای انرژی (کیلوگرم در روز)
0.55	0.05	0.12	3/35 ^D	3/75 ^{abD}	3/63 ^{abD}	3/70 ^a	چربی (درصد)
0.97	<0.05	0.04	1/20 ^D	1/34 ^{abD}	1/30 ^{abD}	1/34 ^a	چربی (کیلوگرم در روز)
0.50	0.52	0.04	3/04	3/13	3/01	3/05	پروتئین (درصد)
0.77	0.74	0.03	1/08	1/08	1/08	1/10	پروتئین (کیلوگرم در روز)
0.28	0.37	0.04	4/43	4/51	4/42	4/42	لاکتوز (درصد)
0.74	0.74	0.05	1/59	1/57	1/59	1/60	لاکتوز (کیلوگرم در روز)
0.82	<0.05	0.04	1/13 ^D	1/15 ^{abD}	1/31 ^{abD}	1/23 ^a	نسبت چربی به پروتئین

۱- جیره ۱۰۰P (۱۰۰ درصد اسید پالمیتیک)، ۳۳S۶۷P (۳۳ درصد اسید استتاریک و ۶۷ درصد اسید پالمیتیک)، ۶۷S۳۳P (۶۷ درصد اسید استتاریک و ۳۳ درصد اسید پالمیتیک) و ۱۰۰S (۱۰۰ درصد اسید استتاریک).

اسید چرب پالمیتیک و استتاریک در ماده خشک جیره گزارش کردند مکمل سازی چربی سبب کاهش گوارش پذیری کلی چربی ها و اسیدهای چرب ۱۸ کربن شد ولی بر گوارش پذیری ماده خشک مصرفی و الیاف شوینده خنثی اثری نداشت. اگرچه در پژوهش حاضر منبع چربی اسید پالمیتیک یا استتاریک یا نسبت های مختلف هر دو اسید چرب در جیره

اثر جیره های آزمایشی بر گوارش پذیری مواد مغذی
همان طور که در جدول ۴ نشان داده شده است گوارش پذیری ماده خشک، پروتئین، چربی و الیاف شوینده خنثی تحت تأثیر نسبت های مختلف اسید پالمیتیک و استتاریک قرار نگرفت. وسترن و همکاران (۳۴) با بررسی سه جیره بدون مکمل چربی یا حاوی ۱/۵ درصد اسید پالمیتیک یا ترکیب دو

در گاوهای تغذیه شده با منبع چربی پالم کمتر بود. به نظر می‌رسد جریان اسید استتاریک از طریق دوازدهه و گوارش پذیری روده‌ای آن عامل مهمی در کاهش قابلیت هضمی چربی می‌باشد. در توافق با یافته‌های لفتن و همکاران (۱۷) که بیان کردند ترکیب هر دو اسید چرب ۱۶ و ۱۸ کربن برای حمایت از تولید مطلوب شیر و سایر عملکردهای تولیدی و سلامتی گاوهای شیری نیاز است، نتایج پژوهش حاضر نشان داد مصرف خوراک، تولید شیر و شیر تصحیح شده برای چربی و گوارش‌پذیری در گاوهایی که ترکیب هر دو اسید چرب استتاریک و پالمیتیک را مصرف کرده بودند در مقایسه با گاوهایی که تنها با منبع چربی پالم تغذیه شده بودند مشابه بود. با این وجود یافته‌های دسوزا و همکاران (۸) به‌طور متناقضی نشان داد که ترکیب دو اسید چرب استتاریک و پالمیتیک (۴۰ درصد : ۴۰ درصد) سبب کاهش گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره، انرژی خالص شیردهی و عملکرد تولیدی حیوان شد و با افزایش سهم پالمیتیک به بیش از ۸۰ درصد و کاهش سهم استتاریک به پنج درصد اثر منفی کاهش یافت.

اثری بر گوارش‌پذیری مواد مغذی نداشت، وسترن و همکاران (۳۴) مشاهده نمودند که اسید پالمیتیک سبب افزایش گوارش‌پذیری ماده خشک مصرفی و الیاف شوینده خنثی به‌ترتیب به‌میزان ۳/۶ و ۴/۸ درصد شد. با این وجود، کمبرلین و دپتس (۴) با بررسی جیره‌های حاوی ۱۰۰ درصد پالمیتیک، ۱۰۰ درصد استتاریک یا ترکیب هر دو به نسبت ۶۶ و ۳۴ درصد نشان دادند که گوارش‌پذیری الیاف شوینده خنثی تحت تأثیر مکمل‌سازی جزئی یا کامل اسید پالمیتیک قرار نگرفت اما گوارش‌پذیری ماده آلی و چربی با افزایش سطح اسید استتاریک کاهش یافت. پیشتر اثر اسید پالمیتیک خالص بر افزایش گوارش‌پذیری چربی‌ها و اسیدهای چرب ۱۸ کربن در مطالعه وسترن و همکاران (۳۴) مشاهده شد در حالی که ترکیب اسید پالمیتیک و استتاریک چنین اثری نداشت. ریکو و همکاران (۲۴) و بوئرن و همکاران (۳) گزارش کردند با افزایش سطح اسیدهای چرب اشباع ۱۶ و ۱۸ کربن به‌ترتیب تا ۲/۲۵ و ۲/۳۰ درصد ماده خشک جیره گوارش‌پذیری چربی کاهش یافت ولی کاهش گوارش‌پذیری

جدول ۴- اثر جایگزینی اسید پالمیتیک با استتاریک بر گوارش‌پذیری مواد مغذی
Table 4. Effect of replacement of palmitic with stearic acid on nutrients digestibility

P-Value	خطی	SEM	جیره‌های آزمایشی				فراسنجه (درصد)
			100S	67S33P	33S67P	100P	
درجه دوم							
۰/۲۹	۰/۲۲	۱/۱۹	۷۲/۲۰	۷۱/۵۸	۷۲/۲۲	۷۳/۳۷	ماده خشک
۰/۳۶	۰/۷۰	۱/۷۴	۷۴/۶۹	۷۵/۸۹	۷۰/۷۳	۷۵/۳۷	پروتئین خام
۰/۳۶	۰/۸۶	۱/۴۱	۵۱/۴۵	۵۱/۷۵	۴۸/۹۱	۵۲/۰۰	الیاف شوینده خنثی
۰/۸۴	۰/۹۵	۱/۸۵	۷۶/۱۹	۷۹/۱۲	۷۵/۴۶	۷۷/۵۹	عصاره اتری

۱- جیره ۱۰۰P به‌عنوان شاهد (۱۰۰ درصد اسید پالمیتیک)، ۳۳S۶۷P (۳۳ درصد اسید استتاریک و ۶۷ درصد اسید پالمیتیک)، ۶۷S۳۳P (۶۷ درصد اسید استتاریک و ۳۳ درصد اسید پالمیتیک) و ۱۰۰S (۱۰۰ درصد اسید استتاریک).

($p > 0.05$) و فراسنجه وضعیت اکسیداتیو شامل MDA بین گاوهای تغذیه شده با اسید پالمیتیک، استتاریک یا نسبتی از هر دو اسید چرب به‌عنوان منبع چربی تفاوت معنی‌دار نداشت ($p > 0.05$). با این وجود غلظت NEFA در خون گاوهای تغذیه‌شده با 33S67P در مقایسه با 67S33P و 100S بیشتر بود ($p = 0.07$) ولی شاخص حساسیت انسولین بین جیره‌های آزمایشی مختلف تفاوت معنی‌دار نداشت ($p > 0.05$).

اثر جیره‌های آزمایشی بر فراسنجه‌های خونی
اثر نسبت‌های مختلف اسید پالمیتیک با استتاریک بر فراسنجه‌های خونی گاوهای مورد مطالعه در جدول ۵ نشان داده شده است. فراسنجه‌های خونی شامل گلوکز، انسولین، کلاسترول، تری‌گلیسرید، اوره و BHBA بین جیره‌های مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت ($p > 0.05$). آنزیم‌های کبدی AST، ALT و HDL تحت تأثیر نسبت‌های مختلف اسید پالمیتیک و استتاریک قرار نگرفت

جدول ۵- اثر جایگزینی اسید پالمیتیک با استتاریک بر فراسنجه‌های خونی
Table 5- Effect of replacement of palmitic with stearic acid on blood parameters

P-Value	خطی	SEM	جیره‌های آزمایشی				فراسنجه (درصد)
			100S	67S33P	33S67P	100P	
درجه دوم							
۰/۹۱	۰/۲۰	۱/۹۸	۵۹/۶۱	۶۱/۳۶	۵۵/۹۶	۵۷/۲۷	گلوکز (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۹۵	۰/۲۳	۱/۲۹	۱۳/۷۹	۱۲/۷۸	۱۲/۳۱	۱۱/۴۴	انسولین (میکروواحد در میلی لیتر)
۰/۳۰	۰/۱۱	۱/۱۴	۱۷/۹۴	۲۰/۱۲	۱۶/۴۹	۱۶/۱۱	تری گلیسرید (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۲۰	۰/۹۱	۲۵/۴۰	۳۴۹/۷۲	۳۰۳/۱۱	۲۷۴/۰۹	۲۵۵/۱۷	کلاسترول (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۹۲	۰/۳۴	۱/۰۷	۱۷/۳۲	۱۷/۳۲	۱۶/۲۵	۱۶/۰۵	نیترژن اوره ای (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۴۱	۰/۳۰	۳/۲۸	۶۳/۱۰	۶۳/۹۹	۶۲/۸۲	۵۷/۹۶	لیپوپروتئین با چگالی زیاد (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۹۴	۰/۶۲	۶/۴۰	۶۵/۹۵	۷۳/۸۵	۵۷/۷۰	۶۶/۵۳	آسپاراتات آمینو ترانسفراز (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۳۲	۰/۲۰	۳/۵۴	۳۸/۸۹	۴۴/۳۹	۳۷/۴۵	۳۵/۳۳	آلانین آمینو ترانسفراز (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۱۴	۰/۶۹	۰/۲۹	۱/۲۸	۲/۰۲	۱/۵۰	۱/۲۷	مالون دی آلدئید (نانو مول در لیتر)
۰/۹۲	۰/۰۷	۰/۰۲۱	۰/۱۷۳ ^d	۰/۱۴۰ ^d	۰/۲۳۳ ^{ad}	۰/۲۰۱ ^{ad}	اسیدهای چرب آزاد ^a (میلی مول در لیتر)
۰/۳۷	۰/۲۸	۰/۰۹۱	۰/۸۱۰	۰/۷۳۲	۰/۸۶۰	۰/۶۱۱	بتا‌هیدروکسی بوتیریک اسید ^b (میلی مول در لیتر)
۰/۸۱	۰/۷۳	۰/۰۲۲	۰/۴۹۱	۰/۴۸۲	۰/۴۹۱	۰/۴۷۰	شاخص حساسیت انسولین (RQUICKI)

۱- جیره ۱۰۰P به‌عنوان شاهد (۱۰۰ درصد اسید پالمیتیک)، ۳۳S۶۷P (۳۳ درصد اسید استتاریک و ۶۷ درصد اسید پالمیتیک)، ۶۷S۳۳P (۶۷ درصد اسید استتاریک و ۳۳ درصد اسید پالمیتیک) و ۱۰۰S (۱۰۰ درصد اسید استتاریک).

- 1- Aspartate amino transferase (AST) 2- Alanine amino transferase (ALT) 3- Malondialdehyde (MDA)
4- None esterified fatty acids (NEFA) 5- Beta hydroxy butyric acid (BHBA)

NEFA تا هشت درصد شدند و با افزایش سطح چربی جیره تمایل به کاهش بیشتری در اسیدهایی چرب آزاد خون مشاهده گردید. با این وجود مشابه پژوهش حاضر، سایر فراسنجه‌های خونی شامل گلوکز، BHBA و انسولین تحت تأثیر سطح اسید پالمیتیک قرار نگرفت.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد اسید استتاریک سبب کاهش درصد چربی شیر، نسبت چربی به پروتئین و تولید شیر تصحیح شده برای چربی شد. لذا در شرایطی که هدف استفاده از مکمل اسید استتاریک در جیره می‌باشد، برای حفظ درصد و تولید چربی شیر بهتر است از نسبت‌های ۳۳ و ۶۷ درصد اسید استتاریک با پالمیتیک در جیره استفاده شود.

پیشتر وسترن و همکاران (۳۴) گزارش کردند جیره‌های حاوی ۱/۵ درصد اسید پالمیتیک سبب افزایش NEFA شد و ترکیب دو اسید چرب پالمیتیک و استتاریک اثری بر سطح NEFA نداشت. همچنین سطح انسولین و BHBA نیز تحت تأثیر مکمل چربی یا نوع چربی جایگزین در جیره قرار نگرفت. افزایش سطح NEFA با افزایش سطح اسیدهایی چرب اشباع پیشتر نیز در مطالعات چوی و همکاران (۵) و پیانتونی و همکاران (۲۰) گزارش شده بود.

بر خلاف مشاهدات فوق، وانگ و همکاران (۳۲) گزارش کردند در گاوهای تحت تنش گرمایی افزایش سطح مکمل‌های چربی اشباع تا ۳ درصد، سبب کاهش سطح

منابع

- Allen, M.S. 2000. Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 83: 1598-1624.
- AOAC International. 2002. *Official Methods of Analysis*. Vol. 1. 17th ed. AOAC International, Arlington, VA.
- Boerman, J.P., J. De Souza and A.L. Lock. 2017. Milk production and nutrient digestibility responses to increasing levels of stearic acid supplementation of dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 100: 2729-2738.
- Chamberlain, M.B. and E.J. DePeters. 2017. Impacts of feeding lipid supplements high in palmitic acid or stearic acid on performance of lactating dairy cows. *Journal of Applied Animal Research*, 45: 126-135.
- Choi, S.H., G.O. Gang, J.E. Sawyer, B.J. Johnson, K.H. Kim, C.W. Choi and S.B. Smith. 2013. Fatty acid biosynthesis and lipogenic enzyme activities in subcutaneous adipose tissue of feedlot steers fed supplementary palm oil or soybean oil. *Journal of Animal Science*, 91: 2091-2098.
- De Souza, J. and A.L. Lock. 2018. Long-term palmitic acid supplementation interacts with parity in lactating dairy cows: Production responses, nutrient digestibility and energy partitioning. *Journal of Dairy Science*, 101: 3044-3056.
- De Souza, J., C.L. Preseault and A.L. Lock. 2017. Altering the ratio of dietary palmitic, stearic and oleic acids in diets with or without whole cottonseed affects nutrient digestibility, energy partitioning, and production responses of dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 101:172-185.
- De Souza, J. and A.L. Lock. 2019. Effects of timing of palmitic acid supplementation on production responses of early-lactation dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 102: 1-14.
- Enjalbert, F., M.C. Nicot, C. Bayourthe and R. Moncoulon. 1997. Duodenal infusions of palmitic, stearic or oleic acids differently affect mammary gland metabolism of fatty acids in lactating dairy cows. *Journal of Nutrition*, 128: 1525-1532.
- Enjalbert, F., M.C. Nicot, C. Bayourthe and R. Moncoulon. 2000. Effects of duodenal infusions of palmitic, stearic, or oleic acids on milk composition and physical properties of butter. *Journal of Dairy Science*, 83: 1428-1433.
- Harvatine, K.J and M.S. Allen. 2005. The effect of production level on feed intake, milk yield, and endocrine responses to two fatty acid supplements in lactating cows. *Journal of Dairy Science*, 88: 4018-4027.
- Harvatine, K.J., J.W. Perfield and D.E. Bauman. 2009. Expression of enzymes and key regulators of lipid synthesis is upregulated in adipose tissue during CLA-induced milk fat depression in dairy cows. *Journal of Nutrition*, 139: 849-854.
- Jenkins, T.C. 1993. Lipid metabolism in the rumen. *Journal of Dairy Science*, 76: 3851-3863.
- Haghighat Nejad, R., A.R. Yazdani and H. Rafiee. 2017. The Effective factors on production and profitability of milk in dairy cattle farms of Isfahan Township. *Research on Animal Production*, 8: 129-136.
- Kadzere, C.T., M.R. Murphy, N. Silanikove and E. Maltz. 2002. Heat stress in lactating dairy cows: A review. *Livestock Production Science*, 77: 59-91.
- Kuhla, B., C.C. Metges and H.M. Hammon. 2016. Endogenous and dietary lipids influencing feed intake and energy metabolism of periparturient dairy cows. *Domestic Animal Endocrinology*, 56: 2-10.
- Loften, J.R., J.G. Linn, J.K. Drackley, T.C. Jenkins, C.G. Soderholm and A.F. Kertz. 2014. Invited review: Palmitic and stearic acid metabolism in lactating dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 97: 4661-4674.
- Maia, M.R.G., L.C. Chaudhary, L. Figueres and R.J. Wallace. 2007. Metabolism of polyunsaturated fatty acids and their toxicity to the microflora of the rumen. *Antonie van Leeuwenhoek*, 91: 303-314.

19. Mc Carthy, M.M., T. Yasui, C.M. Ryan, G.D. Mechor and T.R. Overton. 2015. Performance of early-lactation dairy cows as affected by dietary starch and monensin supplementation. *Journal of Dairy Science*, 98: 3335-3350.
20. Piantoni, P., A.L. Lock and M.S. Allen. 2013. Palmitic acid increased yields of milk and milk fat and nutrient digestibility across production level of lactating cows. *Journal of Dairy Science*, 96: 7143-7154.
21. Piantoni, P., A.L. Lock and M.S. Allen. 2015. Milk production responses to dietary stearic acid vary by production level in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 98: 1-12.
22. Rico, J.E., M.S. Allen and A.L. Lock. 2013. Milk yield and milk fat responses to increasing levels of palmitic acid supplementation of dairy cows receiving low and high fat diets. *Journal of Dairy Science*, 96: 651-662.
23. Rico, J.E., M.S. Allen and A.L. Lock. 2014. Compared with stearic acid, palmitic acid increased the yield of milk fat and improved feed efficiency across production level of cows. *Journal of Dairy Science*, 97: 1057-1066.
24. Rico, J.E., J. De Souza, M.S. Allen and A.L. Lock. 2017. Nutrient digestibility and milk production responses to increasing levels of palmitic acid supplementation vary in cows receiving diets with or without whole cottonseed. *Journal of Animal Science*, 95: 436-446.
25. Samiei Zafarghandi, M., T. Ghoorchi, A. Asadi Alamouti, F. Ghanbari and M. Dehghan-Banadaky. 2019. The effects of palmitic, stearic acid and alpha-linolenic fatty acids on feed intake, milk production and milk components in Holstein fresh cows. *Journal of Ruminant Research*, 7(2): 129-144.
26. SAS Institute. 2001. SAS User's Guide. Statistics. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
27. Steele, W. and J.H. Moore. 1968. The effects of a series of saturated fatty acids in the diet on milk-fat secretion in the cow. *Journal of Dairy Research*, 35: 361-370.
28. Tzompa-Sosa, D.A., G.A. Van Aken, A.C.M. Van Hooijdonk and H.J.F. Van Valenberg. 2014. Influence of C16:0 and long-chain saturated fatty acids on normal variation of bovine milk fat triacylglycerol structure. *Journal of Dairy Science*, 97: 4542-4551.
29. Van Soest, P.J., J.B. Robertson and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*, 74: 3583-3597.
30. Varkoohi, S. 2016. Estimation of variance components for milk production traits in Iranian Holstein cows. *Research on Animal Production*, 7: 193-197.
31. Vatandoost, M., M. Didarkhah and F. Jamili. 2020. The Effect of different levels of soybean oil, soybean and canola meal on production performance, rumination activity and nutrient digestibility in Holstein dairy cows. *Research on Animal Production*, 10: 38-47.
32. Wang, J.P., D.P. Bu, J.Q. Wang, X.K. Huo, T.J. Guo, H.Y. Wei, L.Y. Zhou, R.R. Rastani, L.H. Baumgard and F.D. Li. 2010. Effect of saturated fatty acid supplementation on production and metabolism indices in heat-stressed mid-lactation dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 93: 4121-4127.
33. Weisbjerg, M.R., L. Wiking, N.B. Kristensen and P. Lund. 2008. Effects of supplemental dietary FA on milk yield and fatty acid composition in high and medium yielding cows. *Journal of Dairy Research*, 75: 142-152.
34. Western, M.M., J. De Souza and A.L. Lock. 2019. Effects of commercially available palmitic and stearic acid supplements on nutrient digestibility and production responses of lactating dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 103. (Article in press). doi.org/10.3168/jds.2019, 17242.

Response of Production Performance, Nutrient Digestibility and Blood Metabolic Indices to Different ration of Palmitic to Stearic Acid in Holstein Cows' Diet

Omid Ramezani Afarani¹, Abolfazl Zali² and Mehdi Dehghan Banadaky³

1- Ph.D. Student, University of Tehran

2- Associate Professor, University of Tehran (Corresponding author: a.zali@ut.ac.ir)

3- Professor, University of Tehran

Received: September 10, 2020

Accepted: November 9, 2020

Abstract

The experiment was conducted to investigate the effect of different ratio of palmitic acid to stearic acid in dairy cows diet. Total of 8 dairy cows (parity of 3.2 ± 0.6 , milk yield of 40 ± 3 kg/d and DIM of 56 ± 13) were randomly used in a 4×4 Latin square design over a 21-day experimental period. The experimental diets include different ratio of fat supplements were: 1-control diet 100P (100% palmitic acid), 2- 33S67P diet (33% stearic and 67% palmitic acid), 3-67S33P diet (67% stearic and 33% palmitic acid) and 4-100S diet (100% stearic acid). Individual dry matter intake and 3x milk production recorded at the last week of each period. Nutrients digestibility measured during 3 days of last week of experiment by collecting fecal from rectum before morning milking. The blood samples at d 19 taken from tail vein were used for metabolites and hormones analyze. The results showed that dry matter intake, digestibility of DM, fat, protein, NDF, milk and ECM yield, milk protein and lactose yield and percentage were not affected by different ratio of palmitic acid to stearic acid. Replacing palmitic acid with stearic acid caused decrease in FCM, fat percentage and fat/protein ratio ($p < 0.05$). The concentration of plasma NEFA tended to be higher in cows fed 33S67P compared to 67S33P and 100S diets ($p = 0.07$). In conclusion, present results showed that increasing diet stearic acid level led to decrease in milk fat and lactose percentage, without effects on milk yield efficiency.

Keywords: Fat supplement, Lactating cows, Palmitic acid, Stearic acid