



## مقایسه اثرات استراتژی‌های متفاوت انتخاب بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم

پاراخات برزین<sup>۱</sup>، سیدضیاءالدین میرحسینی<sup>۲</sup>، شهلا نعمت‌اللهیان<sup>۳</sup>، محمد ناصرائی<sup>۴</sup> و علیرضا صیداوی<sup>۵</sup>

۱ و ۴- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و کارشناس ارشد، دانشگاه گیلان  
۲- استاد، دانشگاه گیلان، (نویسنده مسول: mirhosin@guilan.ac.ir)  
۳- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، رشت، ایران  
۵- دانشیار، گروه علوم دامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران،  
تاریخ دریافت: ۹۱/۸/۲۳ تاریخ پذیرش: ۹۳/۷/۱۷

### چکیده

هدف از این تحقیق برآورد مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات پيله کرم ابریشم با مدل تک متغیره و چند متغیره و مقایسه میانگین صفات تولیدی و مقاومت بین سه استراتژی مختلف انتخاب در دو لاین تجاری ۱۵۳ و ۱۵۴ کرم ابریشم ایران بود. پارامترهای ژنتیکی صفات وزن پيله، وزن قشر پيله و درصد قشر پيله پس از سه نسل انتخاب برای هر یک از این صفات با استفاده از نرم‌افزار WOMBAT و الگوریتم REML برآورد گردید. مبنای انتخاب شامل شاخص انتخاب معمولی سه صفتی (A) و شاخص انتخاب پایه سه صفتی (B) بر اساس وزن پيله، وزن قشر پيله و درصد قشر پيله دیده شد. به این منظور، از اطلاعات جمع‌آوری شده از دو لاین تجاری ۱۵۳ و ۱۵۴ در مرکز تحقیقات ابریشم کشور در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، استفاده شد. به‌طور کلی نتایج مقایسه میانگین، نشان داد که استراتژی A در جهت بهبود تمامی صفات تولیدی، می‌تواند قابل توصیه باشد و رشد ژنتیکی کل حاصل از سه نسل انتخاب برای تمامی صفات در استراتژی A در لاین ۱۵۳ بیشتر از لاین ۱۵۴ بود. با توجه به وراثت‌پذیری بالای صفات مورد مطالعه در آنالیزهای تک صفتی و چندمتغیره، می‌توان استنباط کرد که اثرات افزایشی ژنی، عموماً تأثیر زیادی روی ارزش‌های فنوتیپی این صفات دارند و در نتیجه بهبود این صفات در برنامه‌های اصلاحی امکان‌پذیر خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: پارامترهای ژنتیکی، رشد ژنتیکی، شاخص انتخاب پایه سه صفتی، شاخص انتخاب معمولی سه صفتی، کرم ابریشم

### مقدمه

صفات مربوط به پيله ابریشمی، صفات مهم اقتصادی در کرم ابریشم هستند. این صفات، وراثت‌پذیری بالایی دارند و در نتیجه، انتخاب در مورد این صفات تأثیر بالایی دارد (۱۲). به‌گونه‌ای که در اکثر سیستم‌های قیمت‌گذاری، ارزش اقتصادی پرورش کرم ابریشم به وزن پيله تولیدی، وزن قشر پيله و درصد قشر پيله بستگی دارد (۱۳). انتخاب برای رشد اقتصادی این صفات که نقش مهمی در عایدی پرورش‌دهندگان کرم ابریشم ایفا می‌کنند، بسیار مهم و ارزشمند است. لذا مطالعه ژنتیکی این صفات کمی در واریته‌های تجاری ضروری است (۱۸، ۱۷، ۶). راه‌های متعددی برای انتخاب صفات وجود دارند، اما اغلب به یک اندازه کارآمد نیستند. کارآمدترین روش، روشی است که منجر به حداکثر پیشرفت ژنتیکی در واحد زمان گردد. هیزل (۸) شاخص انتخاب را با توجه به مبنای ژنتیکی و اقتصادی تشکیل داد. انتخاب بر اساس شاخص علاوه بر این که سبب افزایش سود حاصل از صفات موجود در معادله ارزش ژنوتیپی کل می‌گردد، ضمناً سبب پیشرفت ژنتیکی صفات نیز می‌شود (۱۴، ۲). شاخص انتخاب نسبت به روش انتخاب پی در پی برای بهبود ژنوتیپ‌ها به‌ویژه صفات دارای همبستگی منفی کارآمدتر است. شاخص معمولی یک ترکیب خطی از  $k$  صفت می‌باشد که به هریک از آن‌ها، با ضرایبی ثابت ارزش یا وزن داده شده است. از طرفی اشتباهات ناشی از برآورد پارامترها در جمعیت‌های کوچک به‌قدری بزرگ هستند که می‌توانند باعث

اشتباه زیادی در پیش بینی پیشرفت‌ها از نظر تئوریک و کاهش کارایی شاخص شوند. در این حالات که برآورد صحیح پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی قابل استفاده و امکان‌پذیر نباشند، بریم و همکاران (۳) شاخصی پیشنهاد کردند که فنوتیپ هر صفت، مستقیماً در ارزش اقتصادی آن ضرب می‌شود. ویلیامز (۲۱) این فرمول را شاخص پایه نامید. همچنین پارامترهای ژنتیک جمعیت و ارزش‌های اقتصادی صفات، پارامترهای ورودی اصلی برای تشکیل شاخص‌ها می‌باشند. تعیین این پارامترها یک رویه دائمی است، چرا که شرایط اقتصادی و اصلاحی به تغییرات حساس هستند و نژادها دست‌خوش پیشرفت پایدار می‌گردند (۲۰). ارزش‌های اقتصادی تابعی از درآمدها و مخارج یک سیستم تولیدی هستند و تغییر در این فاکتورها ممکن است موجب تغییر ارزش‌های اقتصادی صفات گردد (۲). مطالعات کمی روی تعیین شاخص‌های انتخاب بهتر بر اساس اهمیت صفات روی کرم ابریشم، انجام شده است. دانشمندان انتخاب چند صفتی برای وزن پيله، وزن قشر پيله و نسبت قشر پيله را با استفاده از روش شاخص انتخاب و سطوح حذفی مستقل مورد بررسی قرار دادند (۱۵). آن‌ها در نتایج خود گزارش کردند که اثر متقابل معنی‌داری بین روش انتخاب و نژاد، با نسل و نیز جنس وجود ندارد. محققان دیگری هم پس از برآورد ضریب اقتصادی صفات با استفاده از یک مدل قطعی به روش استاندارد و با توجه به وضعیت تولیدی و اقتصادی پيله در ایران، تأثیر انتخاب به‌وسیله شاخص بر پیشرفت ژنتیکی و

دقت یک هزارم انجام پذیرفت. پارامترهای ژنتیکی و محیطی جمعیت برای صفات ذکر شده، به روش REML بر اساس مدل حیوان تک صفتی، دوصفتی و سه صفتی، با نرم‌افزار Ver. 1.1 WOMBAT (۱۱) برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل ژنتیکی اطلاعات از مدل آماری زیر استفاده گردید:

$$y_{ijkl} = \mu + S_i + G_j + A_k + e_{ijkl}$$

در این مدل آماری  $y_{ijkl}$ : مقدار مشاهده،  $\mu$ : میانگین صفت نام،  $S_i$ : اثر جنس نام،  $G_j$ : اثر نسل نام،  $A_k$ : اثر ارزش ژنتیکی افزایشی حیوان نام و  $e_{ijkl}$ : اثر عوامل باقی مانده می‌باشند. در این مدل اثر جنس و نسل ثابت و ارزش ژنتیکی افزایشی حیوان تصادفی می‌باشند.

### نتایج و بحث

آماره‌های توصیفی صفات تولیدی کرم ابریشم لاین ۱۵۳ و ۱۵۴ به تفکیک زیر جمعیت‌ها و جنسیت به ترتیب در جداول ۱ و ۲ ارائه شده است. همچنین، خلاصه آماری داده‌های صفات اقتصادی پیله زیرجمعیت‌های شاهد در لاین‌های ۱۵۳ و ۱۵۴ در جدول ۳ نمایش داده شده است. در بین زیر جمعیت‌های لاین ۱۵۴، از نظر وزن پیله، زیر جمعیت A دارای بیشترین میانگین و زیر جمعیت شاهد دارای کمترین میانگین بود. از نظر صفت وزن قشر پیله، زیر جمعیت‌های A و B دارای بیشترین میانگین و زیر جمعیت شاهد (G) از کمترین میانگین برخوردار بود. در هر دو لاین و نیز در همه زیر جمعیت‌ها مشاهده می‌شود که وزن قشر پیله در جنس ماده بیشتر از جنس نر است. اما درصد قشر پیله جنس نر بیشتر از جنس ماده است. بالاتر بودن درصد قشر پیله در جنس نر به‌طور عمده می‌تواند ناشی از وزن شفیره پایین تر نسبت به جنس ماده باشد (۱۶،۹). همچنین، زیر جمعیت A دارای کمترین میانگین برای درصد قشر پیله بود. در گروه شاهد لاین ۱۵۳ نیز میانگین صفات پیله نسبت به گروه شاهد لاین ۱۵۴ بیشتر است. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، میزان تنوع فنوتیپی وزن قشر پیله بیشترین، و میزان تنوع درصد قشر پیله کمترین مقدار را به خود اختصاص داده‌اند. تنوع فنوتیپی وزن پیله نیز مابین تنوع دو صفت دیگر قرار دارد. میزان تنوع فنوتیپی در میزان پاسخ به انتخاب مؤثر است (۲). مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی زیر جمعیت A در لاین‌های ۱۵۳ و ۱۵۴ در جداول ۴ و ۵ ارائه شده است. در آنالیز داده‌ها با مدل سه صفتی وراثت‌پذیری‌های بالایی برای دو صفت وزن پیله و وزن قشر پیله (به ترتیب  $0.734 \pm 0.041$ ) و  $(0.703 \pm 0.042)$  و وراثت‌پذیری متوسطی برای درصد قشر پیله  $(0.396 \pm 0.041)$  برآورد شد. در آنالیزهای تک صفتی، دو و سه صفتی، در لاین ۱۵۴ همه صفات دارای وراثت‌پذیری بالایی بودند و بیان‌گر آن است که این صفت در کارایی انتخاب اهمیت زیادی دارند و بخش اعظم تنوع مشاهده شده به نسل‌های بعد قابل انتقال است.

عملکرد فنوتیپی صفات اقتصادی ۶ لاین تجاری کرم ابریشم ایران و آمیخته‌های حاصل از آن‌ها را بررسی و گزارش کردند که انتخاب از راه شاخص در لاین‌ها تأثیر معنی‌داری بر بهبود عملکرد تولیدی آمیخته‌های کرم ابریشم دارد (۱۴). البته کاربرد روش شاخص انتخاب مستلزم انجام رکوردگیری‌های انفرادی و صرف وقت و هزینه زیادی هم هست. زیاد بودن تعداد رکوردها، احتمال بروز خطای رکوردگیری را افزایش داده و کارایی این روش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این تعیین ضرایب اقتصادی صفات نیز کاربرد این روش را محدود می‌کند. اگرچه استفاده از شاخص پایه در مقایسه با شاخص معمولی، موجب کاهش هزینه‌های محاسباتی و سهولت کاربرد می‌شود، اما در این روش همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات در محاسبات وارد نشده و کارایی این روش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در تعیین استراتژی انتخاب مناسب باید عوامل مختلفی مانند نوع و تعداد صفات و اهمیت اقتصادی آن‌ها، وراثت‌پذیری و همبستگی ژنتیکی بین صفات، میزان پاسخ ژنتیکی و اقتصادی به انتخاب، هدف اصلاح نژاد، نوع وارثه، امکانات موجود و شرایط تولیدی و اقتصادی را مد نظر قرار داد (۷). بر این اساس، هدف از این مطالعه، بررسی کارایی دو روش شاخص انتخاب معمولی و پایه سه صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم بود.

### مواد و روش‌ها

این پژوهش در مرکز تحقیقات ابریشم کشور طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۴ به مدت شش سال انجام شد. مبنای انتخاب شامل شاخص انتخاب معمولی سه صفتی (بر اساس وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله) (A) و شاخص انتخاب پایه سه صفتی (بر اساس وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله) (B) (مجموع حاصل ضرب ضرایب اقتصادی در فنوتیپ تصحیح شده هر صفت) و هم چنین آمیزش تصادفی (گروه شاهد) یا (G) بود. به این منظور، از اطلاعات جمع‌آوری شده از دو لاین تجاری ۱۵۳ و ۱۵۴ که به ترتیب لاین‌هایی با منشأ ژاپنی و چینی هستند و در خط تولید قرار دارند، استفاده شد. لاین‌های مذکور که در سال ۱۳۸۳ به بانک ژن معرفی شدند، در حال حاضر برای تکثیر تخم نوغان و تولید تخم نوغان آمیخته تجاری در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از تشکیل جامعه مینا، از هر لاین دو دسته و در هر دسته به‌طور جداگانه، پیله‌های برتر برای وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله به مدت سه نسل مورد انتخاب به‌روش شاخص معمولی و پایه سه صفتی، قرار گرفتند. شدت انتخاب (۱۰٪) در هر دو جنس یکسان در نظر گرفته شد. در گروه‌های شاهد در لاین‌ها هیچ‌گونه انتخابی صورت نگرفت و پروانه‌های آن‌ها به‌صورت تصادفی آمیزش داده شد. رکوردگیری صفات مربوطه هم طبق دستورالعمل و پروتکل‌های استاندارد اعلام شده از طریق مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور با استفاده از ترازوی دیجیتالی با

جدول ۱- خلاصه آماری داده‌های صفات اقتصادی پیله زیرجمعیت‌های لاین ۱۵۳

Table 1. Statistical summary of economical data of cocoon traits in sup-populations of pure line 153

کشیده‌گی	چولگی		ضرب تغییرات		انحراف معیار		میانگین		صفت	
	ماده	نر	ماده	نر	ماده	نر	ماده	نر		
A	۰/۳۴۸	۰/۰۰۳	۰/۱۹۷	۰/۳۱۹	۱۴/۷۸۲	۱۳/۲۴۳	۰/۲۵۶	۰/۱۹۱	۱/۷۳۴	وزن پیله (گرم)
	۰/۵۷۳	۰/۱۸۶	۰/۵۹	۰/۵۰۴	۱۶/۴۵۴	۱۵/۴۶	۰/۰۵۵	۰/۰۵	۰/۳۳۵	وزن قشر (گرم)
	۳۲/۹۶	۱/۵۲۶	۳/۰۵	۰/۰۷۲	۹/۶۴۹	۸/۰۹۶	۱/۸۶۷	۱/۸۲۴	۱۹/۳۵۴	درصد قشر
B	۰/۳۴۷	۰/۴۶۴	۰/۳۹۲	۰/۴۱۱	۱۵/۱۲	۱۲/۶۰۴	۰/۲۵۶	۰/۱۷۶	۱/۶۹۷	وزن پیله (گرم)
	۰/۷۶۰	۰/۵۶۷	۰/۵۲۶	۰/۴۷۰	۱۷/۱۱۲	۱۴/۷۰۹	۰/۰۵۶	۰/۰۴۶	۰/۳۲۹	وزن قشر (گرم)
	۳/۴۳۱	۳/۷۰۸	۰/۰۷۰	۰/۴۴۷	۶/۷۸۵	۶/۸۳۷	۱/۳۱۷	۱/۵۵۴	۱۹/۴۲۲	درصد قشر

جدول ۲- خلاصه آماری داده‌های صفات اقتصادی پیله زیرجمعیت‌های لاین ۱۵۴

Table 2. Statistical summary of economical data of cocoon traits in sup-populations of pure line 154

کشیده‌گی	چولگی		ضرب تغییرات		انحراف معیار		میانگین		صفت	
	ماده	نر	ماده	نر	ماده	نر	ماده	نر		
A	۰/۵۰۹	۰/۴۴۶	۰/۱۸۸	۰/۰۷	۱۳/۹۲۸	۱۳/۲۴	۰/۲۲۹	۰/۱۷۳	۱/۶۴۵	وزن پیله (گرم)
	۱/۴	۰/۴۱۵	۰/۴۰۲	۰/۲۳۳	۱۴/۴۱۹	۱۳/۸۹۸	۰/۰۴۲	۰/۰۳۹	۰/۲۹۲	وزن قشر (گرم)
	۲۵/۹۰۳	۳/۱۴۲	۲/۳۹۵	۰/۷۵۲	۸/۱۳۳	۷/۹۱۵	۱/۴۴۶	۱/۷۲۴	۱۷/۸	درصد قشر
B	۰/۰۸۴	۰/۴۸۶	۰/۰۹۵	۰/۲۲۶	۱۳/۲۶۱	۱۱/۶۴۶	۰/۲۱۲	۰/۱۵۰	۱/۶۰۳	وزن پیله (گرم)
	۰/۴۳۴	۰/۳۳۲	۰/۰۹۵	۰/۰۰۲	۱۳/۹۶	۱۲/۴۶	۰/۰۴	۰/۰۳۵	۰/۲۸۹	وزن قشر (گرم)
	۵/۰۰	۶/۶۲	۰/۶۲	۰/۷۹۷	۹/۴۵۴	۷/۷۳۹	۱/۷۱۳	۱/۷۱۱	۱۸/۱۲۵	درصد قشر

جدول ۳- خلاصه آماری داده‌های صفات اقتصادی پیله زیرجمعیت‌های شاهد در لاین‌های ۱۵۳ و ۱۵۴

Table 3. Statistical summary of economical data of cocoon traits in control sup-populations of pure lines 153 and 154

کشیده‌گی	چولگی		ضرب تغییرات		انحراف معیار		میانگین		صفت	لاین
	ماده	نر	ماده	نر	ماده	نر	ماده	نر		
۱۵۳	۱/۲۴	۱/۵۴۶	۰/۵۲۶	۰/۶۱۳	۱۳/۹۹	۱۲/۶۳	۰/۲۱۵	۰/۱۶۱	۱/۵۴۱	وزن پیله (گرم)
	۵/۸۷	۲/۶۶	۱/۲۸۳	۰/۶۳۵	۱۶/۱۶	۱۴/۵۹	۰/۰۴۸	۰/۰۴۱	۰/۲۹۷	وزن قشر (گرم)
	۳۳/۲	۱۱/۳۲	۲/۸۵۹	۰/۲۹۴	۸/۹۷	۸/۶۹	۱/۷۳۵	۱/۹۵	۱۹/۳۲۹	درصد قشر
۱۵۴	۰/۵۰۳	۲/۰۰	۰/۰۴۲	۰/۵۳۶	۱۰/۷۵	۹/۹۸	۰/۱۶۳	۰/۱۲۲	۱/۵۲	وزن پیله (گرم)
	۲/۱۲	۰/۹۶	۰/۴۹۷	۰/۰۸	۱۱/۷۴	۱۱/۰۵	۰/۰۳۲	۰/۰۲۹	۰/۲۷۲	وزن قشر (گرم)
	۷/۳۷	۴/۸۵	۱/۴۸۹	۰/۰۲۷	۷/۷۳	۸/۰۷	۱/۳۸۴	۱/۷۷	۱۷/۹۴۴	درصد قشر

جدول ۴- مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی ( $\pm$  انحراف معیار) برآورد شده صفات پیله با مدل تک متغیره و چند متغیره برای لاین ۱۵۳ در حالت انتخاب به روش شاخص معمولی سه صفتی

Table 4. Estimated variance components and genetics parameters ( $\pm$  standard deviation) of cocoon traits by uni and multi variable for pure line 153 in selection as 3-trait index

نوع آنالیز	صفت	واریانس ژنتیکی	واریانس محیطی	واریانس فنوتیپی	وراثت پذیری
یک صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۶۶۹(۰/۰۰۱۵)	۰/۰۰۶۵(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۲۳۲۴(۰/۰۰۰۹)	۰/۷۱۸(۰/۰۴۳)
	وزن قشر	۰/۰۰۱۲۶(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۳۴(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۱۶۰۹(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۷۸۶(۰/۰۳۹)
	درصد قشر	۰/۳۳۹۹(۰/۱۲۲۱)	۱/۹۷۹۲(۰/۱)	۲/۳۰۹۲(۰/۰۸۰۲)	۰/۱۴۳(۰/۰۵۰)
دو صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۶۸۱۲(۰/۰۰۱۴)	۰/۰۰۶۴۷(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۲۳۲۸۶(۰/۰۰۰۹۲)	۰/۷۲۲(۰/۰۴۲)
	وزن قشر	۰/۰۰۱۲۷(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۳۴(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۱۶۱۳(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۷۸۹(۰/۰۳۹)
	وزن پیله	۰/۰۱۶۹۷(۰/۰۰۱۴)	۰/۰۰۰۳۹(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۲۳۳۶(۰/۰۰۰۹۲)	۰/۷۲۶(۰/۰۴۱)
	وزن قشر	۰/۳۸۵۶(۰/۱۳۵۳)	۱/۹۴۲۳۳(۰/۱۰۵۵)	۲/۳۲۷۸۳(۰/۰۸۳۷)	۰/۱۶۶(۰/۰۵۵)
	وزن پیله	۰/۰۰۱۱۲(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۴۲(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۰۰۱۵۴(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۷۲۵(۰/۰۴۶)
	وزن قشر	۰/۶۰۵۹۷(۰/۱۶۳۶)	۱/۷۹۶۳۷(۰/۱۱۵۷)	۲/۴۰۲۳۵(۰/۰۹۳۵)	۰/۲۵۲(۰/۰۶۱)
سه صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۷۳۱(۰/۰۰۱۴)	۰/۰۰۶۲۲(۰/۰۰۰۸۱)	۰/۰۲۳۴۴(۰/۰۰۰۹)	۰/۳۴(۰/۰۴۱)
	وزن قشر	۰/۰۰۱۰۶(۰/۰۰۰۰۹)	۰/۰۰۰۴۴(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۱۵۱(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۳(۰/۰۴۲)
	درصد قشر	۰/۹۸۳۶۷(۰/۱۲۴۷)	۱/۴۹۹۴۴	۲/۴۸۳۱۱(۰/۰۸۶۵)	۰/۳۹۶(۰/۰۴۱)

جدول ۵- مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی ( $\pm$  انحراف معیار) برآورد شده صفات پیله از طریق مدل تک متغیره و چند متغیره برای لاین ۱۵۴ در حالت انتخاب به روش شاخص معمولی سه صفتی

Table 5. Estimated variance components and genetics parameters ( $\pm$  standard deviation) of cocoon traits by uni and multi variable for pure line 154 under selection as 3-trait index

نوع آنالیز	صفت	واریانس ژنتیکی	واریانس محیطی	واریانس فنوتیپی	وراثت‌پذیری
یک صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۶۳۶(۰/۰۰۱۵)	۰/۰۰۵۵(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۲۱۸۷(۰/۰۰۰۹)	۰/۷۴۸(۰/۰۴۵)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۱(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۰۰۰۱۹(۰/۰۰۰۰۳)	۰/۰۰۱۲(۰/۰۰۰۰۴)	۰/۸۴(۰/۰۳)
	درصد قشر	۲/۴۳۳۳(۰/۱۷۳۹)	۰/۵۰۸۷(۰/۰۸۹)	۲/۹۴۲(۰/۱۱۱۹)	۰/۸۲۴(۰/۰۳۴)
دو صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۶۳۱(۰/۰۰۱۵۳)	۰/۰۰۵۵۳(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۲۱۸۴(۰/۰۰۰۹)	۰/۷۴۷(۰/۰۴۵)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۹۹(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۰۰۰۲۰(۰/۰۰۰۰۳)	۰/۰۰۱۱۹(۰/۰۰۰۰۴)	۰/۸۳(۰/۰۳۱)
	وزن پیله	۰/۰۱۶۳۴(۰/۰۰۱۵)	۰/۰۰۵۵۱(۰/۰۰۰۸۳)	۰/۰۲۱۸۶(۰/۰۰۰۹)	۰/۷۴۸(۰/۰۴۵)
سه صفتی	وزن قشر	۲/۴۳۰۱(۰/۱۷۳)	۰/۵۰۹۴۵(۰/۰۸۸۶)	۲/۹۳۹۶(۰/۱۱۱۶)	۰/۸۲۷(۰/۰۳۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۱(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۰۰۰۱۹(۰/۰۰۰۰۳)	۰/۰۰۱۲(۰/۰۰۰۰۴)	۰/۸۳۸(۰/۰۳۰)
	درصد قشر	۲/۳۷۷۲(۰/۱۷۷۲)	۰/۵۳۷۴(۰/۰۹۲۱)	۲/۹۱۴۶(۰/۱۱۲۱)	۰/۸۱۶(۰/۰۳۶)
سه صفتی	وزن پیله	۰/۱۶۵۲(۰/۰۰۱۵)	۰/۰۰۵۴۲(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۲۱۹۵(۰/۰۰۰۸)	۰/۷۵۳(۰/۰۴۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۹۵(۰/۰۰۰۰۷)	۰/۰۰۰۶۳۸(۰/۰۰۰۰۳)	۰/۰۰۱۱۷(۰/۰۰۰۰۴)	۰/۸۰۷(۰/۰۳۶)
	درصد قشر	۱/۸۴۱۹(۰/۱۹۵۹)	۰/۸۴۳۴۶(۰/۱۱۳۸)	۲/۶۸۵۳۹(۰/۱۱۰۵۵)	۰/۶۸۶(۰/۰۵۰)

قشر در لاین ۱۵۳، ( $0/31 \pm 0/46$ )، انتظار می‌رود در صورت برنامه‌ریزی یکسان برای هر دو لاین، بهبود این صفت در لاین ۱۵۳ به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود صفات در هر دو لاین، باید متفاوت باشد. در هر دو لاین وراثت‌پذیری وزن پیله نسبت به دو صفت دیگر بیشتر است.

مؤلفه‌های واریانس و وراثت‌پذیری صفات پیله زیر جمعیت B لاین‌های مورد مطالعه در جداول ۶ و ۷ نشان داده شده است. در آنالیز دو صفتی بیشترین و کمترین مقدار وراثت‌پذیری در لاین ۱۵۳ به ترتیب مربوط به وزن پیله ( $0/549 \pm 0/064$ ) و درصد قشر پیله ( $0/082 \pm 0/031$ ) است. در آنالیز سه صفتی نیز وراثت‌پذیری بالایی برای صفات سه گانه فوق برآورد گردید. با توجه به وراثت‌پذیری پایین درصد

جدول ۶- مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی ( $\pm$  انحراف معیار) برآورد شده صفات پیله از طریق مدل تک متغیره و چند متغیره برای لاین ۱۵۳ در حالت انتخاب به روش شاخص پایه سه صفتی

Table 6. Estimated variance components and genetics parameters ( $\pm$  standard deviation) of cocoon traits by uni and multi variable for pure line 153 under selection as 3-trait base index

نوع آنالیز	صفت	واریانس ژنتیکی	واریانس محیطی	واریانس فنوتیپی	وراثت‌پذیری
یک صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۲۵۲(۰/۰۰۱۹)	۰/۰۱۰۳۴(۰/۰۰۱۱)	۰/۰۲۲۸۶(۰/۰۰۱)	۰/۵۵۱(۰/۰۶۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۸(۰/۰۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۰۸۳(۰/۰۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۱۶(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۴۷۴(۰/۰۶۱)
	درصد قشر	۰/۲۱۵۲(۰/۰۰۸۲۷)	۲/۴۴۶۹(۰/۰۹۴۶)	۲/۸۸۸۸(۰/۱۰۵)	۰/۳۱(۰/۰۴۶)
دو صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۲۵۵(۰/۰۰۱۹)	۰/۰۱۰۳۱(۰/۰۰۱۱)	۰/۰۲۲۸۷(۰/۰۰۱۳)	۰/۵۴۹(۰/۰۶۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۵۹(۰/۰۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۹۵(۰/۰۰۰۰۸)	۰/۰۰۱۵۵(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۴۸۴(۰/۰۶۸)
	وزن پیله	۰/۰۱۲۵۱(۰/۰۰۱۹)	۰/۰۱۰۳۴(۰/۰۰۱۱)	۰/۰۲۲۸۶(۰/۰۰۱)	۰/۵۴۸(۰/۰۶۴)
سه صفتی	درصد قشر	۰/۲۱۷۴۴(۰/۰۰۸۴)	۲/۴۴۵۴(۰/۰۹۵۱)	۲/۶۶۲۸۷(۰/۰۸۵۳)	۰/۰۸۲(۰/۰۳۱)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۶۸(۰/۰۰۰۱۲)	۰/۰۰۰۰۸۹(۰/۰۰۰۰۸)	۰/۰۰۰۱۵۸(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۴۳۵(۰/۰۶۷)
	درصد قشر	۰/۲۷۳۱۴(۰/۱۰۰۰۸)	۲/۴۰۷۴(۰/۱۰۰۰۴)	۲/۶۸۰۵(۰/۰۸۸۲۲)	۰/۱۰۲(۰/۰۳۶)
سه صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۲۶۱(۰/۰۰۱۹)	۰/۰۱۰۳۸(۰/۰۰۱۱)	۰/۰۲۲۸۹(۰/۰۰۱)	۰/۵۵۱(۰/۰۶۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۶۷(۰/۰۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۰۸۴(۰/۰۰۰۰۷)	۰/۰۰۰۱۶(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۴۷۴(۰/۰۶۱)
	درصد قشر	۰/۸۹۴۶۷(۰/۱۵۴)	۱/۹۹۴۲(۰/۱۱۱۹)	۲/۸۸۸۸(۰/۱۰۵)	۰/۳۱(۰/۰۴۶)

جدول ۷- مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی ( $\pm$  انحراف معیار) برآورد شده صفات پیله از طریق مدل تک متغیره و چند متغیره برای لاین ۱۵۴ در حالت انتخاب به روش شاخص پایه سه صفتی

Table 7. Estimated variance components and genetics parameters ( $\pm$  standard deviation) of cocoon traits by uni and multi variable for pure line 154 under selection as 3-trait base index

نوع آنالیز	صفت	واریانس ژنتیکی	واریانس محیطی	واریانس فنوتیپی	راثت‌پذیری
یک صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۷۶۲(۰/۰۰۲۱)	۰/۰۰۷۱۲(۰/۰۰۱۱)	۰/۰۲۴۷۵(۰/۰۰۱۱)	۰/۷۱۲(۰/۰۸۵)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۸۷(۰/۰۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۰۳(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۰۰۰۱۲۱(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۷۱۷(۰/۰۶۲)
	درصد قشر	۰/۳(۰/۰۰۸۵)	۲/۸۸۹۲(۰/۱۱۳)	۳/۱۸۹۳(۰/۱)	۰/۰۹۴(۰/۰۳۳)
دو صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۶۶۷(۰/۰۰۱۹۳)	۰/۰۰۷۷(۰/۰۰۱۰)	۰/۰۲۴۳۷(۰/۰۰۱۰)	۰/۶۸۴(۰/۰۵۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۷۷(۰/۰۰۰۰۹)	۰/۰۰۰۰۴(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۱۱۷۷(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۶۵۸(۰/۰۵۷)
	وزن پیله	۰/۰۱۷۸۷(۰/۰۰۰۱۸۶)	۰/۰۰۶۹۶(۰/۰۰۱۰۴)	۰/۰۲۴۸۳(۰/۰۰۱۰۶)	۰/۷۱۹(۰/۰۵۰)
سه صفتی	درصد قشر	۰/۳۱۲۶۸(۰/۱۱۰۶)	۲/۸۸۱۲۸(۰/۱۱۳۵)	۳/۱۹۳۹۷(۰/۱۰۰۸)	۰/۰۹۸(۰/۰۳۳)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۸۱(۰/۰۰۰۰۹)	۰/۰۰۰۰۳۷(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۱۱۹(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۶۸۴(۰/۰۵۶)
	درصد قشر	۰/۴۳۶۱۲(۰/۱۳۴۵)	۲/۸۰۱۸(۰/۱۲۰۴۶)	۳/۲۲۸(۰/۱۰۶۵)	۰/۱۲۵(۰/۰۳۹)
سه صفتی	وزن پیله	۰/۰۱۹۰۳(۰/۰۰۱۸)	۰/۰۰۰۲۲۴(۰/۰۰۰۰۹۸)	۰/۰۲۵۲۵(۰/۰۰۱۰۵)	۰/۷۵۴(۰/۰۴۶)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۰۸۳(۰/۰۰۰۰۹)	۰/۰۰۰۰۳۶(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۰۱۱۹۶(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۶۹۶(۰/۰۵۵)
	درصد قشر	۱/۱۵۸۱۹(۰/۲۰۱۸)	۲/۳۳۴۳(۰/۱۳۹۸)	۳/۴۶۴۵۳(۰/۱۲۸۵۹)	۰/۳۳۱(۰/۰۵۰)

ارزش‌های وارینانس می‌باشد و بهبود این صفات در برنامه‌های اصلاحی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بدون در نظر گرفتن روش انتخاب اعمال شده، هر دو صفت وراثت‌پذیری بیشتری را در لاین ۱۵۴ نشان دادند که می‌توان رشد ژنتیکی بیشتری را نیز در این لاین انتظار داشت. صفات وزن پيله، وزن قشر پيله و درصد قشر پيله از صفات اقتصادی مهم در کرم ابریشم هستند که وراثت‌پذیری بالایی دارند (۱۹).

مؤلفه‌های وارینانس و وراثت‌پذیری صفات پيله زیر جمعیت شاهد (G) لاین‌های مورد مطالعه با استفاده از مدل تک‌صفتی، دو صفتی و سه صفتی در جداول ۸ و ۹ ارائه شده است. در هر دو لاین وراثت‌پذیری وزن پيله نسبت به وزن قشر و درصد قشر بیشتر است. با توجه به وراثت‌پذیری بالای صفات مورد مطالعه می‌توان استنباط کرد که اثرات افزایشی ژنی، عموماً تأثیر زیادی روی ارزش‌های فنوتیپی این صفات دارند و عملکرد حشره به‌طور متوسط شاخص خوبی از

جدول ۸- مؤلفه‌های وارینانس و پارامترهای ژنتیکی ( $\pm$  انحراف معیار) برآورد شده صفات پيله از راه مدل تک متغیره و چند متغیره برای لاین ۱۵۳ در حالت آمیزش تصادفی (شاهد)

Table 8. Estimated variance components and genetics parameters ( $\pm$  standard deviation) of cocoon traits by uni and multi variable for pure line 153 under random mating (control)

نوع آنالیز	صفت	وارینانس ژنتیکی	وارینانس محیطی	وارینانس فنوتیپی	وراثت‌پذیری
یک صفتی	وزن پيله	۰/۰۱۱۴۲(۰/۰۰۲۳)	۰/۰۰۸۶(۰/۰۰۱۲)	۰/۰۲(۰/۰۰۱۲)	۰/۵۷(۰/۰۰۸۶)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۲۲(۰/۰۰۰۰۹)	۰/۰۰۰۱(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۰۰۱۲(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۱۸۲(۰/۰۰۶۷)
	درصد قشر	۰/۵۱۰۱(۰/۱۶۷۷)	۲/۸۳۴۸(۰/۱۳۴۲)	۳/۳۳۴۹(۰/۱۲۸۵)	۰/۱۵۳(۰/۰۰۴۷)
دو صفتی	وزن پيله	۰/۰۱۱۰۱(۰/۰۰۲۳۶)	۰/۰۰۸۸۵(۰/۰۰۱۲۶)	۰/۰۱۹۶۸(۰/۰۰۱۲۸)	۰/۵۵۴(۰/۰۰۸۷)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۳۵(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۹۵(۰/۰۰۰۰۶۷)	۰/۰۰۱۳(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۲۷۱(۰/۰۰۷۳)
	وزن پيله	۰/۰۱۰۸۳(۰/۰۰۲۶۳)	۰/۰۰۸۹۵(۰/۰۰۱۲۶)	۰/۰۱۹۷۸(۰/۰۰۱۲۸)	۰/۵۴۸(۰/۰۰۸۸)
	درصد قشر	۰/۵۰۲۶(۰/۱۶۰۶)	۲/۸۳۳۴(۶/۳۱)	۳/۳۳۵(۰/۱۲۶۹۴)	۰/۱۵۱(۰/۰۰۴۵)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۳۸۸(۰/۰۰۰۱۱)	۰/۰۰۰۹۳(۰/۰۰۰۰۷)	۰/۰۰۱۳۲(۰/۰۰۰۰۶)	۰/۲۹۴(۰/۰۰۷۷)
	درصد قشر	۰/۴۷۹۹(۰/۱۵۵۵)	۲/۸۴۵۳(۰/۱۳۰۲)	۳/۳۳۴۶(۰/۱۲۵۱۷)	۰/۱۴۴(۰/۰۰۴۴)
سه صفتی	وزن پيله	۰/۰۱۰۸۱(۰/۰۰۲۳)	۰/۰۰۸۹۵(۰/۰۰۱۲۵)	۰/۰۱۹۷۷(۰/۰۰۱۲)	۰/۵۴۷(۰/۰۰۸۷)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۴۳(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۰۹(۰/۰۰۰۰۷)	۰/۰۰۱۳۴(۰/۰۰۰۰۷)	۰/۳۲۵۲(۰/۰۰۸۰)
	درصد قشر	۰/۷۴۲۵(۰/۲۱۸۷)	۲/۷۰۲۹(۰/۱۴۹۹)	۳/۴۴۵۴۸(۰/۱۴۷۵)	۰/۲۱۶(۰/۰۰۵۷)

جدول ۹- مؤلفه‌های وارینانس و پارامترهای ژنتیکی ( $\pm$  انحراف معیار) برآورد شده صفات پيله با مدل تک متغیره و چند متغیره برای لاین ۱۵۴ در حالت آمیزش تصادفی (شاهد)

Table 9. Estimated variance components and genetics parameters ( $\pm$  standard deviation) of cocoon traits by uni and multi variable for pure line 154 under random mating (control)

نوع آنالیز	صفت	وارینانس ژنتیکی	وارینانس محیطی	وارینانس فنوتیپی	وراثت‌پذیری
یک صفتی	وزن پيله	۰/۰۱۲۰۱(۰/۰۰۰۲)	۰/۰۰۶۰۶(۰/۰۰۱۰۳)	۰/۰۱۸۰۸(۰/۰۰۱۱)	۰/۶۶۴(۰/۰۰۷۴)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۵۴(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۶۶(۰/۰۰۰۰۹)	۰/۰۰۱۲۱(۰/۰۰۰۰۸)	۰/۴۵۱(۰/۰۰۷)
	درصد قشر	۱/۰۳۵۶(۰/۲۸)	۱/۴۵۶۵(۰/۱۵۶۵)	۲/۴۹۳۱۸(۰/۱۵۲۱)	۰/۴۱۶(۰/۰۰۹)
دو صفتی	وزن پيله	۰/۰۱۱۵۲(۰/۰۰۱۹)	۰/۰۰۶۳۲(۰/۰۰۱۰۲)	۰/۰۱۷۸۴(۰/۰۰۱۱)	۰/۶۴۶(۰/۰۰۷۵)
	وزن قشر	۰/۰۰۲۱۸(۰/۰۰۰۳۸)	۰/۰۰۰۳۳(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۰۹۷(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۶۵۷(۰/۰۰۷)
	وزن پيله	۰/۰۱۱۵۵(۰/۰۰۱۹۱)	۰/۰۰۶۳(۰/۰۰۰۹۹)	۰/۱۷۸۶(۰/۰۰۱)	۰/۶۴۷(۰/۰۰۷۲)
	درصد قشر	۱/۰۲۵۴(۰/۲۶۲)	۱/۳۶۶۳(۰/۱۴۶)	۲/۴۰۱۷(۰/۱۴۳۷)	۰/۴۳۱(۰/۰۰۸۷)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۶۴(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۳۳(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۰۹۷(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۶۵۷(۰/۰۰۷)
	درصد قشر	۱/۰۴۸۴(۰/۲۵۷۷)	۱/۳۵۹۲(۰/۱۴۳۶)	۲/۴۰۷۶(۰/۱۴۳۲)	۰/۴۳۵(۰/۰۰۸۵)
سه صفتی	وزن پيله	۰/۰۱۳۰۶(۰/۰۰۱۷)	۰/۰۰۵۵۴(۰/۰۰۰۸)	۰/۰۱۸۶(۰/۰۰۱۰۳)	۰/۷۰۲(۰/۰۰۶۱)
	وزن قشر	۰/۰۰۰۶۵(۰/۰۰۰۱)	۰/۰۰۰۳۳(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۰۰۰۹۸(۰/۰۰۰۰۵)	۰/۶۵۵(۰/۰۰۶۹)
	درصد قشر	۱/۲۴۸۹(۰/۲۶۶۹)	۱/۲۵۵۰(۰/۱۴۴۹)	۲/۵۰۳۹۸(۰/۱۴۸۹)	۰/۴۹۹(۰/۰۰۸۱)

معنی‌داری وجود ندارد که احتمالاً به دلیل این است که از همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات در شاخص انتخاب پایه شده استفاده به عمل نیامده و کارایی این روش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین با توجه به نتایج مقایسه میانگین، استراتژی A در جهت بهبود تمامی صفات تولیدی، می‌تواند قابل توصیه باشد.

جدول ۱۰ مقایسه میانگین صفات پيله بین روش‌های مختلف انتخاب را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که بین میانگین صفت وزن قشر پيله و درصد قشر استراتژی‌ها A و B اختلاف معنی‌داری وجود دارد، که به خوبی پاسخ مثبت ایجاد شده نسبت به انتخاب را برای استراتژی A را نشان می‌دهد. ولی بین استراتژی‌های B و G (شاهد) اختلاف

جدول ۱۰- مقایسه میانگین صفات پيله بین استراتژی‌های مختلف انتخاب

Table 10. Mean comparison of cocoon traits among different selection indices

سیستم انتخاب	وزن پيله (گرم)	وزن قشر (گرم)	درصد قشر (%)
A	۱/۹۴ <sup>ab</sup>	۰/۴۳۴ <sup>a</sup>	۲۲/۰۸ <sup>a</sup>
B	۱/۹۳ <sup>bc</sup>	۰/۴۱۶ <sup>d</sup>	۲۱/۷۸ <sup>d</sup>
G (جمعیت شاهد)	۱/۹۳ <sup>c</sup>	۰/۴۱۰ <sup>d</sup>	۲۱/۶۳ <sup>d</sup>

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف متفاوت، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری دارند ( $P < 0.05$ ).

ولی در بقیه صفات اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها، مشاهده نمی‌شود. بین روش‌های انتخاب اعمال شده، در ارتباط با صفت درصد پيله خوب، روش A بالاترین میانگین (۸۵/۹۹ درصد) را نسبت به روش‌های دیگر دارد. این بدان معنی است که انتخاب به روش شاخص معمولی سه صفتی بر صفات تولیدی تأثیر خوبی دارد.

جدول ۱۱ مقایسه میانگین انجام شده برای صفات تولیدی و مقاومت بین دو روش شاخص انتخاب در آمیخته‌ها را نشان می‌دهد. همان گونه که مشاهده می‌شود درصد پيله خوب و درصد پيله متوسط در هر دو سیستم انتخاب، نسبت به گروه شاهد بهتر است چراکه نشان‌دهنده تأثیر مثبت این روش‌ها بر صفات تولیدی است

جدول ۱۱- مقایسه میانگین صفات تولیدی و مقاومت بین استراتژی‌های مختلف انتخاب

Table 11. Mean comparison of productive and resistance traits among different selection indices

سیستم انتخاب	درصد پيله خوب	درصد پيله متوسط	درصد پيله دول (دوگانه)	وزن کل پيله تولیدی (گرم)	ماندگاری لارو
A	۸۵/۹۹ <sup>a</sup>	۱۰/۱۳ <sup>b</sup>	۲/۶۶ <sup>b</sup>	۱۶۰۳/۵ <sup>b</sup>	۰/۸۷ <sup>a</sup>
B	۸۲/۱۱ <sup>b</sup>	۱۳/۲۷ <sup>b</sup>	۳/۳۸ <sup>b</sup>	۲۱۹۶/۶ <sup>a</sup>	۰/۹۰ <sup>a</sup>
G (جمعیت شاهد)	۷۸/۰۱ <sup>c</sup>	۱۸/۰۳ <sup>a</sup>	۲/۹۴ <sup>d</sup>	۱۶۱۵/۶ <sup>cd</sup>	۰/۸۸ <sup>a</sup>

آمیخته‌های حاصل از تلاقی با لاین ۱۵۴ داشته باشد. در اکثر موارد نسل اول بیشترین رشد ژنتیکی را به خود اختصاص داد و فقط صفت درصد قشر پيله لاین ۱۵۴ در نسل دوم از رشد ژنتیکی بالایی برخوردار بود. با هر نسل انتخاب، به‌واسطه کاهش تنوع ژنتیکی انتظار می‌رود که میزان پیشرفت ژنتیکی نیز کاهش یابد. نوسانات رشد ژنتیکی در چند نسل نخست انتخاب به‌سبب بالا بودن تنوع ژنتیکی است. چنین نتیجه‌ای از سوی ناصرانی (۱۶) در پی بررسی روند ژنتیکی صفات پيله حاصل از نه نسل انتخاب در چهار لاین تجاری کرم ابریشم گزارش شده است و قبلاً هم آشوکا و گوویندان (۱) آن را بررسی کرده بودند.

روش شاخص انتخاب رسیدن به پیشرفت ژنتیکی در چندین صفت به‌طور هم‌زمان، با تعادل اقتصادی مطلوب بین آن‌ها را ممکن می‌سازد (۲). پس از برآورد میانگین ارزش‌های ارثی، میزان پیشرفت ژنتیکی حاصل از استراتژی A، به‌صورت انحراف از پیشرفت ژنتیکی گروه شاهد برآورد گردید (جدول ۱۲).

با توجه به جدول ۱۲، در بین صفات پيله، پیشرفت ژنتیکی درصد قشر از نوسان بیشتری در هر دو لاین برخوردار است. رشد ژنتیکی کل حاصل از سه نسل انتخاب برای تمامی صفات در لاین ۱۵۳ بیشتر از لاین ۱۵۴ است. بنابراین انتظار می‌رود سهم بیشتری را نیز در افزایش عملکرد تولیدی

جدول ۱۲- مقایسه انتخاب شاخص انتخاب پایه سه صفتی (استراتژی A) در لاین‌های ۱۵۳ و ۱۵۴ از نظر میزان پیشرفت ژنتیکی ایجاد شده  
Table 12. Comparison of 3-trait base selection index (strategy A) in pure lines 153 and 154 for generated genetics improvement

صفت	وزن پيله (گرم)		وزن قشر پيله (گرم)		درصد قشر پيله	
لاین	۱۵۴	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۳
نسل ۱	۰/۰۶۳۰	۰/۰۷۹۱	۰/۰۳۸۷	۰/۰۱۸۷	۰/۳۷۹۴	۰/۳۷۹۴
نسل ۲	۰/۰۶۴۶	۰/۰۲۹۳	۰/۰۲۷۰	۰/۰۱۵	۰/۸۲۷۲	۰/۸۲۷۲
نسل ۳	۰/۰۶۳۰	۰/۰۲۲	۰/۰۲۸۱	۰/۰۰۸۳	۰/۳۵۴۲	۰/۳۵۴۲
کل	۰/۱۹۰۶	۰/۱۳۰۴	۰/۰۹۳۹	۰/۰۴۲۴	۱/۵۶۱	۳/۹۸۷

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف متفاوت، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری دارند ( $P < 0.05$ ).

تا متوسط درصد قشر و نیز پیشرفت ژنتیکی پایین آن، توصیه کردند که برای بهبود این صفت از آمیخته‌گری و روش‌های انتخاب چند صفتی استفاده شود (۱۰).  
میزان پیشرفت ژنتیکی حاصل از استراتژی B، به‌صورت انحراف از پیشرفت ژنتیکی گروه شاهد برآورد گردید (جدول ۱۰).

در کل می‌توان گفت، شاخص انتخاب سه صفتی در بهبود ژنتیکی درصد قشر پيله کارایی بالایی دارد. شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده ارزش‌های اصلاحی را می‌توان با وارد کردن داده‌های صفات دیگری که با صفات مورد پیش‌بینی هم‌بسته هستند و خود نیز ممکن است هدف‌گزینه باشند، بهبود بخشید (۵). برخی محققان هم با توجه به وراثت‌پذیری پایین

جدول ۱۳- مقایسه شاخص انتخاب معمولی سه صفتی (استراتژی B) لاین‌های ۱۵۳ و ۱۵۴ از نظر میزان پیشرفت ژنتیکی ایجاد شده  
Table 13. Comparison of 3-trait selection index (strategy B) in pure lines 153 and 154 for generated genetics improvement

درصد قشر پیله	وزن قشر پیله (گرم)		وزن پیله (گرم)		صفت	
	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۳	۱۵۴		
۱۵۴	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۳	۱۵۴	لاین	
۰/۳۸۹۳	۰/۹۳۰۲	۰/۰۱۸۲	-۰/۰۳۳۵	۰/۰۶۸۵	۰/۰۰۰۲	نسل ۱
۰/۵۶۵۲	۰/۷۶۰۱	۰/۰۱۷۲	-۰/۰۱۲۸	۰/۰۴۹۳	۰/۰۰۶۵	نسل ۲
۰/۲۴۰۶	۰/۳۱۹۵	۰/۰۰۹۴	۰/۰۲۴۰	۰/۰۳۳	۰/۱	نسل ۳
۱/۱۹۵	۲/۰۰۹	۰/۰۴۴۹	-۰/۰۲۲۴	۰/۱۵۱	۰/۱۰۶۸	کل

پیل و وزن قشر پیله، وراثت پذیری بیشتری در لاین ۱۵۴ نشان دادند که می‌توان رشد ژنتیکی بیشتری را نیز در این لاین انتظار داشت.

با توجه به وراثت‌پذیری بالای صفات مورد مطالعه در آنالیزهای تک صفتی، دو صفتی و سه صفتی، می‌توان استنباط کرد که اثرات افزایشی ژنی، عموماً تأثیر زیادی روی ارزش‌های فنوتیپی این صفات دارند و بهبود این صفات در برنامه‌های اصلاحی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بدون نظر گرفتن روش انتخاب اعمال شده، هر دو صفت وزن پیله و وزن قشر پیله، وراثت‌پذیری بیشتری در لاین ۱۵۴ نشان دادند که می‌توان رشد ژنتیکی بیشتری را نیز در این لاین انتظار داشت. همچنین نتایج مقایسه میانگین، نشان می‌دهد که استراتژی A در جهت بهبود تمامی صفات تولیدی، می‌تواند قابل توصیه باشد. مقایسه میانگین صفات تولیدی و مقاومت بین دو روش، نیز نشان می‌دهد که برای صفت درصد پیله خوب، استراتژی A بالاترین میانگین (۸۵/۹۹ درصد) را نسبت به روش‌های دیگر دارد. رشد ژنتیکی کل حاصل از سه نسل انتخاب برای تمامی صفات در استراتژی A در لاین ۱۵۳ بیشتر از لاین ۱۵۴ است. بنابراین انتظار می‌رود سهم بیشتری را نیز در افزایش عملکرد تولیدی آمیخته‌های حاصل از تلاقی با لاین ۱۵۴ داشته باشد.

با توجه به جدول نوسانات زیادی در حداکثر رشد ژنتیکی بین نسل‌ها مشاهده شد. رشد ژنتیکی پایین و منفی وزن پیله و وزن قشر پیله لاین ۱۵۳، نشان می‌دهد که کارایی شاخص انتخاب به دلایلی کاهش یافته است. این کاهش کارایی می‌تواند به دلیل پایین بودن دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی و در پی آن محاسبه نه چندان دقیق ضرایب وزنی (b) این صفات در شاخص باشد. پایین بودن رشد ژنتیکی در نسل اول و دوم، باعث شده است که رشد ژنتیکی کل مربوط به این دو صفت در لاین ۱۵۳ به مراتب پایین‌تر از لاین ۱۵۴ باشد. در حالی که در استراتژی A، به برتری فنوتیپی و ژنتیکی لاین ۱۵۳ نسبت به لاین ۱۵۴ تأکید شده بود. رشد ژنتیکی درصد قشر نسبت به دو صفت دیگر از نوسان کمتری برخوردار بود. به این منظور، محققین اظهار داشتند که صفاتی که پیشرفت ژنتیکی بالا و نیز وراثت‌پذیری بالا نشان می‌دهند، احتمالاً تحت کنترل عمل افزایشی ژنی هستند (۴).

با توجه به وراثت‌پذیری بالای صفات مورد مطالعه در آنالیزهای تک صفتی، دو صفتی و سه صفتی، می‌توان استنباط کرد که اثرات افزایشی ژنی، عموماً تأثیر زیادی روی ارزش‌های فنوتیپی این صفات دارند و بهبود این صفات در برنامه‌های اصلاحی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بدون نظر گرفتن روش انتخاب اعمال شده، هر دو صفت وزن

## منابع

1. Ashoka, J. and R. Govindan. 1990. Genetic estimates for quantitative traits in bivoltine silkworm, *Bombyx mori* L. Mysore Journal of Agricultural Science, 24: 371-374.
2. Bourdon, R.M. 2000. Understanding Animal Breeding. Prentice-Hall, Inc. Second Edition.
3. Brim, C.A., H.W. Johnson and C.C. Cokerham. 1959. Multiple selection criteria in soybeans. Agronomy Journal, 51: 42-46.
4. Darmand, S., A. Lavvaf, A.R. Seidavi, N. Eila, S. Nematollahian and T. Farahvash. 2011. Estimation of genetic parameters in three commercial silk-worm lines of Iran. African Journal of Biotechnology, 10: 13324-13330.
5. Falconer, D.S. and T.F.C. McKay. 1996. Introduction to quantitative genetics. 4<sup>th</sup> ed. Longman. Essex, England.
6. Ghanipoor, M., S. Nematollahian, A.R. Seidavi, S.Z. Mirhosseini, M. Mavvajpour and A.R. Bizhannia. 2008. Evaluation of genetic parameters and crossbreeding effects of economic traits on silkworm pure lines in the criss crossing system. Research Journal of University of Isfahan, 35: 137-144 (In Persian).
7. Groen, A. 1989. Cattle breeding goals and production circumstances. Dissertation, Wageningen Agricultural University, the Netherlands, 167 pp.
8. Hazel, L.N. 1943. The genetic basis for constructing selection indexes. Genetics, 28: 476-490.
9. Kazemi, M. 2007. Assessing the resistance of commercial varieties of Iran Silkworm (*Bombyx mori* L.) to Nuclear Polyhedrosis Virus using genetic screening and backcross methods. M.Sc. Thesis in Animal Science, Animal Genetics and Breeding. University of Guilan, Rasht. Iran 212 pp (In Persian).
10. Malik, G.N., M.A. Masoodi, A.S. Kamili and M. Aijaz. 1999. Estimation of direct selection parameters in a diallell set of bivoltine silkworm (*bombyx mori* L.). Entomology, 24: 253-257.
11. Meyer, K. 2006. WOMBAT- Digging Deep for Quantitative Genetic Analysis by Restricted Maximum Likelihood. Proc. 8<sup>th</sup> World Congress on Genetics of Livestock Production Belo Horizonte, Brazil.
12. Mirhoseini, S.Z., A.R. Seidavi, M. Ghanipoor and K. Etebari. 2004. Estimation of general and specific combining ability and heterosis in new varieties of silkworms. *Bombyx mori* L. Journal of Biological Sciences, 4: 725-730.
13. Mirhosseini, S.Z., M. Mavajpour, M. Ghanipoor and A.R. Seidavi. 2005b. Study on genetic parameters of some economic traits in Iranian indigenous silkworm races, British Society of Animal Science Annual Conference. UK. 148.
14. Mirhosseini, S.Z., M. Ghanipoor, A. Shadparvar and K. Etebari. 2005a. Selection indices for cocoon traits in six commercial silkworm (*Bombyx mori* L.) lines. The Philippine Agricultural Scientist, 88: 328-336.
15. Moorthy, S.M., S.K. Das, P.R.T. Rao, S. Raje Urs and A. Sarkar. 2007. Evaluation and selection of potential parents based on selection indices and isozyme variability in silkworm, *Bombyx mori* L. International Journal of Industrial Entomology, 14: 1-7.
16. Naserani, M. 2009. Genetics trend of economical traits of four Iranian commercial silkworm lines. M.Sc. Thesis in Animal Science, Animal Genetics and Breeding. University of Guilan, Rasht. Iran 114 pp (In Persian).
17. Seidavi, A.R. 2010a. Estimation of genetics parameters and selection effect on genetic and phenotype trends in silkworm commercial pure lines. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 5: 1-12.
18. Seidavi, A.R. 2010b. Investigation on effect of individual selection based on cocoon weight on additive genetic value and selection index value in six commercial silkworm pure lines. World Journal of Zoology, 5: 7-14.
19. Seidavi, A.R., S.Z. Mirhosseini, A.R. Bizhannia and M. Ghanipoor. 2007. Investigation on selection efficiency for some quantitative cocoon characters at 3P lines and its correlation with reproduction and resistance against diseases parameters of hybrids (F1) silkworm. Iranian Journal of Biology, 20: 262-268 (In Persian).
20. Shadparvar, A., M. Ghanipoor, S.Z. Mirhoseini and K. Etebari. 2005. Derivation of economic values for productive and reproductive traits of silkworm (*Bombyx mori* L.) from profit equation. Journal of Economic Entomology, 98: 1717-1722.
21. Williams, J.S. 1962. The evaluation of an index. Biometrics, 18: 375-393.

## Comparison of the Effects of Different Selection Strategies on Performance of two Commercial Silkworm Lines

Parakhat Barzin<sup>1</sup>, Seyyed Ziaeddin Mirhosseini<sup>2</sup>, Shahla Nematollahian<sup>3</sup>,  
Mohammad Naserani<sup>4</sup> and Alireza Seidavi<sup>5</sup>

---

1 and 4- Graduated M.Sc. and M.Sc., University of Guilan, Rasht

2- Professor, University of Guilan, Rasht (Corresponding author: mirhosin@guilan.ac.ir)

3- M.Sc., Silkworm Research Center (ISRC), Rasht, Iran

5- Associate Professor, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Received: November 13, 2012      Accepted: October 9, 2014

---

### Abstract

The aim of this research was to estimate the variance components and genetic parameters for silkworm cocoon traits using univariate and multivariate models, and comparison of average productivity and resistance traits among three different selection strategies in two commercial silkworm lines of 153 and 154. Genetic parameters of cocoon weight, cocoon shell weight and cocoon shell percentage were estimated after three generations of selection, using the REML algorithm of the WOMBAT software. Selection criteria were conventional three-trait index (A) and basal three-traits index (B) based on cocoon weight, cocoon shell weight and cocoon shell percentage. For these goals, data were collected for two commercial silkworm pure lines of 153 and 154 during 2006-2010 in the Iran Silkworm Research Center (ISRC). In general, the obtained results of mean comparisons showed that strategy A can be recommended for improving of all productive traits. Total genetic gain obtained from three generations of selection for all traits in strategy A in pure line 153 was higher than line 154. Regarding to the high values of heritability for studied traits in univariate and multivariate analyses, it can be concluded that additive genetic effects had more effect on the phenotypic values of these traits and consequently the improvement of these traits in breeding programs would be possible.

**Keywords:** Base 3-traits Selection Index, Conventional 3-traits Selection Index, Genetic Improvement, Genetic parameters, Silkworm