



اثر ال-کارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

علی خطیب جو^۱, زهرا نوره^۲, فرشید فتحانیا^۳ و محمد اکبری قوائی^۳

۱- استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام، (نویسنده مسؤول: a.khatibjoo@gmail.com)
۲- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام
تاریخ دریافت: ۹۳/۸/۲۰
تاریخ پذیرش: ۹۵/۶/۱۴

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر ال-کارنیتین (صفر، ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و اسید بوتیریک (۰ و ۲ گرم بر کیلوگرم) بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی انجام شد. آزمایش با استفاده از ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی راس ۳۰۸ در قالب فاکتوریل 2×3 بر پایه طرح بلوك‌های کامل تصادفی با شش تیمار، چهار بلوك و هشت جوجه در هر بلوك انجام شد. نتایج نشان داد که جوجه‌های غذنی شده با جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین و جیره حاوی ۱۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین و دو گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک نسبت به گروه شاهد خواراک مصرفی کمتر و ضریب تبدیل خواراک بهتری داشتند ($P < 0.05$). افزودن ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین در مقایسه با ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم به طور معنی‌داری سبب افزایش درصد گوشت سینه جوجه‌ها شد درحالیکه با جیره شاهد شده با جیره حاوی تفاوت معنی‌داری نداشتند. جوجه‌های دریافت‌کننده جیره دارای ۲ گرم در کیلوگرم اسید بوتیریک بدون ال-کارنیتین نسبت به جوجه‌های گروه شاهد درصد ران پائین تری داشتند ($P < 0.05$). به استثنای روشی، رنگ گوشت ران و سینه و غلظت لاكتات گوشت سینه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$). تغذیه جبره دارای اسید بوتیریک باعث کاهش pH گوشت ران و جیره دارای ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین بدون اسید بوتیریک به جوجه‌های گوشتی باعث افزایش pH گوشت ران در ۴۵ دقیقه بعد از کشتار نسبت به جوجه‌های گروه شاهد شد ($P < 0.05$). تغذیه جبره دارای اسید بوتیریک باعث کاهش درصد چربی گوشت سینه جوجه‌های گوشتی شد در حالیکه تغذیه همزمان جیره حاوی ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین و جیره دارای ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک سبب افزایش درصد چربی ران تحدیث تاثیر جیره‌ها قرار نگرفت ($P > 0.05$). به طور کلی جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین و سپس جیره حاوی ۱۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین و ۲ گرم اسید بوتیریک اثر مثبتی بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی داشتند و استفاده از ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین در جیره سبب بهبود درصد سینه جوجه‌های گوشتی در حالیکه ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک سبب کاهش درصد چربی گوشت سینه نشد.

واژه‌های کلیدی: اسید بوتیریک، ال-کارنیتین- جوجه‌های گوشتی، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت

استفاده از سطوح مختلف ال-کارنیتین (۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) در جیره جوجه‌های گوشتی سبب

افزایش درجه قرمزی (b) و کاهش درجه زردی (a) گوشت سینه و ران شد (۲۷). استفاده از سطح ۱۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین از ۱۱ تا ۲۸ روزگی دوره پروش جوجه، عدم تاثیر ال-کارنیتین را بر مصرف خواراک، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نشان داد (۱۹).

اسید بوتیریک با اسیدی کردن دستگاه گوارش سبب کاهش pH محیط دستگاه گوارش و ممانعت از رشد میکروب‌های بیماری‌زا می‌شود و از این طریق می‌تواند سبب بهبود کیفیت لاشه شود (۱). اسیدهای آلی با بهبود فاکتورهای روده‌ای، کمک به هضم مواد غذایی و افزایش دسترسی میزان به مواد مغذی، سبب افزایش وزن بیشتر و راندمان بهتر درصد وزن لاشه می‌شوند (۱). سطوح مختلف گلیسرید اسید بوتیریک ($0/2$ ، $0/25$ ، $0/35$ و $0/5$ درصد) سبب افزایش وزن بدن در زمان کشتار شد که این افزایش وزن در سطح $0/2$ درصد بیشترین مقدار بود، درحالی که اسید بوتیریک تاثیری بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی نداشت (۲). افزودن $0/2$ درصد اسید بوتیریک به عنوان محرك رشد در جیره جوجه‌ها تاثیری بر درصد سینه نداشت (۱۳). اضافه

مقدمه

استفاده از اسیدهای آلی در جیره غذایی مرغ به عنوان محرك رشد از جمله راههای شناخته شده جهت حمایت از فلور میکروبی مطلوب در دستگاه گوارش و بهبود هضم و جذب مواد مغذی و در نتیجه تحریک رشد است (۳). افزایش بیش از حد چربی لاشه مخصوصاً در ناحیه بطني و احتشامي یکی از نگرانی‌های عمده تولیدکنندگان طیور است که سبب افزایش هزینه پرورش و کاهش تمايل مصرف کنندگان می‌شود (۱۷). تلاش‌های زیادی در جهت کاهش چربی بطني توسط متخصصان تغذیه صورت گرفته است از جمله افزودن ال-کارنیتین به جیره جوجه‌های گوشتی که با انتقال اسیدهای چرب از سیتوزول به درون میتوکندری سبب افزایش کاتابولیسم آن‌ها و کاهش چربی لاشه می‌شود (۶). افزودن ال-کارنیتین در سطوح 50 ، 75 و 100 میلی گرم در کیلوگرم جیره جوجه‌های گوشتی سبب افزایش محتوای چربی سینه و کاهش چربی بطني شده است (۲۳). استفاده از 100 میلی گرم مکمل ال-کارنیتین بر کیلوگرم جیره در کل دوره پرورش (۱ تا ۴۲ روزگی) جوجه‌های گوشتی نشان داد که مکمل ال-کارنیتین بر بازده لاشه، ترکیب شیمیایی سینه و ران، درصد لاشه و کیفیت گوشت تاثیر نداشت (۷) درحالی که

برای تعیین چگونگی تاثیر جیره‌های آزمایشی بر صفات مربوط به لашه در روز ۴۲ آزمایش از هر بلوک ۱ قطعه جوجه (۴) جوجه در هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شدند و سپس درصد اجزای لاشه (لاشه، سینه، ران و چربی محوطه بطنی) اندازه‌گیری شدند. به منظور تعیین رنگ و pH گوشت سینه و ران، بعد از کشتار، یک نمونه ۵۰ گرمی از گوشت سینه و ران جدا شد. رنگ نمونه‌های گوشت در ۴۵ دقیقه و ۲۴ ساعت پس از کشتار با استفاده از رنگ سنج الکتریکی ^۱ در ۴ نقطه متفاوت از هر نمونه تعیین شد. این روش بر اساس سیستم سنجش رنگ RGB بود و با استفاده از فرمول، داده‌ها به فرمت Lab تبدیل شدند که دارای سه درجه روشی (L)، قرمزی (a) و زردی (b) بود (۲۵). پس از کشتار با استفاده از pH متر و با وارد کردن نوک دستگاه به داخل غضله pH نمونه‌های گوشت سینه و ران در ۴۵ دقیقه پس از کشتار اندازه‌گیری و ثبت شد. سپس نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در درون پلاستیک و در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری و دوباره pH آنها اندازه‌گیری شد و اختلاف ۲۴ pH ساعت و ۴۵ دقیقه بعد از کشتار محاسبه شد (۱۲). به منظور اندازه‌گیری میزان لاكتات گوشت سینه، مقدار ۰/۴ گرم از گوشت سینه هر جوجه با ۴ میلی لیتر محلول EDTA (یک میلی مولار، ۰/۰۵ HCl-tris) مولار و ساکاروز ۰/۰۵ مولار) مخلوط و پس از آن نمونه مخلوط شده به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ و به هر نمونه مقدار یک میلی لیتر کیت لاكتات افزوده شد. غلظت لاكتات نمونه‌ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر ^۲ در طول موج ۶۰۰ نانومتر قرائت و محاسبه شد (۲۶).

داده‌های حاصل از آزمایش به صورت فاکتوریل ۲×۳ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و بر اساس مدل آماری زیر آنالیز شدند:

$$Y_{ijkl} = \mu + A_i + C_j + AC_{ij} + B_k + e_{ijkl} \quad (1)$$

در رابطه ۱، μ = مشاهدات، A_i = میانگین مشاهدات، C_j = سطح اسید بوتیریک، AC_{ij} = سطح ال-کاربینتین، B_k = اثر متقابل سطح اسید بوتیریک و ال-کاربینتین، e_{ijkl} = اثر بلوک و اثر خطای آزمایشی است. آنالیز داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری SAS (۲۰۰۱) نسخه ۹/۱ (۱۰) و رویه GLM انجام شد. میانگین تیمارها در سطح ۵ درصد و با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح معنی‌دار ۵ درصد با هم مقایسه شدند و نتایج به صورت اثرات متقابل اسید بوتیریک و ال-کاربینتین ارائه و از آوردن اثرات اصلی هر عامل صرف نظر گردید.

نمودن مخلوط اسیدهای آلی (اسیدفرمیک، اسیدلاکتیک، اسیدمالیک، اسیدسیتریک، اسیدتارتاریک و اسید ارتوفسفریک) به جیره جوجه‌های گوشتی اثری بر صفات تولیدی آنها نداشت (۱۵). با توجه اطلاعات موجود در هیچ پژوهشی اثر همزمان اسید بوتیریک و ال-کاربینتین بر کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی انجام نشده است، بنابراین هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر مکمل ال-کاربینت و اسید بوتیریک بر کیفیت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی بود.

مواد و روش‌ها

برای اجرای این آزمایش از ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی راس ۳۰۸ از دو جنس نر و ماده به نسبت ۵۰:۵۰ استفاده شد که داخل قفسه‌های چهار طبقه (تقسیم‌بندی به عنوان بلوک) نگهداری شدند و شرایط پرورش از قبل نور، دما، تهویه و رطوبت نسبی طبق راهنمای استاندارد پرورش جوجه‌های گوشتی مهیا شد. طول مدت روشنایی سالان در شبانه روز طبق دستورالعمل پرورشی ۲۳ ساعت بود و طبقه قفس به عنوان بلوک در نظر گرفته شد.

از ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی راس ۳۰۸ در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۸ تیمار (۳×۲) شامل ۲ سطح اسید بوتیریک (صفر و ۲ گرم بر کیلوگرم) و ۳ سطح ال-کاربینتین (صفر، ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم)، با ۴ بلوک و ۸ جوجه در هر تکرار انجام شد. برای تأمین مقادیر ال-کاربینتین از کاربینکینگ (ساخت شرکت لونزای سوئیس) حاوی ۲۰ درصد ال-کاربینتین در تراکم‌های صفر، ۶۲۵ و ۱۲۵۰ میلی گرم در هر کیلوگرم و برای تأمین اسید بوتیریک از baby-C4 محصول کشور بزریل استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل جیره پایه بدون افزودنی (شاهد)، جیره حاوی ۲ گرم در کیلوگرم اسید بوتیریک، جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم در کیلوگرم ال-کاربینتین، جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم ۲-کاربینتین و ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک، جیره حاوی ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کاربینتین و جیره حاوی ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کاربینتین و ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک بودند. جیره‌های آزمایشی بر پایه ذرت و سویا در سه دوره آغازین، رشد و پایانی طبق توصیه راهنمای پرورش سویه راس UFFDA (۲۰۰۹) و به وسیله نرم‌افزار جیره نویسی (۲۰۰۹) تنظیم شدند. نیاز اسید آمینه‌ای طیور و همچین اجزاء مختلف جیره‌ها بر اساس اسید آمینه قابل هضم استاندارد شده ایشومی ^۱ برآورد گردید (۲۲).

جدول ۱ - مواد خوراکی تشکیل‌دهنده جیره پایه و ترکیب شیمیایی آن در دوره‌های پرورشی (درصد)
Table 1. Ingredients of basal diet and its chemical composition during breeding (percentage)

ماده خوراکی	ذرت	آغازین (۱ تا ۱۲ روزگی)	رشد (۱۳ تا ۲۵ روزگی)	پایانی (۲۴ تا ۴۲ روزگی)	دوره
کنجال‌سوسوا (۴۴ درصد پروتئین)	۵۳/۰۵	۵۳/۰۵	۳۳/۰۵	۳۳/۷	۶۴/۱۵
روغن چیاهی (سویا)	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۳۴/۰۲
گلوتن ذرت (۶۰ درصد پروتئین)	.	۷/۵۲	۷/۵۲	۷/۰۰	.
دی‌کلسیم فسفات	۱/۵۳	۱/۵۳	۱/۰۴	۱/۰۴	۱/۲
صف	۱/۴۵	۱/۴۵	۱/۲	۱/۲	۱/۱
بیکربنات سدیم	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۱	۰/۱	۰/۰۹
نمک	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۳	۰/۳	۰/۰۳
مکمل ویتامین ^۱	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵
مکمل مواد معدنی ^۲	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۱۹	۰/۱۹	۰/۱۴
دی‌آل-میتوین	۰/۲۳	۰/۲۳	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱
آل-لیپین هیدروکلرید	۰/۳۱	۰/۳۱	.	.	.
آل-ترنوفین	۰/۰۴۷	۰/۰۴۷	.	.	.
ترکیب شیمیایی محاسبه شده					
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)	۷۹۹۰/۰۰	۷۹۹۰/۰۰	۷۹۹۰/۰۰	۷۹۹۰/۰۰	۳۰۰۰/۰۰
پروتئین خام (درصد)	۲۱/۵۰	۲۱/۵۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۸/۰۰
لیپین ^۳ (درصد)	۱/۰۸	۱/۰۸	۱/۲۳	۱/۰۸	۰/۸۶
متیونین SID (درصد)	۰/۴۸	۰/۴۸	۰/۵۷	۰/۴۸	۰/۳۸
سیستین SID (درصد)	۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۳۲	۰/۳۰	۰/۲۶
متیونین + سیستین SID (درصد)	۰/۱۸۹	۰/۱۸۹	۰/۱۸۹	۰/۱۸۹	۰/۶۵
ترنوفین SID (درصد)	۰/۶۸	۰/۶۸	۰/۷۷	۰/۶۸	۰/۵۸
آرزنن SID (درصد)	۱/۲۸	۱/۲۸	۱/۳۳	۱/۲۸	۱/۱۱
کلسیم (درصد)	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۵	۱/۰۰	۰/۹۰
فسفر قابل استفاده (درصد)	۰/۵۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۰/۵۰	۰/۵۰
سدیم (درصد)	۰/۱۷	۰/۱۷	۰/۱۷	۰/۱۷	۰/۱۷
کلر (درصد)	۰/۲۳	۰/۲۳	۰/۲۳	۰/۲۳	۰/۲۳
تعادل آبیون و کاتیون (میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم)	۲۲۷/۰۰	۲۲۷/۰۰	۲۲۶/۰۰	۲۲۷/۰۰	۲۲۷/۰۰
اسید لیپوئیلیک (درصد)	۱/۲۰	۱/۲۰	۱/۲۵	۱/۲۰	۱/۲۷
فیبر خام (درصد)	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۴/۸۰

۱- هر کیلوگرم مکمل ویتامینی به ازای هر کیلوگرم جیره مواد مغذی زیر را تامین کرد: ۹۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین A، ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D_۳، ۱۸۱ واحد بین‌المللی ویتامین E، ۴ میلی‌گرم ویتامین K_۳، ۴ میلی‌گرم ویتامین B_۱، ۰/۱۵ میلی‌گرم ویتامین B_۲، ۰/۰۷۵ میلی‌گرم ویتامین B_{۱۲}، ۰/۱۵ میلی‌گرم اسید فولیک.

۲- هر کیلوگرم مکمل معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مواد مغذی زیر را تامین کرد: مس (سولفات مس) ۱۰ میلی‌گرم، ید (یدات کلسیم) ۰/۹۹ میلی‌گرم، آهن (سولفات آهن) ۰/۵ میلی‌گرم، منگنز (اسید منگنز) ۹۹ میلی‌گرم، سلنیوم (سelenیت سدیم) ۰/۲ میلی‌گرم، روی (اسید روی) ۸۴ میلی‌گرم.

۳- SID = اسید آمینه قابل هضم استاندارد شده ایلوچی

ال-کارنیتین و ۲ گرم اسید بوتیریک کمترین خوارک مصرفی را طی کل دوره پرورش داشتند ($P < 0.05$). جیره حاوی ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک در مقایسه با جیره‌های حاوی مخلوط اسید بوتیریک و ال-کارنیتین مصرف خوارک را افزایش داد ($P < 0.05$). تغذیه جوجه‌ها با اسیدهای آلی میزان افزایش داد که برای جذب بهتر و مناسب‌تر مواد غذائی بسیار عالی است. وجود اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در روده باعث تحریک سیستم عصبی خود مختار شده و احتمالاً سیگنال‌های الکتریکی را از کولون به سیستم عصبی مرکزی می‌فرستد و باعث آزادسازی هورمون‌ها می‌گردد و به هضم و جذب بهتر خوارک کمک می‌کند ($P < 0.05$).

نتایج و بحث
اثر جیره‌های آزمایشی بر مصرف خوارک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشته در کل دوره پرورش در جدول ۲ آمده است. افزودن اسید بوتیریک به تنهای تأثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک، وزن بدن و ضریب تبدیل جوجه‌های گوشته نداشت درحالیکه ال-کارنیتین تأثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک و ضریب تبدیل جوجه‌ها داشت اما در ترکیب با اسید بوتیریک تأثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک و ضریب تبدیل جوجه‌های گوشته نداشت و بین گروه شاهد با جوجه‌های دریافت‌کننده افزودنی تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید ($P > 0.05$). در بین تیمارهای حاوی مواد افزودنی، جوجه‌های دریافت‌کننده جیره‌ی حاوی ۱۲۵ میلی‌گرم ال-کارنیتین و جیره حاوی ۱۲۵ میلی‌گرم

جدول ۲- اثر اسید بوتیریک و ال-کارنیتین بر میانگین مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی (۱ تا ۴۲ روزگی)

Table 2. Effect of butyric acid and l-Carnitine on mean of feed intake, body weight gain and feed conversion ratio of broiler chickens (1-42 days)

اثر اصلی اسید بوتیریک	P-value	اثر اصلی ال-کارنیتین	اثرات متقابل ^a	اسید بوتیریک	ال-کارنیتین
بدون اسید بوتیریک		بدون کارنیتین		.	.
۲ گرم اسید بوتیریک		۱۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین		۱۲۵	۱۲۵
خطای استاندارد		۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین		۲۵۰	۲۵۰
P-value		خطای استاندارد			
اثر اصلی ال-کارنیتین		میانگین اشتیاه استاندارد			
بدون کارنیتین		۰/۰۱			
۱۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین		۰/۰۲			
۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین		۰/۰۳			
خطای استاندارد		۰/۰۴			
P-value		۰/۰۵			
اعداد دارای حروف غیر مشترک در هر ستون دارای اختلاف معنی‌داری هستند ($P < 0/05$).					

^{a,b,c}= اسید بوتیریک (گرم در کیلوگرم جیره) و ال-کارنیتین (میلی گرم در کیلوگرم جیره)

یا اسید بوتیریک نمی‌تواند به تنها یکی عامل موثری برای کاستن چربی‌های محوطه بطنی در جوجه‌های گوشتی باشد و رسیدن به این هدف مستلزم همکاری عوامل تغذیه‌ای و مدیریتی با همدیگر است. همچنین ممکن است تشابه ژنتیکی جوجه‌های آزمایشی عامل دیگری در عدم تفاوت بین جیره‌ها از لحاظ درصد لاشه‌ها باشد.

در ارتباط با درصد سینه، جوجه‌های دریافت‌کننده جیره دارای ۲ گرم اسید بوتیریک و ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم و جوجه‌های دریافت‌کننده جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم دارای درصد سینه پایین‌تری نسبت به گروه شاهد بودند ($P < 0/05$). همچنین افزودن ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم در مقایسه با سطح ۱۲۵ میلی گرم به طور معنی‌داری سبب افزایش درصد سینه جوجه‌ها شد. جیره‌های آزمایشی بر درصد ران جوجه‌های گوشتی تاثیر معنی‌داری داشتند به طوری که جوجه‌های دریافت‌کننده جیره حاوی ۲ گرم در کیلوگرم اسید بوتیریک و جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم در کیلوگرم ال-کارنیتین درصد ران را در مقایسه با گروه شاهد کاهش دادند ($P < 0/05$).

مشابه با نتیجه آزمایش حاضر، با توجه به عدم تاثیر اسید بوتیریک بر درصد سینه و ران جوجه‌ها در مقایسه با گروه شاهد، در آزمایشی محققین با استفاده از سطوح مختلف اسید بوتیریک (۱، ۲ و ۴ گرم در کیلوگرم) در جیره جوجه‌های گوشتی، عدم تاثیر اسید بوتیریک بر درصد سینه (به عنوان درصدی از وزن بدن) جوجه‌های گوشتی را گزارش کردند (۱۳).

ال-کارنیتین راندمان مصرف انرژی از لیپیدهای خوراک را افزایش می‌دهد در نتیجه به کمک ال-کارنیتین، پرنده سریعتر و آسان‌تر به انرژی مورد نیاز خود دست پیدا می‌کند و ال-کارنیتین سبب کاهش محسوس مصرف خوراک می‌شود که در آزمایش حاضر سطح ۱۲۵ میلی گرم در مقایسه با سطح ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین مصرف خوراک را کاهش داد. بهبود ضریب تبدیل جوجه‌های گوشتی در پاسخ به افزودن ال-کارنیتین به جیره ممکن است مربوط به بهبود سوخت و ساز نیتروژن باشد که از طریق اکسیداسیون کارآمد اسیدهای چرب حاصل می‌شود (۱۸).

اثر جیره‌های آزمایشی بر درصد لاشه و چربی محوطه بطنی و درصد سینه و ران جوجه‌های گوشتی در جدول ۳ نشان داده شد. جیره‌های آزمایشی حاوی اسید بوتیریک و ال-کارنیتین بر درصد لاشه و چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی تاثیر معنی‌داری نداشتند. محققین در آزمایشی گزارش کردند که افزودن اسید بوتیریک در مقدار ۲ و ۳ گرم در کیلوگرم به جیره جوجه‌های گوشتی تاثیری بر درصد چربی محوطه بطنی، پانکراس و کبد نداشته است که با نتایج آزمایش حاضر هم خوانی داشت (۱۶). همچنین افزودن ۲۰۰ میلی گرم ال-کارنیتین به هر کیلوگرم جیره جوجه‌های گوشتی در دوره سنی ۴۲ تا ۴۹ روزگی بر صفات مربوط به لاشه از جمله چربی بطنی تاثیر معنی‌داری نداشت (۱۱) که تایید کننده نتایج این آزمایش می‌باشد. از آنجایی که چربی‌های بدن بخصوص چربی محوطه بطنی تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله ژنتیک، تغذیه، مقدار چربی جیره، کمبود و یا فراوانی لیزین و متیونین می‌باشند (۱۷) می‌توان گفت ال-کارنیتین و

جدول ۳- اثر اسید بوتیریک و ال-کارنیتین بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

Table 3. Effect of butyric acid and L-Carnitine on carcass characteristics of broiler chickens					
(درصد از وزن بدن)		(درصد جری محظوظ بطنی)		اثر اصلی اسید بوتیریک	
دودن دار	درصد سینه	دودن لاشه	دودن لاشه	بدون اسید بوتیریک	بدون اسید بوتیریک
۲۶/۶	۲۸/۷	۷۷/۴	۷۷/۴	۰/۷۵	۰/۹۰
۲۵/۵	۲۷/۹	۷۳/۷	۷۳/۷	۰/۰۶	۰/۰۹
۰/۴	۰/۲	۱/۳۰	۱/۳۰	۰/۰۹	۰/۰۹
۰/۰۸	۰/۱	۰/۸۰	۰/۸۰	۰/۰۹	۰/۰۹
خطای استاندارد از میانگین P-value					
اثر اصلی ال-کارنیتین					
۲۵/۶	۲۸/۰ ^a	۷۵/۱	۷۷/۷	بدون ال-کارنیتین	بدون ال-کارنیتین
۲۵/۴	۲۶/۰ ^b	۷۲/۱	۷۹/۹	۱۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین	۱۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین
۲۷/۱	۲۹/۰ ^a	۷۳/۴	۷۳/۴	۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین	۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین
۰/۴	۰/۴	۱/۶۰	۱/۶۰	خطای استاندارد از میانگین	خطای استاندارد از میانگین
۰/۰۶	<۰/۰۱	۰/۴۰	۰/۴۰	P-value	P-value
اوزات مقابله ^۱					
× ال-کارنیتین					
۲۷/۰ ^a	۳۰/۱ ^a	۷۴/۰	۰/۷۶	اسید بوتیریک	اسید بوتیریک
۲۵/۰ ^{bc}	۲۶/۰ ^b	۷۷/۴	۰/۹۳	۰/۹۳	۰/۹۳
۲۷/۰ ^a	۲۹/۰ ^a	۷۳/۸	۰/۹۸	۰/۹۸	۰/۹۸
۲۷/۰ ^c	۲۸/۰ ^{ad}	۷۶/۰	۰/۷۹	۰/۷۹	۰/۷۹
۲۵/۰ ^{abc}	۲۶/۰ ^b	۷۱/۸	۰/۸۴	۰/۸۴	۰/۸۴
۲۶/۰ ^{ad}	۲۹/۰ ^a	۷۳/۱	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳
۰/۶	۰/۶	۲/۲۶	۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۱۰
۰/۰۱	<۰/۰۵	۰/۸۰	۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۳۰
خطای استاندارد از میانگین P-value					

^{a,b,c}-اعداد دارای حروف غیر مشترک در هر سطح درصد با هم اختلاف معنی دارند.

*= اسید بوتیریک (گرم در کیلوگرم جیره) و ال-کارنیتین (میلی گرم در کیلوگرم جیره)

عامل احتمالاً می‌تواند دلیلی برای افزایش درصد سینه در جوجه‌های تعذیه شده با جیره حاوی ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین باشد.

نتیجه تاثیر جیره‌های آزمایشی بر رنگ گوشت سینه و ران در ۲۴ ساعت بعد از کشتار در جدول ۴ ارائه شده است. بین جیره‌های آزمایشی تفاوت معنی داری از لحاظ رنگ گوشت سینه (۱a و ۱b) مشاهده نشد. همچنین جیره‌های آزمایشی بر میزان قرمزی و زردی رنگ گوشت ران تاثیری نداشتند ($P > 0.05$) (P).

در آزمایش دیگری افزودن افزایشی (۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) ال-کارنیتین به جیره جوجه‌های گوشتی سبب افزایش درصد گوشت سینه شد که با اثر افزایشی ال-کارنیتین روی درصد سینه آزمایش حاضر هم خوانی داشت (۲۳).

افزایش ال-کارنیتین از سطح ۱۲۵ میلی گرم به ۲۵۰ میلی گرم در جیره به طور معنی داری باعث افزایش درصد ران و سینه جوجه‌ها شد. نتایج مربوط به درصد چربی که در جدول ۵ گزارش شده نشان می‌دهد که جیره حاوی ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین باعث افزایش درصد چربی سینه شد که این

جدول ۴- اثر اسید بوتیریک و ال-کارنیتین بر رنگ گوشت سینه و ران (۲۴ ساعت بعد از کشتار)

Table 4. The effect of butyric acid and L-Carnitine on breast and thigh meat color (24 hours postmortem)						اثر اصلی اسید بوتیریک	
گوشت ران			گوشت سینه			بدون اسید بوتیریک	بدون اسید بوتیریک
۱	a	b	۱	a	b	بدون اسید بوتیریک	بدون اسید بوتیریک
۵۳/۶۹	۱۵/۰۷	۱۲/۵۱	۵۱/۸۷	۱۳/۰۰	۱۳/۷۸	۰/۹۰	۰/۹۰
۵۱/۳۸	۱۳/۷۸	۱۱/۷۰	۵۱/۵۲	۱۴/۷۸	۱۴/۱۵	۰/۹۳	۰/۹۳
۱/۰۳	۱/۷۵	۱/۶۸	۲/۱۶	۱/۴۱	۱/۲۲	۰/۹۸	۰/۹۸
۰/۰۳	۰/۴۸	۰/۷۳	۰/۹۱	۰/۳۸	۰/۸۳	۰/۸۳	۰/۸۳
خطای استاندارد از میانگین P-value							
۵۶/۱۹ ^a	۱۷/۷۰	۱۴/۸۴	۴۸/۶۶	۱۴/۷۷	۱۳/۲۳	۰/۷۷	۰/۷۷
۵۱/۱۵ ^a	۱۴/۸۰	۱۲/۶۴	۵۱/۴۴	۱۴/۲۶	۱۵/۰۰	۰/۷۶	۰/۷۶
۴۷/۲۶ ^b	۹/۹۴	۸/۸۱	۵۱/۹۹	۱۲/۶۴	۱۳/۱۷	۰/۹۹	۰/۹۹
۲/۰۰	۲/۱۵	۲/۰۶	۲/۶۴	۱/۷۳	۱/۰۰	۰/۹۰	۰/۹۰
۰/۰۱	۰/۰۶	۰/۱۴	۰/۳۲	۰/۶۶	۰/۶۱	۰/۰۶	۰/۰۶
خطای استاندارد از میانگین P-value							
گوشت ران			ال-کارنیتین			اسید بوتیریک ×	اسید بوتیریک ×
۵۱/۷۶ ^{ab}	۴/۳۰	۷/۰۸	۴۷/۲۳	۱۲/۶۶	۱۳/۰۱	۰/۷۰	۰/۷۰
۵۹/۹۴ ^a	۶/۵۳	۱۰/۸۹	۵۳/۵۹	۱۲/۲۱	۱۶/۲۵	۰/۷۵	۰/۷۵
۴۹/۳۷ ^b	۱۱/۸۳	۱۱/۰۶	۵۴/۷۹	۱۴/۱۳	۱۲/۰۹	۰/۷۰	۰/۷۰
۶/۰۱ ^a	۴/۷۶	۷/۰۵	۵/۱۹	۱۶/۰۹	۱۳/۶۴	۰/۷۶	۰/۷۶
۴۷/۱۴ ^b	۷/۱۴	۱۱/۵۷	۵۵/۱۹	۱۶/۲۱	۱۴/۱۶	۰/۷۶	۰/۷۶
۴۵/۱۶ ^b	۶/۱۶	۷/۷۴	۴۹/۱۸	۱۱/۱۴	۱۴/۶۴	۰/۷۰	۰/۷۰
۲/۱۳	۲/۰۰	۲/۰۴	۴۷/۱۳	۲/۴۵	۲/۱۲	۰/۷۰	۰/۷۰
<۰/۰۱	۰/۱۷	۰/۴۵	۰/۵۷	۰/۵۱	۰/۸۰	۰/۰۰	۰/۰۰
خطای استاندارد از میانگین P-value							

c-اعداد دارای حروف غیر مشترک در هر سطح درصد با هم اختلاف معنی دارند.

L=روشنی، a=زردی و b=قرمزی. *=اسید بوتیریک (گرم در کیلوگرم جیره) و ال-کارنیتین (میلی گرم در کیلوگرم جیره)

میلی‌گرم ال-کاربینتین در کیلوگرم و جیره دارای ۲ گرم در کیلوگرم اسید بوتیریک در مقایسه با جوجه‌های گروه شاهد pH گوشت سینه بالاتری را دارا بودند ($P<0.05$). صفات مرتبط با کیفیت گوشت مانند رنگ گوشت، طرفیت نگهداری آب، حساسیت به لمس بر pH گوشت موثر هستند (۲۷). کاهش pH گوشت در طول فرآیند انجماد لاشه به علت هیدرولیز ATP و تجمع اسید لاتکتیک است (۴). نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات ژانگ و همکاران (۲۷) مطابقت نداشت. آنها گزارش کردند که ال-کاربینتین سبب افزایش قرمزی و زردی عضله ران و سینه جوجه‌های گوشته گردید.

مقدار گلیکوژن در عضلات قبل از کشتار و میزان کاهش آن پس از کشتار تعیین کننده میزان کاهش pH ماهیچه طی ۲۴ ساعت پس از کشتار می‌باشد (۱۴) و گلیکوژن موجود در ماهیچه می‌تواند به وسیله ترکیب جیره دستکاری شود (۲۱) که یکی از این ترکیبات ال-کاربینتین است. ال-کاربینتین از طریق ممانعت کردن از فعالیت آنزیم غیرهوازی و کلیدی فسفوفروکتوکیناز از کاهش حداکثری میزان گلیکولیز جلوگیری می‌کند و همچنین از طریق کاهش نسبت استیل کوآنزیم-۱ به کوآنزیم-۱ سبب کاهش تولید لاکتانت می‌شود. بنابراین ال-کاربینتین از طریق کاهش اسید لاتکتیک اضافی خون و بافت در هنگام فعالیت شدید می‌تواند سبب بهبود عملکرد حیوان شود (۳). تحقیقات نشان داده که استیل ال-کاربینتین اثر مشبتش بر حفظ pH نسبی بالای گوشت سینه و ران دارد به طوری که افزودن استیل ال-کاربینتین (۰،۳۰۰ و ۰،۹۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) به جیره جوجه‌ها سبب می‌شود که pH گوشت سینه ۲۴ ساعت بعد از کشتار افزایش یابد که با نتایج آزمایش حاضر به دلیل عدم تاثیر تیمارهای آزمایشی بر افزایش pH گوشت هم‌خوانی نداشت (۲۷). در رابطه با علت تاثیر اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت (رنگ و pH) دلایل واضحی به دست نیامد و احتمالاً به دلیل تاثیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بر اکسیداسیون اسیدهای چرب گوشت و سپس تاثیر بر کیفیت گوشت باشد.

جوشهای دریافت‌کننده جیره‌های حاوی ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک همراه با ال-کاربینتین (۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) و جیره حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ال-کاربینتین دارای گوشت ران تیره‌تری در مقایسه با سایر جیره‌های حاوی افزودنی داشتند ($P<0.05$) اما تفاوت آنها با با گروه شاهد معنی‌دار نبود. ساریکا و همکاران (۲۳) با بررسی اثر مکمل ال-کاربینتین در بلدرچین گزارش کردند که افزودن ۵۰ میلی‌گرم ال-کاربینتین در کیلوگرم سبب افزایش میزان روشنایی رنگ گوشت می‌شود (۲۳) که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت نداشت.

ژانگ و همکاران (۲۷) گزارش کردند که افزودن استیل ال-کاربینتین (صفر، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) به جیره جوجه‌ها سبب افزایش معنی‌دار مقدار درجه قرمزی و کاهش مقدار درجه زردی گوشت سینه و ران شد. در بدن پستانداران پروتئینی به نام میوگلوبین وجود دارد و اکسیژن توسط هموگلوبین به میوگلوبین می‌رسد و در واقع این پروتئین نقش واسطه را بین خون و فیبرهای ماهیچه‌ای بازی می‌کند (۲۲). احتمالاً علت تاثیر ال-کاربینتین بر میزان روشنایی رنگ گوشت به علت اثر ممانعت‌کننده‌گی ال-کاربینتین بر اکسیداسیون میوگلوبین ماهیچه گوشت می‌باشد (۲۲). در آزمایشی گزارش شده که افزودن اسیدهای خوارکی به مواد غذایی علاوه بر اثرات مهاری بر میکرووارگانیسم‌ها، موجب ایجاد طعم و رنگ مناسب در مواد غذائی می‌شود (۸).

اثر جیره‌های آزمایشی بر pH گوشت سینه و ران جوجه‌ها در جدول ۵ آمده است. جیره‌های آزمایشی بر pH گوشت سینه و ران در زمان ۴۵ دقیقه بعد از کشتار تاثیر معنی‌داری داشتند در حالیکه بر pH گوشت سینه و ران در ۲۴ ساعت پس از کشتار و فاصله زمانی ۴۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت بعد از کشتار تاثیری نداشتند ($P>0.05$). تقدیم جیره‌های دارای اسید بوتیریک در مقایسه با جوجه‌های گروه شاهد pH گوشت ران پائین‌تری را دارا بودند ($P<0.05$). جوجه‌های دریافت‌کننده جیره حاوی ۱۲۵ میلی‌گرم در کیلوگرم ال-کاربینتین به طور معنی‌داری دارای pH گوشت ران بالاتری در ۴۵ دقیقه پس از کشتار در مقایسه با گروه شاهد و سایر جیره‌های حاوی افزودنی بودند. جوجه‌های دریافت‌کننده جیره حاوی ۲۵۰

جدول ۵- اثر اسید بوتیریک و ال-کارنیتین بر pH گوشت سینه و ران جوجه‌های گوشتی

Table 5. The effect of butyric acid and L-Carnitine on breast and thigh meat pH of broiler chickens					
pH ¹	pH ¹	۲۴h	۲۴h	۴۵m	۴۵m
سینه	ران	سینه	ران	سینه	ران
.۰/۵	.۰/۹۹	۶/۰۵	۶/۳۶	۶/۳۳	۶/۳۱ ^a
.۰/۷	.۰/۲۸	۶/۰۵	۶/۲۸	۶/۳۳	۶/۲۱ ^b
.۰/۵	.۰/۰۳	.۰/۰۳	.۰/۰۵	.۰/۲۷	.۰/۰۳
.۰/۷۰	.۰/۹۸	.۰/۹۴	.۰/۲۹	.۰/۹۴	.۰/۰۲
اثر اصلی اسید بوتیریک					
بدون اسید بوتیریک					
۲ گرم اسید بوتیریک					
خطای استاندارد از میانگین					
P-value					
اثر اصلی ال-کارنیتین					
بدون ال-کارنیتین					
۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین					
۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین					
خطای استاندارد از میانگین					
P-value					
اثرات متقابل ^۱					
ال-کارنیتین × اسید بوتیریک					
.۰/۱۹	.۰/۴۴	۶/۰۶	۶/۴۲	۶/۲۵ ^b	۶/۱۸ ^a
.۰/۱۶	.۰/۱۳	۶/۰۴	۶/۳۴	۶/۴۰ ^{ab}	۱۲۵
.۰/۴۰	.۰/۱۷	۶/۰۶	۶/۴۱	۶/۴۶ ^a	۲۵۰
.۰/۲۹	.۰/۱۱	۶/۱۴	۶/۳۸	۶/۴۳ ^a	۰
.۰/۲۰	.۰/۱۸	۵/۹۶	۶/۳۴	۶/۲۶ ^b	۱۲۵
.۰/۲۶	.۰/۱۴	۶/۰۴	۶/۲۵	۶/۳۰ ^{ab}	۲۵۰
.۰/۱۶	.۰/۰۹	.۰/۰۵	.۰/۰۹	.۰/۰۴	.۰/۰۵
.۰/۰۶	.۰/۰۹	.۰/۵	.۰/۵۷	.۰/۰۴	<.۰/۰۱
P-value					

a-عداد دارای حروف غیر مشترک در هر ستون در سطح ۵ درصد باهم اختلاف معنی دارند.

b=pH(۱ تفاوت pH گوشت بین زمان های ۴۵ دقیقه و ۲۴ ساعت پس از کشتار).

c=اسید بوتیریک (گرم در کیلوگرم جیره) و ال-کارنیتین (میلی گرم در کیلوگرم جیره)

لپتین، پیتید مشابه گلوکاگون ۱ و انسولین بر متاپولیسیم گلوکز، چربی و کلسترول و عملکرد طیور تاثیرگذار می‌باشد (۲۸). اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با تاثیر گذاری بر این گیرنده‌ها با تاثیر بر تولید هورمون پیتیدی روده‌ای (PYY) و گلوکاگون روده‌ای قادر به افزایش سطح گلوکز خون می‌باشد. اسیدهای چرب کوتاه زنجیر باعث فعال شدن آنزیم پروتئین کیاز فعال کننده AMP در کبد و عضلات می‌شود و این آنزیم یکی از فاکتورهای موثر بر متاپولیسیم چربی در بافت‌ها می‌باشد به طوریکه باعث افزایش بتا-اکسیداسیون اسیدهای چرب و کاهش سنترا اسیدهای چرب می‌شود که این عمل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر مشابه تاثیر ال-کارنیتین در بافت‌ها و عضلات می‌باشد (۲۸). کاهش چربی عضله و بهبود رنگ گوشت در اثر استفاده از اسید چرب ۴ کربنه در این آزمایش را می‌توان به اثرات تحریکی این اسید چرب بر ترشح لپتین که یک هورمون کاهنده چربی بدن می‌باشد و همچنین افزایش احتمالی بتا-اکسیداسیون اسیدهای چرب ارتباط داد.

اثر جیره‌های آزمایشی بر درصد چربی گوشت سینه و ران جوجه‌ها در جدول ۶ ارائه شده است. نتایج جدول ۵ نشان داد که جیره‌های آزمایشی بر درصد چربی ران تاثیر معنی داری نداشتند در حالیکه درصد چربی سینه جوجه‌های گوشتی تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفت ($P<0.05$). تغذیه اسید بوتیریک به جوجه‌ها سبب کاهش معنی دار درصد چربی سینه نسبت به گروه شاهد شد. جوجه‌های دریافت کننده جیره حاوی ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم و جوجه‌های دریافت کننده جیره حاوی ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک به ترتیب بیشترین درصد چربی سینه را داشتند و کمترین درصد چربی سینه مربوط به جیره حاوی ۱۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین و ۲ گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک بود ($P<0.05$).

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به مانند بوتیرات دارای گیرنده‌های متصل به G-پروتئین در سطح سلول‌های بافت چربی، کبد و استخوان، روده و ماکروفازها از قبیل Ffar2 و Ffar3 هستند که از طریق تاثیرگذاری بر تولید هورمون

جدول ۶- اثر اسید بوتیریک و ال-کارنیتین بر غلظت لاکات گوشت سینه و درصد چربی سینه و ران جوجه‌های گوشتی
Table 6. Effect of butyric acid and l-Carnitine on breast meat lactate concentration and fat percentage of breast and thigh meat of broiler chickens

اثر اصلی اسید بوتیریک	لاکات (میکرومول بر گرم)	جری سینه	جری ران	اثر اصلی ال-کارنیتین
بدون اسید بوتیریک	۲۲/۲۴	۹/۸۳	۴/۱۶ ^a	بدون ال-کارنیتین
۲ گرم اسید بوتیریک	۲۳/۸۷	۱۲/۲۲	۳/۵۰ ^b	۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین
خطای استاندارد از میانگین	۲/۸۴	۰/۹۲	۰/۱۳	۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین
P-value	۰/۲۶	۰/۰۹	<۰/۰۱	خطای استاندارد از میانگین
				P-value
اثرات متقابل ^۱				
اسید بوتیریک	ال-کارنیتین			
۲۲/۵۱	۱۱/۲۵	۴/۰۰ ^a		
۲۲/۸۹	۹/۷۵	۳/۲۵ ^b		
۲۲/۲۷	۱۲/۰۸	۴/۲۵ ^a		
۴/۷	۱/۱۳	۰/۲۰		
۰/۷۸	۰/۳۷	<۰/۰۱		
				c-a,b,c-d اعداد دارای حروف غیر مشترک در هر ستون دارای اختلاف معنی‌داری هستند (<۰/۰۵).
				^a = اسید بوتیریک (گرم در کیلوگرم جبره) و ال-کارنیتین (میلی گرم در کیلوگرم جبره)

همکاران، ال-کارنیتین به طور معنی‌داری باعث کاهش خوارک مصرفی و ضریب تبدیل جوجه‌ها شد و جوجه‌های دریافت‌کننده جبره‌ی حاوی ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین و جبره‌ی حاوی ۱۲۵ میلی گرم ال-کارنیتین و ۲ گرم اسید بوتیریک کمترین خوارک مصرفی و ضریب تبدیل خوارک مصرفی را طی کل دوره پرورش داشتند (۹).

استفاده از میزان ۱۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین به تنها یک یا همراه با اسید ۲ گرم بر کیلوگرم بوتیریک تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی داشتند و افزودن ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم علاوه بر افزایش هزینه پرورش، تاثیر مفیدی بر عملکرد نداشت. استفاده از ترکیب ال-کارنیتین و اسید بوتیریک در جبره‌ی جوجه‌های گوشتی سبب بهبود خصوصیات لاشه (درصد سینه و ران)، رنگ و pH گوشت شد. در این میان سطح ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین از نظر بهبود صفات کیفیت لاشه در مقایسه با سطح ۱۲۵ میلی گرم اثر بهتری داشت. همچنین اثر اسید بوتیریک به تنها یک یا همراه با سطح ۲۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین روی خصوصیات و کیفیت گوشت اثر مثبتی داشت. در کل استفاده از اسید بوتیریک و ال-کارنیتین می‌توانند به عنوان بهبوددهنده خصوصیات لاشه طیور مورد استفاده قرار گیرند و تاثیر استفاده همزمان این دو ترکیب بیشتر از استفاده از هر کدام به تنها یابود.

در آزمایشی زو و همکاران (۲۴) گزارش کردند که ال-کارنیتین در سطوح ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم سبب افزایش محتوای چربی گوشت سینه شد (۲۴) که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت داشت. ال-کارنیتین از طریق کاهش فعالیت آنزیم‌های بافت چربی (آنزیم‌های گلوك-۶-فسفات دهیدروژناز، مالیک دهیدروژناز، ایزو-سیترات دهیدروژناز و لیپوپروتئین لیپاز) باعث کاهش چربی زیر پوستی در سینه و ران می‌شود و با افزایش فعالیت آنزیم کارنیتین پالmitول ترانسفراز-۱ که یک آنزیم کنترلی در اسیدیاسیون اسیدهای چرب است سبب افزایش چربی داخل عضلانی سینه می‌شود (۲۴). سویک و سویلان (۵) اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم جبره) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی را بررسی کردند. بالاترین سطح چربی عضله سینه در جوجه‌هایی که ۱۵۰ میلی گرم ال-کارنیتین دریافت کرده بودند، وجود داشت. همچنین ال-کارنیتین سبب افزایش وزن بدن جوجه‌ها شد (۵). اثر جبره‌های آزمایشی بر میزان لاکات گوشت جوجه‌های گوشتی در جدول ۵ آمده است. جبره‌های آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر میزان لاکات خون جوجه‌ها نداشتند (>۰/۰۵). عدم تاثیر جبره‌های حاوی مکمل ال-کارنیتین بر لاکات گوشت لاشه جوجه‌های گوشتی ممکن است به دلیل مقادیر ناکافی آن در جبره‌ها باشد. در آزمایش نوره و

منابع

1. Adil, S., T. Banday, G. Ahmad Bhat, M. Salahuddin, M. Raquib and S. Shanaz. 2011. Response of broiler chicken to dietary supplementation of organic acids. *Journal of Central European Agriculture*, 12(3): 498-508.
2. Antongiovanni, M., A. Buccioni, P. Francesco, S. Leeson, S. Minieri, A. Martini and R. Cecchi. 2007. Butyric acid glycerides in the diet of broiler chickens: effects on gut histology and carcass composition. *Italian Journal of Animal Science*, 6: 19-25.
3. Brevetti, G., M. Chiariello, G. Ferulano, A. Policicchio, E. Nevola, A. Rossini, T. Attisano, G. Ambrosio, N. Siliprandi and C. Angelini. 1988. Increases in walking distance in patients with peripheral vascular disease treated with L-carnitine: a double-blind, cross-over study. *Circulation*, 77: 767-773.
4. Calkins, C., T. Dutson, G. Smith and Z. Carpenter. 1982. Concentration of creatine phosphate, adenine nucleotides and their derivatives in electrically stimulated and nonstimulated beef muscle. *Journal Food Science*, 47: 1350-1353.
5. Cevik, A. and N. Ceylan. 2005. Effects of dietary L-Carnitine supplementation on performance and carcass traits of broiler chickens. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Adana. Links, 391-396.
6. Cakir, S. and S. Yalcin. 2007. Effects of L-Carnitine supplementation in diets with low energy level on growth performance and carcass traits in broilers. *Review of Veterinary Medicience*, 158: 291-296.
7. Corduk, M. and N. Ceylan. 2007. Effects of dietary energy density and L-Carnitine supplementation on growth performance, carcass traits and blood parameters of broiler chickens. *South African Journal of Animal Science*, 37(2): 65-73.
8. Fatemi, H. 2001. Food chemistry. Sherkat Sahami Enteshar, PP: 420-423 and 429- 431 (In Persian).
9. Kahatibjoo, A., Z. Nooreh, F. Fattahnia and M. Akbari-Gharaei. 2015. Considering the Performance and Immune Response of Broiler Chickens Fed Diet Containing Butyric Acid and L-Carnitine Supplement. *Journal of Animal Production (Tolidat Dami)*, 2(17): 269-279 (In Persian).
10. Ins, S. SAS Institute. 2001. SAS Procedures Guide. Version, 9.
11. Kheirkhah, A., S. Rahimi, M.K. Torshizi and H. Malekmohamadi. 2009. Effect of different levels of L-carnitine supplementation in broiler breeders and their progeny's diets on performance, blood factors, carcass characteristics and immune system of broilers. *Journal of Veterinary Research*, 64: 283-289.
12. Le Bihan-Duval, E., N. Millet and H. Remignon. 1999. Broiler meat quality: Effect of selection for increased carcass quality and estimates of genetic parameters. *Poultry Science*, 78: 822-826.
13. Leeson, S., H. Namkung, M. Antongiovanni, and E. Lee. 2005. Effect of butyric acid on the performance and carcass yield of broiler chickens. *Poultry Science*, 84(9): 1418-1422.
14. Lister, D., R. Sair, J. Will, G. Schmidt, R. Cassens, W. Hoekstra and E. Briskey. 1970. Metabolism of striated muscle of stress-susceptible pigs breathing oxygen or nitrogen. *The American journal Physiology*, 218, 102-107.
15. Malaii Kadlisi, M.R. and F. Mirzaei Aghjeh Gheshlagh. 2012. Effects of probiotic *saccharomyces cervisia* and organic acids on performance and small intestinal morphology in broiler chickens. *Research on Animal Production*, 3, 6(12): 25-34.
16. Nezhady, M.A.M., S.L. Zabihi and M.M. Kalhori. 2011. Effect of Different Level of Butyric Acid Glycerides on Performance and Serum Composition of Broiler Chickens. *World Journal Zoolog*, 6: 179-182.
17. Rabie, M.H., M. SziláGyi and T. Gippert. 1997. Effects of dietary L-carnitine on the performance and egg quality of laying hens from 65-73 weeks of age. *British Journal Nutrition*, 78: 615-623.
18. Rabie, M.H. and M. Szilagyi. 1998. Effects of L-carnitine supplementation of diets differing in energy levels on performance, abdominal fat content and yield and composition of edible meat of broilers. *British Journal of Nutrition*, 80(04): 391-400.
19. Rajabzadeh Nesvan, M. 2012. Effect of l-Carnitine supplementation to diets with different sources of fat on performance, body composition and blood parameters in broiler chickens. *Research on Animal Production*, 3, 5(11): 40-52.
20. Reilly, K.J., W.L. Frankel, A.M. Bain and J.L. Rombeau. 1995. Colonic short chain fatty acids mediate jejunal growth by increasing gastrin. *Gut*, 37(1): 81-86.
21. Rosenvold, K., B. Essén-Gustavsson and H.J. Andersen. 2003. Dietary manipulation of pro-and macroglycogen in porcine skeletal muscle. *Journal Animal Science*, 81: 130-134.
22. Ross 308 Broiler Nutrition Specification. 2009. Managementguide. Zarbal Co. IRIRAN.
23. Sarica, S., M. Corduk, U. Ensoy, H. Basmacioglu and U. Karatas. 2007. Effects of dietary supplementation of L-carnitine on performance, carcass and meat characteristics of quails. *South African Journal Animal Science*, 37: 189-201.
24. Xu, Z.R., M.Q. Wang, H.X. Mao, X.A. Zhan and C.H. Hu. 2003. Effects of L-Carnitine on growth performance, carcass composition and metabolism of lipids in male broilers. *Poultry Science*, 82(3): 408-413.
25. Yam, K.L. and S.E. Papadakis. 2004. A digital imaging method for measuring and analyzing color of food surface. *Journal of Food Engineering*, 61: 137-142.
26. Zhang, L., H. Yue, H. Zhang, L. Xu, S. Wu, H. Yan, Y. Gong and G. Qi. 2009. Transport stress in broilers: I. Blood metabolism, glycolytic potential, and meat quality. *Poultry Science*, 88: 2033-2041.
27. Zhang, Y., Q. Ma, X. Bai, L. Zhao, Q. Wang, C. Ji, L. Liu and H. Yin. 2010. Effects of dietary acetyl-L-carnitine on meat quality and lipid metabolism in arbor acres broilers. *Asian-Aust. Journal Animal Science*, 23: 1639-1644.
28. Xiong, Y., N. Miyamoto, K. Shibata, M.A. Valasek, T. Motoike, R.M. Kedzierski and M. Yanagisawa. 2004. Short-chain fatty acids stimulate leptin production in adipocytes through the G protein-coupled receptor GPR41. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101: 1045-1050.

Effects of L-Carnitine and Butyric Acid on Carcass Characteristics and Meat Quality of Broiler Chickens

Ali Khatibjoo¹, Zahra Nooreh², Farshid Fattahnia³ and Mohammad Akbari-Gharaei³

1- Assistant Professor, Department of Animal Science, ILAM University,
(Corresponding author: a.khatibjoo@gmail.com)

2 and 3- Graduated M.Sc. Student and Associate Professor, Department of Animal Science, ILAM University
Received: 11 November 2014 Accepted: 4 September 2016

Abstract

This experiment was conducted in order to consider the effect of L-carnitine (0, 125 and 250 mg/kg) and butyric acid (2 g/kg) on Carcass characteristics and meat quality of broiler chicken. In a 2×3 factorial arrangement in randomized complete block design 192 Ross 308 one-day-old broiler chicks were assigned to 6 dietary treatments with 4 replicates and 8 birds. Results showed that broilers fed basal diet plus 125 mg/kg L-Carnitine and basal diet plus 125 mg/kg L-Carnitine plus 2 gr/kg butyric acid had lower FI and the better FCR as compared to control group ($P > 0.05$). Broilers fed basal diet plus 250 mg/kg L-Carnitine had higher breast percentage as compared to 125 mg/kg L-Carnitine ($P < 0.05$) while did not have significant difference with control group ($P > 0.05$). Broilers fed basal diet plus 2 gr/kg butyric acid without L-Carnitine had lower tight percentage compare to control group ($P < 0.05$). Except thigh meat lightness, breast and tight meat color and breast lactate concentration did not affected by dietary treatments ($P > 0.05$). Broilers fed basal diet plus 2 gr/kg butyric acid without L-Carnitine decreased tight meat 45min postmortem and 125 mg/kg L-Carnitine without butyric acid treatment increased tight meat 45min postmortem pH as compared to control group ($P < 0.05$). Broilers fed basal diet plus 2 gr/kg butyric acid lowered breast meat lipid percentage ($P < 0.05$) whereas broilers fed basal diet plus 250 mg/kg L-Carnitine and basal diet plus 2 gr/kg butyric acid had higher breast lipid percentage as compared to control group ($P < 0.05$) but tight lipid percentage did not affected by dietary treatments ($P > 0.05$). In conclusion basal diet plus 125mg/kg L-Carnitine and basal diet with 125mg/kg L-Carnitine plus 2 gr/kg butyric acid had the best effect on broiler chickens performance and using basal diet plus 250 mg/kg L-Carnitine increased broiler breast percentage while 2 gr/kg butyric acid decreased breast meat lipid percentage of broiler chicken.

Keywords: Broiler Chicken, Butyric Acid, Carcass characteristics, L-Carnitine, Meat Quality