



ارتباط چندشکلی‌های اگزون ۲ ژن فاکتور رونویسی ۷ با صفات چربی خون و دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری و زل

اصغر بزار پریخانی^۱, مصطفی صادقی^۲ و حسین مرادی شهربابک^۳

۱ و ۳- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
۲- دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسؤول): sadeghimos@ut.ac.ir
تاریخ پذیرش: ۹۴/۳/۳۰ تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۲

چکیده

ژن فاکتور رونویسی ۷ (TCF7) در منطقه ژنومی کاندیدا برای صفات چربی روی کروموزوم ۵ گوسفند واقع شده است. در مطالعه حاضر از ۱۶۳ راس گوسفند نژاد لری بختیاری ایستگاه اصلاح نژاد شوالی شهرکرد و ۱۱۲ راس گوسفند نژاد زل ایستگاه اصلاح نژاد شیبرنگ گرگان خونگیری به عمل آمد. استخراج DNA از نمونه‌های خون به روش بهینه یافته نمکی و واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه ۶۴۳ جفت بازی اگزون ۲ ژن TCF7 انجام گرفت. تعیین الگوهای ژنتیکی دام‌ها بر اساس الگوی بدست آمده در الکتروفوروز عمودی و رنگ آمیزی بر روی ژل اکریل آمید سه الگوی ژنتیکی AA و AB و BB را مشخص نمود. به طوری که در نژاد زل الگوهای ژنتیکی AA و AB به ترتیب با فراوانی ۷۱ و ۲۹ درصد و در نژاد لری بختیاری الگوهای ژنتیکی BB به ترتیب با فراوانی ۹۰ و ۱۰ درصد دیده شدند. اثر الگوهای ژنتیکی مشاهده شده در جایگاه ژن TCF7 بر صفات چربی خون در نژاد زل معنی‌دار نبود، ولی در نژاد لری بختیاری این اثرات معنی‌دار بود. به طوری که ژنتیک AB بیشترین تاثیر را روی وزن دنبه و کلسترول خون و ژنتیک BB تاثیر به سازابی روی تری‌گلیسرید خون داشت.

واژه‌های کلیدی: گوسفند، ژن TCF7، PCR-SSCP، وزن دنبه، کلسترول خون، تری‌گلیسرید خون

مقدمه

روی کروموزوم ۷ نیز حاکی از شواهد آشکاری از انتخاب و افزایش همزاویگویی به نفع نژاد بدون دنبه بوده است. بنابراین، بر اساس نتایج گزارش شده توسط مرادی و همکاران (۶) انتظار می‌رود که این مناطق در ارتباط با ذخیره چربی باشند. در رابطه با منطقه کاندیدا روی کروموزوم ۵، بررسی‌های انجام شده با استفاده از سایتها بیوانفورماتیکی حاکی از وجود ژن TCF7 و چند ژن دیگر در این منطقه است که در این پژوهش تمرکز روی ژن TCF7 بوده است. ژن TCF7 که نام سابق آن TCF-1 (شماره شناسایی در بانک ژن X63901) است، از خانواده فاکتورهای رونویسی HMG box است. این خانواده همچنین شامل TCF-4 نیز است (۹). این ژن در انسان روی کروموزوم ۵ و در گاو روی کروموزوم ۷ قرار گرفته است. وند و ترینگ و همکاران در سال ۱۹۹۲ گزارش کردند که ژن TCF7 شامل حداقل ۱۰ اگزون است که اگزون اول کدکننده نیست. ژن همولوگ TCF7 در مוש روی کروموزوم ۱۱ قرار دارد (۴). در سال ۱۹۹۱ معلوم گردید که TCF7 دارای ۳ ایزوفرم است که TCF1A و TCF1C و TCF1B نامیده می‌شوند (۱۱). پروتئینی که توسط این ژن کد می‌شود به عنوان یک فعال‌کننده رونویسی عمل می‌کند که احتمالاً در بسیاری از مسیرهای متابولیکی بدن می‌تواند شرکت کند. تاکنون در رابطه با این ژن‌ها هیچ گونه پژوهشی در گوسفند و دیگر حیوانات مزرعه‌ای انجام نشده است و این اولین پژوهش مورد در رابطه با مطالعه‌ی چند شکلی این ژن در حیوانات مزرعه‌ای می‌باشد.

صفات مرتبط با چربی از جمله صفاتی هستند که چه از دیدگاه اقتصادی در پرورش گوسفند و چه از لحاظ سلامتی و ایجاد بیماری‌های مرتبط با چاقی در انسان دارای اهمیت زیادی می‌باشند. داشتن دنبه صفتی است که کلیه نژادهای اهلی شده‌ی گوسفند را می‌توان براساس آن به دو گروه عمدی دنبه‌دار و بدون دنبه تقسیم‌بندی کرد. دنبه به دنبال یک پاسخ اطباقی در گوسفند در مقابله با شرایط نامساعد محیطی تکامل یافته است که یک ذخیره ارزشمند انرژی طی مهاجرت و زمستان محسوب می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که شرایط اقلیمی و نیازهای بشری هر دو باعث انتخاب در جهت افزایش اندازه دنبه در این نژادها طی نسل‌های طولانی شده است (۷،۸). در مطالعه‌ای که مرادی و همکاران (۶) برای شناسایی مناطق کاندیدا در ذخیره چربی روی گوسفند انجام دادند سه منطقه‌ی ژنومی مشخص کردند که ژن TCF7 روی یکی از این مناطق در کروموزوم ۵ گوسفند واقع شده است که احتمال داده شد روی صفات رشد و چربی مؤثر باشد. این محققین نقشه انتخاب در سطح ژنومی گوسفند را توسعه داده و نشانه‌های انتخاب را در مناطق ژنومی روی کروموزوم ۵ و ۷ شناسایی کردند و گزارش کردند، که بررسی مناطق ژنومی کاندیدا روی کروموزوم های X و ۵ بیانگر آن است که انتخاب در این مناطق در جهت افزایش فراوانی آلل‌های مؤثر بر اندازه‌ی دنبه اتفاق نداشت و فراوانی آنها تا مرحله‌ی تشییت شدن نیز پیش رفته است. از طرفی، بررسی منطقه کاندیدا

شد که واکنش PCR در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر و با ترکیب ۲ میکرولیتر DNA ژنومی با غلظت ۱۰۰ نانوگرم، ۲ میکرولیتر از هر آغازگر با غلظت ۵ پیکومول، ۲/۵ میکرولیتر با فرخ ۱۰، ۰/۷۵ میکرولیتر کلرید مینیزیم با غلظت ۱/۵ میلی‌مولار، ۰/۰۷۵ میکرولیتر مخلوط نوکلئوتیدها با غلظت ۱۰ میلی‌مولار، ۰/۰۷۵ میکرولیتر معادل یک واحد آنزیم Taq پلیمراز (شرکت all Gene کره جنوبی) بهمینه گردید. آغازگر اختصاصی توسعه نرمافزار آنلاین Primer3plus و با استفاده از شماره دسترسی NC_019462 طراحی گردید (۱۰). ویژگی‌های مناسب از جمله طول پرایمر، درصد GC بهمینه، نداشتن انواع دایمها، دمای اتصال ویژه، ناجیه اختصاصی تکثیر و ساختارهای سنجاق سری با استفاده از نرمافزارهای برخط OligoAnalyzer3.1، Primer Blast پایگاه NCBI مورد بخش آزمون قرار گرفت. توالی آغازگر رفت آغازگر برگشت- ۵'-CCTTCGTCAAACCTTGGCAC-۳' و توالی آغازگر برگشت- ۵'-ATGCGACTTACACCACCCCTG- ۳' بود.

مواد و روش‌ها داده‌ها

در مطالعه حاضر از ۲۷۵ راس از نژادهای ایرانی گوسفند شامل ۱۶۳ راس گوسفند نژاد لری-بختیاری از مرکز اصلاح نژاد شولی واقع در شهرستان شهرکرد و ۱۱۲ راس گوسفند زل از مرکز اصلاح نژاد شیرینگ واقع در شهرستان گرگان به صورت تصادفی و در سنین مختلف، با استفاده از نوجکت های ۵ml حاوی ماده خد اندکاد EDTA از سیاهرگ و داجی خون گیری انجام شد.

استخراج DNA و تکثیر قطعه مورد نظر

استخراج DNA با استفاده از روش‌های معمول نمکی انجام شد (۵). غلظت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از ژل آگارز ۱٪ و روش اسپکتروفوتometری بررسی و تایید شد. تکثیر قطعه بازی از TCF7 که در برگیرنده اگزون ۲ و قسمتی از اینtronهای ۱ و ۲ است، توسط یک جفت آغازگر اختصاصی طی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با شرایط دمایی موجود در جدول ۱ توسط دستگاه ترموسایکلر (مدل XP شرکت Bioer ساخت چین) انجام

جدول ۱- دما و زمان هر یک از مراحل واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

Table 1. The temperature and time of each cycle of polymerase chain reaction

ردیف	مراحل	زمان	دما
۱	واسرشه سازی اولیه	۹۶ دقیقه	۶ درجه سانتی‌گراد
۲	واسرشه سازی	۹۶ دقیقه	۶ درجه سانتی‌گراد
۳	اصل آغازگرها	۶۰ دقیقه	۶ درجه سانتی‌گراد
۴	تکثیر	۷۲ دقیقه	۷۲ درجه سانتی‌گراد
۵	بسط نهایی	۱۰ دقیقه	۷۲ درجه سانتی‌گراد

مرحله‌ی ۲ الی ۴ به تعداد ۴۰ چرخه تکرار گردید

تعیین الگوی ژنوتیپ‌ها

امروزه PCR-SSCP به عنوان روشی توانمند و قابل اطمینان جهت آزمایش چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNP) در تعیین ژنوتیپ به شمار می‌رود. تکنیک SSCP روش مؤثری در شناسایی تنوع توالی تکثیر شده می‌باشد (۸). اساس این تکنیک مهاجرت DNA دناتوره شده از میان ژل پلی‌اکریل‌آمید غیر دناتوره براساس اندازه و توالی آن می‌باشد. بنابراین، وجود حتی یک جهش نقطه‌ای، با تفاوت حرکت در روی ژل قابل مشاهده می‌باشد (۱۳). تعیین الگوی ژنوتیپی نمونه‌ها به روش PCR-SSCP با استفاده از الکتروفوروز عمودی روی ژل پلی‌اکریل‌آمید (۱۰ درصد) و رنگ‌آمیزی با نیترات نقره انجام گرفت. بدین منظور ۱۶ میکرولیتر بافر بارگذاری مخصوص SSCP (شامل فرمامید ۶ EDTA، ۹۹٪ مولار، برموفنل و زینول‌سیانید ۱۰٪) با ۴ میکرولیتر محصول PCR مخلوط شد و سپس در دستگاه ترموسایکلر به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۹۶ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده شد تا رشته‌های DNA واسرشه شوند. نمونه‌های واسرشه شده به مدت ۱۰ دقیقه روی بخ قرار گرفتند تا از پیوند دوباره رشته‌های مکمل جلوگیری شود. برای مشاهده الگوهای باندی از تانک الکتروفوروز عمودی شرکت BioRad با صفحات شیشه‌ای به ابعاد ۰/۱ × ۲۰ × ۱۸ سانتی‌متر و ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۲٪ استفاده شد. به این ترتیب که مخلوط

محصول PCR و بافر بارگذاری مخصوص SSCP درون چاهک‌های ژل بارگذاری شدند. سپس الکتروفورز نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت و با اختلاف پتانسیل ۳۰۰ ولت در دمای چهار درجه سانتی‌گراد و با بافر (۰/۰۵X) انجام گرفت. در نهایت رنگ آمیزی ژل جهت مشاهده الگوهای باندی به روش نیترات نقره انجام شد (۱).

تجزیه و تحلیل آماری

مدل‌های مورد استفاده برای بررسی ارتباط الگوهای حاصل از ژن تحت بررسی با صفات موردنظر، در زیر آورده شده است. مدل ۱ برای صفات کلسترول، تری‌گلیسرید به صورت مشترک برای گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. مدل ۲ برای بررسی وزن دنبه در گوسفندان لری بختیاری مرکز اصلاح نژاد استفاده شد.

$$1) Y_{ijm} = \mu + G_i + S_j + b_1 (A_{ijm} - \bar{A}) + b_2 (W_{ijm} - \bar{W}) + e_{ijm}$$

$$2) Y_{ijm} = \mu + G_i + S_j + b_1 (W_{ijm} - \bar{W}) + e_{ijm}$$

که در رابطه بالا Y_{ijm} مشاهدات مربوط به صفات (کلسترول، تری‌گلیسرید و وزن دنبه)، μ میانگین صفت در جامعه، G_i اثر i امین الگوی ژنوتیپی در جایگاه j ؛ S_j اثر زامین جنس حیوان، b_1 ضریب تابعیت Y روی W (وزن ۳ ماهگی)، A سن حیوان، W وزن ۳ ماهگی و e_{ijm} اثر باقی مانده می‌باشد. لازم به ذکر

برای بررسی ارتباط بین ژنتیپ‌ها و صفات موردنظر برای دو نژاد جداگانه انجام پذیرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در نژاد زل اثر الگوهای ژنتیکی جایگاه ژن TCF7 بر صفات کلسترول و تری‌گلیسرید خون معنی‌دار نبود (جدول ۲)، ولی در نژاد لری‌بختیاری بر صفات کلسترول و تری‌گلیسرید خون و وزن دنبه معنی‌دار بود (جدول ۳). به این ترتیب که مقایسه‌ی میانگین حداقل مربعات دو الگوی ژنتیکی جایگاه ژن TCF7 روی صفات چربی در نژاد زل با هم اختلاف معنی‌دار نداشت، اما در نژاد لری‌بختیاری بین ژنتیپ AB با ژنتیپ BB برای صفات کلسترول خون و وزن دنبه در سطح خطای یک درصد ($P<0.01$) و برای صفت تری‌گلیسرید خون در سطح خطای پنج درصد ($P<0.05$) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. از آنجایی که این مطالعه اولین مطالعه در مورد چندشکلی این ژن و ارتباط آن با صفات چربی می‌باشد، پژوهش‌های موفق و مخالفی با نتایج بدست آمده در این پژوهش موجود نمی‌باشد و در توجیه این نتایج می‌توان گفت با توجه به این که این ژن در منطقه‌ی کاندیدای گزارش شده برای چربی توسط مرادی و همکاران در سال ۲۰۱۲ قرار دارد، می‌تواند به عنوان یک ژن با اثرات عمده باشد. دلیل احتمالی دیگر وجود پیوستگی ژنی بین ژن TCF7 و QTL‌های مؤثر بر صفات چربی موجود در نزدیکی این ژن می‌باشد که نمونه‌ای از این QTL‌ها، ژن FA-C16:1 است که در سال ۲۰۰۶ در پژوهشی که توسط کارامیچو و همکاران (۲) گزارش شده است که روی کروموزوم ۵ گوسفند قرار داشته و با صفات چربی مرتبط بود. بنابراین از آنجاییکه این ژن در منطقه کاندیدا برای صفات چربی و دنبه قرار دارد و همچنین پیوستگی این ژن با QTL‌های مؤثر بر صفات چربی به اثبات رسیده است، این ارتباطات معنی‌دار برای این ژن با صفات چربی دور از انتظار نیست. همچنین پروتئینی که توسط ژن TCF7 کد می‌شود، به عنوان یک فعل کننده رونویسی عمل می‌کند و در بسیاری از مسیرهای متابولیکی بدن مثل متابولیسم چربی شرکت می‌کند.


است که وزن دنبه برای گوسفندان لری‌بختیاری به صورت غیرمستقیم و با استفاده از معادلات ارائه شده توسط وطن خواه و همکاران (۱۲) برآورد شد. این محققین گزارش کردند که برای برآورد وزن دنبه صفات محیط بالای دنبه، عرض پایین دنبه و طول شکاف دنبه به ترتیب دارای ضریب رگرسیون $R^2=0.807$ است (مدل ۳).

$W_i = -6.5 + 0.069A_i + 0.011B_i + 0.019C_i + e_i$

که W_i وزن دنبه حیوان i ام، A_i محیط بالای دنبه، B_i عرض پایین دنبه، C_i طول شکاف دنبه و e_i اثر باقیمانده می‌باشد.


نتایج و بحث

تکثیر اگرون ۲ جایگاه ژن TCF7 با موفقیت انجام شد، شکل ۱ الکتروفورز مخصوص PCR را روی ژل آگاروز $\frac{1}{2}$ % نشان می‌دهد. در این تصویر قطعه ۶۴۳ جفت بازی ژن مورد نظر مشاهده می‌شود. برای ارزیابی دقیق تر قطعات تکثیر شده از یک سایز مارکر ۵۰ bp DNA ladder, Thermo Scientific (GeneRuler 50 bp DNA ladder, Thermo Scientific) استفاده شد. قطعه ۶۴۳ جفت بازی تکثیر شده حاصل از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز مربوط به ژن TCF7 در الکتروفورز عمودی و رنگ‌آمیزی بر روی ژل اکریل آمید مورد آزمون PCR-SSCP قرار گرفت و سه الگوی ژنتیکی متفاوت مشاهده گردید، که در نژاد زل ژنتیپ BB مشاهده نشد و ژنتیپ AA و AB به ترتیب با فراوانی ۷۱ و ۲۹ درصد دیده شدند. در نژاد لری‌بختیاری ژنتیپ AA مشاهده نشد و ژنتیپ AB به ترتیب با فراوانی ۱۰ و ۹۰ درصد ظاهر گردیدند. این الگوهای ژنتیکی به نحوی بین دو نژاد پخش شدند که ژنتیپ چهار خطی (AB) که نشان‌دهنده‌ی حالت هتروزیگوت می‌باشد در هر دو نژاد دیده شد و ژنتیپ‌های دو خطی AA و BB به ترتیب فقط در نژاد زل و لری‌بختیاری دیده شدند (شکل ۲). با توجه به اینکه یک الگوی ژنتیکی مشترک بین دو نژاد مورد بررسی وجود داشت، آنالیز داده‌ها



شکل ۱- الکتروفورز قطعه ۶۴۳ جفت بازی جایگاه اگرون ۲ ژن TCF7 روی ژل آگاروز (٪۲)

Figure 1. A fragment with 643 bp from exon 2 of TCF7 gene on agarose gel (3%)



شکل ۲- الگوی باندی SSCP برای اگزون ۲ زن TCF7 در دو نژاد گوسفند زل و لری بختیاری
Figure 2. SSCP band pattern for exon 2 of TCF7 gene in Zel and Lori-Bakhtiari sheep breeds.

جدول ۲- مقایسه میانگین حداقل مربعات (\pm SE) اثر دو ژنتیپ زن TCF7 بر صفات چربی در جمیعت گوسفند نژاد زل

Table 2. Comparison of least squares mean of two genotypes of TCF7 gene on fat traits in Zel sheep breed

صفت	(۳۳) AB	(۸۰) AA
کلسیترول خون (mg/dL)	۵۴/۵ \pm ۰/۳۲	۵۲/۷۵ \pm ۳/۱۵۹
تری گلیسرید خون (mg/dL)	۱۸/۷۵ \pm ۲/۷۷۱	۱۲/۸۱ \pm ۱/۵۰۱

اختلاف معنی‌داری بین ژنتیپ‌ها وجود ندارد. اعداد داخل پرانتز نشان‌دهنده تعداد مشاهده شده از هر ژنتیپ می‌باشد.

جدول ۳- مقایسه میانگین حداقل مربعات (\pm SE) اثر دو ژنتیپ زن TCF7 بر صفات چربی در جمیعت گوسفند نژاد لری بختیاری

Table 3. Comparison of least squares mean of two genotypes of TCF7 gene on fat traits in Lori-Bakhtiari sheep breed

صفت	(۴۴) BB	(۱۶) AB
کلسیترول خون (mg/dL)	۵۹/۸۳ \pm ۰/۸۹۱ ^b	۶۸/۵۷ \pm ۲/۶۲۵ ^a
تری گلیسرید خون (mg/dL)	۳۷/۰۱ \pm ۰/۸۳۹ ^a	۳۱/۱۵ \pm ۲/۵۶۱ ^b
وزن دنبه (kg)	۴/۰۳ \pm ۰/۰۷۷ ^b	۴/۹۰۷ \pm ۰/۲۳ ^a

* و **: به ترتیب نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح پنج و یک درصد می‌باشد. اعداد داخل پرانتز نشان‌دهنده تعداد دام در هر گروه ژنتیکی می‌باشد.

منابع

- Bonifácio, C., I. Santos, C. Belo and A. Cravador. 2001. Single-Strand conformation polymorphism (SSCP) analysis of alfas1-casein, beta-casein and k-casein genes in charnequeira portuguese indigenous goat breed. Archivos de zootecnia, 50: 105-111.
- Gokdal, O., H. Ulker, F. Karakus, F. Cengiz, C. Temur and H. Handil. 2004. Growth, feedlot performance and carcass characteristics of Karakas and crossbred lambs (F1)(Ile de France x Akkaraman (G1) x Karakas) under rural farm conditions in Turkey. South African Journal of Animal Science, 34: 223-232.
- Karamichou, E., R. Richardson, G. Nute, K. Gibson and S. Bishop. 2006. Genetic analyses and quantitative trait loci detection, using a partial genome scan, for intramuscular fatty acid composition in Scottish Blackface sheep. Journal of animal science, 84: 3228-3238.
- Kingsmore, S., M. Watson and M. Seldin. 1995. Genetic mapping of the T lymphocyte-specific transcription factor 7 gene on mouse Chromosome 11. Mammalian Genome, 6: 378-382.
- Miller, S., D. Dykes and H. Polesky. 1988. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic acids research, 16: 1215-1220.
- Moradi, MH., A. Nejati-Javaremi, M. Moradi-Shahrbabak, KG. Dodds and JC. McEwan. 2012. Genomic scan of selective sweeps in thin and fat tail sheep breeds for identifying of candidate regions associated with fat deposition. BMC genetics, 13: 10-19.
- Negussie, E., O. Rottmann, F. Pirchner and J. Rege. 2003. Patterns of growth and partitioning of fat depots in tropical fat-tailed Menz and Horro sheep breeds. Meat science, 64: 491-498.
- Orita, M., H. Iwahana, H. Kanazawa, K. Hayashi and T. Sekiya. 1989. Detection of polymorphisms of human DNA by gel electrophoresis as single-strand conformation polymorphisms. Proceedings of the National Academy of Sciences, 86: 2766-2770.
- Roose, J., G. Huls, M. Van Beest, P. Moerer, K. vander Horn and R. Goldschmeding. 1999. Synergy between tumor suppressor APC and the -catenin-Tcf4 target Tcf1. Science, 285: 1923-1926.
- Untergasser, A., H. Nijveen, X. Rao, T. Bisseling, R. Geurts and J.A. Leunissen. 2007. Primer3Plus, an enhanced web interface to Primer3. Nucleic acids research, 35: 71-74.
- van de Wetering, M., M. Oosterweel, D. Dooijes and H. Clevers. 1991. Identification and cloning of TCF-1, a T lymphocyte-specific transcription factor containing a sequence-specific HMG box. The EMBO journal, 10: 123-127.
- Vatankhah, M., M. Moradi-Shahrbabak, A. Nejati-Javaremi, R. Miraei-Ashtiani and R. Vaez Torshizi. 2005. The relationships between body and fat-tail measurements with weights of live, hot carcass and hot carcass without fat-tail in lori-bakhtiari sheep. Pajouhesh and sazandeghi, 64:66-74.
- Zhu, X., N. Niu, Y. Liu, T. Du, D. Chen and X. Wang. 2006. Improvement of the sensitivity and resolution of PCR-SSCP analysis with optimized primer concentrations in PCR products. Journal of genetics, 85: 233-238.

Association of Polymorphisms of Exon 2 of Transcription Factor 7 Gene with Fat Traits of Blood and Fat Tail in Lori-Bakhtiari and Zel Sheep Breeds

Asgar Bazzaz Parikhani¹, Mostafa Sadeghi² and Hosein Moradi Shahrabak³

1 and **3**- Graduated M.Sc. Student and Assistant Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources (UTCAN), University of Tehran

2- Associate Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources (UTCAN), University of Tehran, (Corresponding author: sadeghimos@ut.ac.ir)

Received: May 20, 2014 Accepted: June 20, 2015

Abstract

Transcription factor 7 gene (TCF7) is located on genomic candidate region for fat traits on sheep chromosome no. 5 and it is excepted to affect fat traits. In the present study, blood samples were collected from 164 Lori-Bakhtiari sheep in Shouli breeding station located at Shahre-Kord city, and 113 Zel sheep in Shirang breeding station located at Gorgan city. DNA was extracted from blood samples using modified salting out method and polymerase chain reactions were performed for amplification of 643 bp fragment of exon 2 of locous TCF7 gene. Determination of genotype patterns of sheep were obtained according to result of vertical electrophoresis and AA, AB and BB genotypes were revealed. In Zel breed, AA and AB genotype patterns were observed with frequency of 71 and 29 percent respectively and in Lori-bakhtiari breed, AB and BB genotype patterns were observed with frequency of 10 and 90 percent. There was no significant effect of genotype patterns on fat traits In Zel breed but it was significant effect in Lori-Bakhtiari breed. AB genotype had the greatest impact on fat-tail weight and blood cholesterol and BB genotype had considerable effect on blood triglycerides.

Keywords: Blood cholesterol, Blood triglycerides, Fat-tail weight, PCR-SSCP, Sheep, TCF7 gene