



تأثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در چیره بر عملکرد رشد، متabolیت‌های خون و املاح استخوان درشت‌نی گوشتی

محمد امیری اندی^۱ و هاشم منصوری^۲

(m-amiriandi@iausdj.ac.ir)

- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنتج

تاریخ دریافت: ۹۵/۲/۳۰ تاریخ پذیرش: ۹۶/۲/۲۶

چکیده

هدف از این آزمایش، بررسی تأثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در چیره بر عملکرد رشد، متabolیت‌های خونی و میزان کلسیم و فسفر استخوان درشت‌نی گوشتی بود. تعداد ۲۷۰ قطعه چوجه گوشتی نر یک‌روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به ۹ تیمار و ۲ تکرار (۱۰ چوجه در تکرار) تقسیم شدند. تیمارهای آزمایش شامل (۱) شاهد (بدون افزودن)، (۲) ۰/۱ درصد باستراتاسین (کترول مثبت)، (۳) ۰/۲ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی، (۴) ۰/۳ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۵) ۰/۴ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی و (۶) ۰/۵ درصد اسید بوتیریک بهترتیپ در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی بودند. تاییج نشان داد که بیشترین افزایش وزن روزانه در دوره آغازین مربوط به پرنده‌گان تقدیم شده با ۰/۲ درصد اسید بوتیریک بود که تیمار شاهد و تیمارهای حاوی ۰/۳ و ۰/۵ درصد اسید بوتیریک داشت. استفاده از اسید بوتیریک تأثیری بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه چوجه‌های گوشتی در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی و کل دوره پرورش نداشت. سطوح اسید بوتیریک و باستراتاسین در دوره‌های مختلف تأثیر معنی‌داری بر میزان مصرف خوارک و ضریب تبدیل غذایی چوجه‌های گوشتی نداشت. اسید بوتیریک تأثیر معنی‌داری بر میزان کلسیم پلاسمای خون) و درصد کلسیم و فسفر استخوان درشت‌نی چوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی نداشت. با توجه به تاییج به دست آمده به نظر می‌رسد که استفاده از ۰/۲ درصد اسید بوتیریک به عنوان افزودنی جایگزین آنتی‌بیوتیک در چیره چوجه‌های گوشتی بویژه در دوره‌ای آغازین مفید باشد.

واژه‌های کلیدی: چوجه گوشتی، اسید بوتیریک، عملکرد، متabolیت‌های خون، کلسیم درشت‌نی

مقدمه

آلی به دو فرم آزاد و محافظت شده وجود دارند. فرم آزاد اسیدهای آلی معمولاً دارای بوی نامطبوع می‌باشد. اسید بوتیریک در فرم آزاد بوی نامطبوعی دارد بطوریکه در برخی موارد استفاده از آن در چیره سبب کاهش مصرف خوارک می‌شود (۲). چنانچه اسیدهای آلی به فرم آزاد خود تغذیه شوند قسمت عمده‌ای از آن‌ها در قسمت‌های بالای دستگاه گوارش همچون چیندان و ستدان جذب خواهد شد و مقادیر کمتر آن‌ها به قسمت‌های پایین‌تر دستگاه گوارش یعنی روده کوچک و روده کور خواهد رسید. قسمت عمده‌ی کلنجی‌های باکتریایی در روده کوچک و روده کور تشکیل می‌شود (۲۹). برای از بین بردن کلنجی‌های باکتریایی با کمک اسیدهای آلی آزاد باید مقادیر چندین برابر اسیدهای آلی محافظت شده استفاده شود، زیرا بخش عمده‌ای از آن‌ها در قسمت‌های بالای دستگاه گوارش جذب می‌شوند. از سوی دیگر، وارد کردن مقادیر زیاد اسیدهای آلی در چیره به علت کاهش خوشخوارکی سبب کاهش مصرف خوارک و در نتیجه کاهش عملکرد پرنده می‌شوند. مقادیر بالای اسید آلی آزاد در خوارک سبب کاهش سطح کلسیم استخوان می‌شود. اسیدهای آلی در فرم محافظت شده معمولاً بوی نامطبوعی ندارند و غلظت کمتری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نیاز می‌باشد (۱۳). پوشش اسیدهای آلی محافظت شده که معمولاً منو، دی و تری گلیسریدها می‌باشد در روده توسط عمل صفرا و آنزیمهای پانکراس جدا شده و اسیدهای آلی در فرم تجزیه نشده خود به داخل محیط روده آزاد می‌شوند. این فرم از اسیدهای آلی به مرور در دستگاه گوارش آزاد می‌شوند و قسمت عمده‌ای از آن‌ها به ناحیه روده که محل تجمع کلنجی‌های باکتریایی می‌باشد، منتقل می‌گردد (۱۲). علی‌رغم توضیحات اخیر تحقیق جامعی در رابطه با تأثیر اسید بوتیریک

در سال‌های اخیر استفاده از مواد افزودنی در چیره طیور به منظور افزایش کارآیی استفاده از مواد مغذی مورد توجه متخصصین تقدیم واقع شده که برخی از این مواد به عنوان دارو و برخی به عنوان محرك رشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله مواد افزودنی مورد استفاده آنتی‌بیوتیک‌های محرك رشد بودند، که در مقادیر کم برای بهبود عملکرد در چیره چوجه‌های گوشتی استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه برخی از آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در تغذیه چوجه‌های گوشتی، جهت درمان بیماری‌های انسان نیز به کار می‌روند، امکان ایجاد سویه‌های باکتری مقاوم به آنتی‌بیوتیک از طریق مصرف بقاچای آنتی‌بیوتیک موجود در محصولات طیور وجود دارد که باعث می‌شود آنتی‌بیوتیک‌های درمانی در انسان موثر واقع نشوند. بنابراین باقی ماندن آنتی‌بیوتیک در محصولات طیور استفاده از این افزودنی‌ها را در چیره چوجه‌های گوشتی مورد تردید قرار داده است (۵،۳۰). تحقیقات زیادی در جهت تایید این موضوع توسط محققین صورت گرفته است که در نهایت منجر به ممنوعیت استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در چیره دام و طیور در اکثر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا شده است. بنابراین تحقیقات متعددی در رابطه با یافتن جایگزینی برای آنتی‌بیوتیک در تغذیه چوجه‌های گوشتی در سال‌های اخیر صورت گرفته است که از جمله مواد جایگزین می‌توان به پروپویوتیک‌ها، پری‌بیوتیک‌های آلی، گیاهان دارویی و عصاره‌های آن‌ها اشاره نمود (۵،۲۱،۲۲،۲۸،۳۵).

اسیدهای آلی بویژه اسید بوتیریک از جمله افزودنی‌های خوارکی هستند که اثرات مفید آن‌ها بر عملکرد یا سلامت دستگاه گوارش طیور نشان داده شد (۱۶،۹،۳،۳۴). اسیدهای

از ماده بی‌اثر جبره‌های پایه شد. اسید بوتیریک از شرکت سنادام پارس تهیه گردید. کارخانه سازنده این محصول شرکت سیلو (SILO Additives Ind. Co. Italy) در کشور ایتالیا است. نام تجاری محصول مورد استفاده BaBy-c4® بوده و دارای انرژی قابل متابولیسم ۷ کیلوکالری در کیلوگرم بود. این محصول حاوی گلیسرول آزاد (۱٪)، منوگلیسرید اسید بوتیریک (۲۴٪)، دی‌گلیسرید اسید بوتیریک (۵٪)، تری‌گلیسرید اسید بوتیریک (۸٪) و اسید بوتیریک (۷٪). این ترکیب به دو فرم مایع و پودری تولید می‌شود که در این مطالعه نوع پودری با رنگ سفید استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل (۱) شاهد (جبره پایه فاقد افروزنی)، (۲) جبره پایه + ۰/۱ درصد آنتی‌بیوتیک باستراتسین، (۳) جبره پایه + ۰/۲ درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، (۴) جبره پایه + ۰/۰ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۵) جبره پایه + ۰/۲ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی، (۶) جبره پایه + ۰/۳ درصد اسید بوتیریک فقط در دوره آغازین، (۷) جبره پایه + ۰/۳ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۸) جبره پایه + ۰/۳ درصد اسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی و (۹) جبره پایه + ۰/۰ درصد اسید بوتیریک به ترتیب در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی بودند.

محافظت شده در غلظت‌های متفاوت و در دوره‌های پرورشی مختلف بر عملکرد جوجه‌های گوشتی صورت نگرفته است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جبره‌های گوشتی در دوره‌های پرورشی مختلف بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خون و کلسیم و فسفر استخوان درشت‌تنی بود.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در یک سالن مرغداری واقع در استان کرمانشاه، شهرستان روانسر (بخش نهرابی) اجرا شد. به‌منظور انجام آزمایش از ۲۷۰ قطعه جوجهی گوشتی نر سویه راس ۳۰۸ که از مزرعه‌ی پرورش مرغ مادر ماهیدشت کرمانشاه تهیه شده بودند، استفاده شد. جوجه‌ها به‌طور تصادفی در ۲۷ واحد آزمایشی قفس (۱×۱ متر) در بستر توزیع شدند. جبره‌ها بر پایه‌ی ذرت و کنجاله‌ی سویا با نرم‌افزار WUFFDA و مطابق با توصیه سویه راس ۳۰۸ تنظیم شدند. سه جبره برای سه مرحله‌ی پرورشی آغازین (۰-۱۴ روزگی)، رشد (۱۵-۲۸ روزگی) و پایانی (۲۹-۴۲ روزگی) بر اساس کاتالوگ راس تنظیم شد (جدول ۱). لازم بهذکر است که در هر یک از جبره‌های دوره آغازین، رشد و پایانی ۱ درصد ماده بی‌اثر (شن) در نظر گرفته شده که متناسب با غلظت‌های اسید بوتیریک و آنتی‌بیوتیک باستراتسین تیمارهای آزمایشی جایگزین بخشی

جدول ۱- ترکیب جبره‌های غذایی در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی

Table 1. Composition of diets in starter, grower and finisher periods

جزای جبره (%)	آغازین (۰-۱۴ روزگی)	رشد (۱۵-۲۸ روزگی)	پایانی (۲۹-۴۲ روزگی)
ذرت	۶۲/۰	۷۰/۸۳	۷۰/۷
کنجاله سویا	۳۳/۸	۲۴/۸	۱۹/۶
صف	۱	۰/۸	۱/۷
دی‌کلسیم فسفات	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۱
پیش مخلوط ویتامینه	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵
پیش مخلوط معدنی	۰/۲	۰/۲	۰/۲۵
نمک طعام	۰/۳	۰/۸۷	۰/۰۸
دی-آل متیونین	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۸
لایزین هیدروکلرید	۱	۱	۱
ماده بی‌اثر (مانس)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
مقادیر محاسبه شده			
انرژی متابولیسمی (کیلوگرم/کیلوکالری)	۲۹۰۰	۲۹۵۰	۳۰۰۰
پروتئین خام	۲۲	۱۹	۱۸
اسید لیتوالیک	۱/۲۸	۱/۲۰	۱/۲۱
کلسیم	۱/۵	۰/۹	۰/۸۵
فسفر قابل دسترس	۰/۴۰	۰/۴۲	۰/۳۹
سدیم	۰/۲۱	۰/۲۰	۰/۱۹
لایزین	۱/۹۳	۱/۲۴	۱/۲۹
متیونین	۰/۰۵	۰/۰۴۵	۰/۰۴۱
متیونین+سیستین	۱/۰۷	۰/۰۹۵	۰/۰۸۶
ترنوفین	۰/۰۸۴	۰/۰۸۳	۰/۰۸۲

(۱) هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: ۳۵۰۰۰۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین A، ۱۰۰۰۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D₃، ۱۰۰۰۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین E، ۱۰۰۰۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین K₃، ۹۰۰۰ میلی‌گرم ویتامین B₁، ۳۳۰۰ میلی‌گرم ویتامین B₂، ۵۰۰۰ میلی‌گرم ویتامین B₃، ۱۵۰۰۰ میلی‌گرم ویتامین B₅، ۵۰۰ میلی‌گرم ویتامین B₆، ۵۰۰ میلی‌گرم ویتامین B₇، ۱۵۰ میلی‌گرم ویتامین B₉، ۱۵۰ میلی‌گرم ویتامین B_{۱۰}، ۱۵۰ میلی‌گرم ویتامین B_{۱۲}، ۲۵۰۰۰ میلی‌گرم منگنز، ۵۰۰۰۰ میلی‌گرم آهن، ۵۰۰۰۰۰ میلی‌گرم روی، ۱۰۰ میلی‌گرم سلنیوم.

(۲) مکمل معدنی شامل: ۵۰۰۰۰ میلی‌گرم منگنز، ۲۵۰۰۰ میلی‌گرم آهن، ۵۰۰۰۰ میلی‌گرم روی، ۱۰۰ میلی‌گرم سلنیوم

افزایش وزن روزانه در دوره آغازین مربوط به پرندگان تغذیه شد با $0/2$ درصد اسید بوتیریک بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد و تیمارهای حاوی $0/3$ و $0/5$ درصد اسید بوتیریک داشتند ولی با تیمار آنتی‌بیوتیک باسترسین تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. استفاده از اسید بوتیریک تاثیری بر مصرف غذا، افزایش وزن روزانه، وزن بدن و ضریب تبدیل غذا به افزایش وزن در دوره‌های رشد، پایانی و کل دوره نداشت ($P > 0/05$). نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج لیسون و همکاران (۲۵)، هرناندز و همکاران (۱۸)، گونل و همکاران (۱۴)، هو و گو (۲۰)، مهدوی و ترکی (۲۶)، آقازاده و طاهایزدی (۱) در ارتباط با عدم تاثیر اسیدهای آلی بر وزن پایانی و افزایش وزن روزانه کل دوره پرورش جوجه‌های گوشته بود. تاثیر مثبت اسید بوتیریک در دوره آغازین احتمالاً ناشی از این مورد است که رشد روده، سلول‌های اپیتلیوم، عمق کرپیت و پرزها در طی 21 روز اول به سرعت در حال افزایش می‌باشد. اسید بوتیریک به عنوان منبع انرژی برای سلول‌های روده عمل می‌کند و در 21 روز اول پس از تفريح تغذیه اسید بوتیریک می‌تواند به افزایش طول روده، افزایش تعداد پرزهای روده و در نتیجه افزایش سطح جنبی کمک کرده و در نهایت سبب بهبود عملکرد گردد (۲۷). دلیل دیگر اثر بیشتر اسید بوتیریک در دوره آغازین، تولید مقادیر کم اسیدهای چرب کوتاه زنجیره در جوجه‌های جوان می‌باشد. بنابراین بهترین دوره جهت دریافت اسیدهای آلی از طریق خوارک دوره‌ی آغازین می‌باشد (۲۵). با افزایش سن، تولید اسیدهای چرب فرار در دستگاه گوارش بالا می‌رود و بدنبال آن نیز احتمالاً مقداری از اسیدهای چرب فرار که جذب می‌شود نیز افزایش می‌یابد و سبب عدم بروز اثرات مثبت ناشی از اسیدهای آلی اضافه شده به خوارک در بهبود عملکرد جوجه‌های گوشته می‌شود (۳۰، ۳۴). از این رو احتمالاً بنابراین دلایل گفته شده بهبود عملکرد محدود به دوره آغازین بوده و در دوره‌های دیگر مشاهده نمی‌شود. بسیاری از محققین عدم تاثیر محرك‌های رشد و بالاخص اسیدهای آلی بر عملکرد جوجه‌های گوشته را ناشی از پرورش پرندگان در شرایط بهداشتی می‌دانند (۱۳). نگهداری جوجه‌ها در محیط بهداشتی با تراکم پایین و تقدیم مناسب سبب می‌شود که محرك‌های رشد بر پارامترهای عملکردی تاثیری نداشته باشند (۱۳). عمدتاً اسیدهای آلی بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشته در شرایط عادی تاثیر نمی‌گذارند و باید پرنده تحت تنش‌هایی همچون بیماری، تغییرات دمایی، میکرووارگانیسم‌های بیماریزا و غیره قرار گیرد (۲۳). حسینی و همکاران (۱۹)، در تحقیقی که به منظور بررسی اثر شکل‌های مختلف اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه‌های گوشته انجام دادند، گزارش کردند که پرندگان تغذیه شده با $0/3$ درصد اسید بوتیریک به فرم روغنی مصرف خوارک کمتری نسبت به شکل پودری اسید بوتیریک و تیمار شاهد داشتند. در آزمایش شیفول اسلام (۳۵) استفاده از سطوح 4800 میلی‌گرم در کیلوگرم اسید هیومیک سبب کاهش مصرف خوارک شد و چهار غلظت دیگر که کمتر از این مقدار بود (3000 ، 2000 و 1200 میلی‌گرم در کیلوگرم خوارک) تاثیری بر میزان خوارک مصرفی نداشتند. عدم

صفات مورد مطالعه

در این آزمایش صفات عملکردی (افزایش وزن روزانه، خوارک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی در دوره‌های آغازین $(14-0/28)$ رشد، $(5-28)$ پایانی $(29-42)$ روزگی) و کل دوره پرورش ($0-42$ روزگی)، وزن زنده، متabolیت‌های خونی (میزان کلسیم و فسفر پلاسمما، گلوكز، پروتئین تام، تری‌گلیسرید، HDL، VLDL و LDL سرم) و همچنین میزان کلسیم و فسفر استخوان درشت‌نی در پایان آزمایش اندازه‌گیری شد. مصرف غذا و افزایش وزن بصورت هفتگی و بهروش روز جوجه اندازه‌گیری شدند. از تقسیم مصرف غذا به افزایش وزن ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. در پایان دوره پرورش از هر واحد آزمایشی 2 قطعه پرنده انتخاب شده و از آن‌ها جهت اندازه‌گیری کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL، VLDL، LDL، گلوكز، پروتئین تام سرم از طریق ورید بال خونگیری به عمل آمد. برای اندازه‌گیری کلسیم و فسفر پلاسمما نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایشی حاوی هپارین ریخته شدند. برای جدا شدن سرم از لخته، نمونه‌های خون مدتی در دمای اتاق نگهداری شدند. سپس سرم جدا شده داخل میکروتیوب ریخته شد. نمونه‌های سرم و خون هپارینه توسط سانتریفیوژ در دور 3500 و به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شدند. نمونه‌های سرم و پلاسمما بالاصله بعد از جداسازی و انتقال به میکروتیوب در فریزر تحت دمای -34 درجه سانتی‌گراد تا زمان ارزیابی پارامترهای مربوطه نگهداری شدند. غلظت متabolیت‌های خون با استفاده از دستگاه اتوانالایز Theenicon-۱۰۰۰ بهروش رنگ سنجی و با استفاده از کیت‌های پارس آزمون آنچه گرفت (۱۹). گلوكز و تری‌گلیسرید بهروش انزیماتیک TAP-JOT، کلسترول به روشن آنزیماتیک TAP-CHOT (۶)، کلسیم بهروش ارتوکروزول ستالین، فسفر به روشن UV، پروتئین به روشن برم کروزول گرین تعیین شد (۲۶).

در 42 روزگی استخوان درشت‌نی پای چپ 2 پرنده از هر تکرار پس از کشتار جدا و درون نایلون‌های شماره‌گذاری شده، در دمای -20 درجه‌ی سلسلیوس نگهداری و به آزمایشگاه انتقال یافت. برای اندازه‌گیری فسفر از دستگاه اسپکتروفوتومتر و برای اندازه‌گیری میزان کلسیم از دستگاه Shimadzue Model Shimadzue جذب اتمی (Model Shimadzue) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرمافزار آماری SAS (۲۰۰۶) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. به‌منظور مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن در سطح احتمال $0/05$ استفاده شد.

نتایج و بحث عملکرد رشد

تاثیر اسید بوتیریک و آنتی‌بیوتیک باسی‌تراسین بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه، مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا به افزایش وزن جوجه‌های گوشته گروههای آزمایشی مختلف در جدول‌های 2 و 3 آورده شده است. استفاده از غلظت در $0/2$ درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین سبب بهبود وزن بدن و افزایش وزن روزانه ($0/05$) (P) نسبت به تیمار شاهد، $0/3$ درصد و تیمار 9 گردید. به‌طوری که بیشتر وزن بدن و

سطح mRNA و فعالیت آنزیم ای تی پی سیترات لیاز (ATP-CL) باشد (۱۰). اسید استیک سبب کاهش فعالیت آنزیم HMG-CoA سینتاز شده و از این طریق در کاهش میزان HMG-CoA در دسترس کبد و در نتیجه کاهش ساخت کلسترول موثر است. سطح و میزان فعالیت ATP-CL توسط پروتئین-۱ SREBP تنظیم می‌گردد به گونه‌ای که در اثر تغذیه اسید استیک سطح mRNA مربوط به این پروتئین کاهش یافته است (۱۰). مغایرت نتایج این تحقیق با دیگر گزارشات در مورد عدم تغییر معنی‌دار کلسترول سرم در اثر تغذیه اسید بوتیریک احتمالاً ناشی از چند عامل باشد: (۱) اسید بوتیریک مانند اسید استیک در کاهش کلسترول سرم نقش چندانی ندارد. (۲) غلظت کافی اسید بوتیریک برای کاهش کلسترول سرم به محل ساخت کلسترول یعنی کبد نرسیده است. (۳) تغذیه چندین اسید آلی با هم اثرات همکوشی در کاهش کلسترول سرم دارند که احتمالاً هنگام تغذیه جدایانه آن‌ها به خوبی مشاهده نشود. (۴) تفاوت‌های گونه‌ای، زیرا گزارشات در دسترس بر تاثیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیره بر میزان کلسترول سرم موش‌ها نه جوچه‌ها تأکید دارد (۱۰، ۱۷).

سازگاری نتایج تحقیق حاضر با گزارش شیفول اسلام (۳۵) و حسینی و همکاران (۱۹) می‌تواند ناشی از نوع، شکل و غلظت اسید استفاده شده باشد.

متabolیت‌های خون و کلسم و فسفر استخوان
 نتایج تاثیر اسید بوتیریک و آنتی‌بیوتیک باستیراسین بر متابولیت‌های سرم خون و کلسم و فسفر استخوان درشت‌نی ۵ و ۶ آمده است. در این آزمایش استفاده از اسید بوتیریک تاثیر معنی‌داری بر لیپیدهای سرم خون جوچه‌های گوشته در ۴۲ روزگی نداشت ($p > 0.05$). نتایج این تحقیق همسو با نتایج آزمایش‌های انجام گرفته توسط کمال و راگا (۲۴)، پیش‌چنگ (۳۱)، فوشیمی و همکاران (۱۰) و هارا و همکاران (۱۷) و مغایر با نتایج بئولیو و مکبرنی (۴) بود. کمال و راگا (۲۴)، گزارش کردند جوچه‌های گوشته تغذیه شده با سطوح ۳ گرم در کیلوگرم اسید لاکتیک، اسید بوتیریک و اسید فوماریک نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی‌داری در کلسترول، چربی تام و LDL سرم خون در ۴۲ روزگه، داشتند. نشان داده شده که تغذیه اسید استیک میزان هیدروکسی متیل‌گلوتاریل کوآنزیم آ (HMG-CoA سوبستراتی اصلی تولید کلسترول) را کاهش می‌دهد که شاید به دلیل کاهش

جدول ۲- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه در دوره‌های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورش و وزن زنده جوجه‌های گوشتی در ۱۴، ۲۸ و ۴۲ روزگی
Table 2. Effects of experimental treatments on daily weight gain during starter, grower, finisher and whole rearing periods and live weight of broilers at days of 14, 28 and 42 d

تیمار*	منابع تغییرات							
	۱-۴۲ روزگی	۱۵-۲۸ روزگی	۱-۲۸ روزگی	۳۴-۶۶ روزگی ^{cd}	۱-۴۲ روزگی	۲۹-۴۲ روزگی	۱۵-۲۸ روزگی	۱-۱۴ روزگی
۲۰۶۵/۱۷	۱۱۷/۰۲	۳۴/۶۶ ^{cd}	۱۱۷/۰۲	۴۹/۱۷	۵۵/۶۰	۶۰/۱۶	۲۲/۸۱ ^{bc}	۱
۲۱۰۵/۸۸	۱۲۰۳/۸۷	۳۵۴/۹۰ ^{ab}	۵۰/۱۳	۵۳/۴۹	۶۲/۹۰	۲۴/۴۳ ^{abc}	۲	
۲۱۴۰/۰۰	۱۲۱۱/۸۷	۳۵۷/۹۵ ^{ab}	۵۰/۹۳	۵۳/۰۲	۶۳/۱۶	۲۴/۷۰ ^{ad}	۳	
۲۰۸۸/۱۱	۱۲۴۵/۹۱	۳۴۸/۸۰ ^{bc}	۴۹/۱۷	۵۷/۱۳	۶۲/۶۶	۲۴۳/۰ ^{abc}	۴	
۲۰۹۶/۰۶	۱۲۸۳/۰۰	۳۶۰/۰۰ ^a	۴۹/۹۳	۵۱/۹۷	۶۳/۱۶	۲۵/۷۰ ^a	۵	
۲۰۴۰/۸۸	۱۲۰۹/۷۹	۳۰۸/۷۷ ^c	۴۸/۶۶	۵۵/۰۲	۶۳/۲۳	۲۲/۱۳ ^{de}	۶	
۲۰۳۸/۹۰	۱۱۵۵/۸۱	۳۰۹/۴۰ ^e	۴۸/۵۳	۶۳/۶۰	۶۱/۰۰	۲۱/۱۰ ^e	۷	
۲۰۸۴/۸۴	۱۲۲۷/۰۵	۳۳۷/۵۰ ^d	۴۹/۶۶	۵۹/۴۳	۶۲/۷۸	۲۲/۶۶ ^{de}	۸	
۲۰۶۸/۸۰	۱۱۹۶/۸۱	۳۰۹/۳۴ ^e	۴۹/۳۳	۶۱/۸۶	۶۰/۹۰	۲۱/۱۰ ^e	۹	
۲۱/۱۶	۱۶/۴۸	۴/۳۰	۶/۸۴	۴/۲۴	۵/۶۹	۰/۶۹		**SEM
۰/۹۶۴	۰/۶۱۵	۰/۰۰۱	۵۰/۱۳	۰/۱۳۱	۰/۹۹۸	۰/۰۰۱		P-value

(۱) شاهد (بدون افزودنی)، (۲) ۰/۰ درصد آنتی‌بیوتیک باستراتسین، (۳) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره آغازین، (۴) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۵) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی، (۶) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره آغازین، (۷) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد و پایانی، (۸) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک به ترتیب در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی.
* میانگین‌های با حروف متفاوت اختلاف معنی دار دارند ($p < 0.05$). ** SEM: خطای استاندارد میانگین.

جدول ۳- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر خوارک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره‌های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورش
Table 3. Effects of experimental treatments on daily feed intake and feed conversion ratio during starter, grower, finisher and whole rearing periods.

تیمار*	منابع تغییرات							
	۱-۴۲ روزگی	۱۵-۲۸ روزگی	۱-۲۸ روزگی	۳۴-۶۶ روزگی ^{cd}	۱-۴۲ روزگی	۲۹-۴۲ روزگی	۱۵-۲۸ روزگی	۱-۱۴ روزگی
۲/۱۴	۲/۹۰	۱/۸۱	۱/۶۸	۱۰/۱۶۰	۱۶۰/۸۶	۱۱۲/۹۶	۳۰/۱۰	۱
۲/۰۲	۲/۹۷	۱/۷۵	۱/۵۶	۹۹/۵۳	۱۵۹/۰۴	۱۱۰/۰۴	۲۸/۲۳	۲
۲/۰۳	۲/۹۹	۱/۷۱	۱/۵۶	۹۹/۷۸	۱۵۸/۴۳	۱۱۰/۱۳	۲۸/۴۸	۳
۱/۹۹	۲/۷۶	۱/۷۵	۱/۶۰	۹۸/۶۶	۱۵۶/۸۳	۱۱۰/۱۶	۲۸/۹۶	۴
۲/۰۰	۳/۱۲	۱/۸۱	۱/۵۵	۱۰۲/۲۰	۱۶۲/۰۰	۱۱۳/۳۳	۳۹/۹۸	۵
۲/۱۰	۲/۸۸	۱/۸۲	۱/۷۰	۹۹/۹۰	۱۵۷/۵۴	۱۱۳/۵۰	۳۷/۶۶	۶
۲/۰۱	۲/۴۶	۱/۷۹	۱/۸۰	۹۷/۵۶	۱۵۵/۴۶	۱۰۸/۸۳	۲۸/۱۶	۷
۲/۰۷	۲/۶۹	۱/۸۲	۱/۶۴	۹۷/۶۶	۱۵۹/۶۰	۱۰۹/۷۵	۳۷/۶۶	۸
۱/۹۸	۲/۵۰	۱/۸۴	۱/۷۴	۹۷/۴۶	۱۵۴/۳۳	۱۰۸/۸۳	۳۷/۱۸	۹
۰/۳۱۲	۰/۲۰۵	۰/۲۱۹	۰/۱۰۲	۸/۴۳	۹/۱۰	۹/۳۳	۲/۲۱	**SEM
۰/۹۷۰	۱/۰۰	۰/۹۶۱	۰/۲۱۶	۰/۹۵۷	۰/۵۲۵	۰/۹۶۷	۰/۱۹۳	P-value

(۱) شاهد (بدون افزودنی)، (۲) ۰/۰ درصد آنتی‌بیوتیک باستراتسین، (۳) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره آغازین، رشد و پایانی، (۴) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی، (۵) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره آغازین، رشد و پایانی، (۶) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۷) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد و پایانی، (۸) ۰/۰ درصد آسید بوتیریک به ترتیب در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی.
* SEM**: خطای استاندارد میانگین.

جدول ۴- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر لیپیدهای سرم خون جوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی

Table 4. Effects of experimental treatments on serum lipids of broilers at 42 d

تیمار*	منابع تغییرات
نام	متغیر
۱	۱۲۵/۱۶
۲	۱۲۰/۳۳
۳	۱۲۷/۳۳
۴	۱۳۰/۳۳
۵	۱۲۰/۳۰
۶	۱۱۴/۸۳
۷	۱۱۸/۶۶
۸	۱۱۴/۳۳
۹	۱۱۱/۳۳
SEM**	۷/۹۸
P-value	۰/۲۹۴
۰/۳۱۵	۰/۲۸۲
۰/۳۱۴	۰/۲۷۶
۰/۲۷۵	۱/۷۲
۰/۱۰۵۰	۲۴/۰/۳
۰/۱۱۸۵	۲۴/۶۸
۰/۱۱۴/۹۶	۲۵/۶۲
۰/۱۱۱/۳۴	۲۴/۷۹
۰/۱۱۶/۳۱	۲۵/۹۷
۰/۱۲۱/۳۶	۲۸/۱۴
۰/۱۲۳/۴۶	۲۷/۴۹
۰/۱۲۰/۴۵	۲۶/۸۴
۰/۱۲۶/۰/۴	۲۷/۰/۲

(۱) شاهد (بدون افزودنی)، (۲) /۰ درصد آنتی‌بوتیریک باستراترین، (۳) /۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۴)

(۵) /۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی (۶) /۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۷)

(۸) /۰ درصد آسید بوتیریک به ترتیب در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی.

*: خطای استاندارد میانگین SEM**

کمال و راگا (۲۴)، بولینگ و همکاران (۷)، برزن و همکاران (۸)، رافسر و همکاران (۳۲) که بهبود میزان کلسیم و فسفر پلاسمای در اثر تغذیه با اسیدهای آلی را بیان نمودند، مطابقت دارد و لیکن با تاثیج هرناندز و همکاران (۱۸) مبنی بر عدم تاثیر اسیدهای آلی بر میزان کلسیم و فسفر پلاسمای مغایرت دارد. کمال و راگا (۲۴) و بولینگ و همکاران (۷) گزارش کردند که پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی اسیدهای آلی میزان کلسیم، فسفر و منیزیم خون بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند. مهدوی و ترکی (۲۶) گزارش کردند که افزودن اسید بوتیریک به جیره باعث افزایش کلسیم و فسفر خون در ۴۲ روزگی جوجه‌های گوشتی شد (۲۶).

در این آزمایش استفاده از اسید بوتیریک تاثیر معنی‌داری بر میزان کلسیم پلاسمای خون جوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی داشت (۰/۰۵) (۴)، به طوری که پرندگان تغذیه شده با ۰/۳ درصد و بالاتر اسید بوتیریک در جیره‌های آغازین، رشد و پایانی افزایش معنی‌داری در غلظت کلسیم پلاسمای نشان دادند. نشان داده شده است که با اسیدی شدن محیط روده جذب کلسیم افزایش می‌یابد (۸/۳۲). همچنین با مقایسه عددی تیمارهای آزمایشی، یک افزایش غیر معنی‌دار در میزان فسفر پلاسمای و کلسیم و فسفر استخوان درشت‌تنی جوجه‌ها مشاهده شد. در این تحقیق اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان گلوکز و پروتئین تام سرم خون جوجه‌های گوشتی معنی‌دار نبود. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات انجام گرفته توسط

جدول ۵- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر متابولیت‌های خونی و کلسیم و فسفر استخوان درشت‌تنی جوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی

Table 5. Effects of experimental treatments on blood metabolites and Ca and P of tibia bone of broilers at 42 d

تیمار*	منابع تغییرات
نام	متabolیت‌های خونی
۱	۱۶۴/۹۰
۲	۱۶۸/۸۴
۳	۱۶۳/۹۲
۴	۱۶۹/۰۷
۵	۱۷۱/۰۱
۶	۱۶۹/۴۵
۷	۱۶۹/۰۱
۸	۱۷۱/۸۳
۹	۱۷۵/۱۵
SEM***	۰/۵۲۲
P-value	۰/۲۰۴
۰/۷۰۳	۰/۱۱۱
۰/۷۰۰	۰/۳۶۸
۰/۸۷۰	۰/۷۴۱
۰/۷۸۶	۰/۷۶
۰/۸۱۶	۱۷/۳۳
۰/۷۷۶	۱۷/۶۳
۰/۸۰۰	۱۷/۷۶
۰/۸۳۳	۱۷/۸۶
۰/۸۶۰	۱۴/۵۶
۰/۸۴۷	۱۵/۴۶
۰/۸۶۳	۱۴/۷۳
۰/۹۰۷	۱۴/۵۳
۰/۰۷۰	۰/۸۹۴
۰/۷۰۳	۰/۱۱۱

(۱) شاهد (بدون افزودنی)، (۲) /۰ درصد آنتی‌بوتیریک باستراترین، (۳) /۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین و رشد، (۴)

(۵) /۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی (۶) /۰ درصد آسید بوتیریک در دوره‌آغازین، (۷)

(۸) /۰ درصد آسید بوتیریک به ترتیب در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی.

*: تفاوت میانگین‌ها با حروف متقابل معنی‌دار است ($p < 0/05$). SEM***: خطای استاندارد میانگین

اسید لاکتیک) به بررسی اثر اسید آلی بر عملکرد و برخی از پارامترهای خون در مرغ تخم‌گذار پرداخت. وی گزارش کرد که پرندگان تغذیه شده با اسید آلی کلسیم خون بالاتری داشتند به طوری که بیشترین کلسیم خون مربوط به پرندگان

در تحقیقی سلطان (۳۶) با استفاده از سطوح صفر (کنترل)، ۷۸۰ میلی‌گرم در کیلوگرم، ۵۷۰ میلی‌گرم در کیلوگرم و ۲۶۰ میلی‌گرم در کیلوگرم از مخلوط اسیدهای آلی (به ترتیب اسید فرمیک، اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک و

سرم نداشت. استفاده از اسیدهای آلی در مطالعه هرناندز و همکاران (۱۸) تاثیری بر غلظت گلوکز سرم و پروتئین تام سرم جوجه‌های گوشتی نداشت، ولیکن برگن و همکاران (۶)، فوشیمی و همکاران (۱۱) به ترتیب کاهش و افزایش گلوکز سرم را در اثر تغذیه اسیدهای آلی به موش صحرایی گزارش نمودند. استفاده از سطوح ۵ و ۱۰ گرم بر کیلوگرم اسید فرمیک توسط هرناندز و همکاران (۱۸) در جیره جوجه‌های گوشتی تاثیری بر غلظت گلوکز و پروتئین تام سرم نداشت. تغذیه جیره حاوی ۵۰ گرم در کیلوگرم نشاسته، سدیم پرپوپیونات (یک گرم در روز برای هر حیوان) توسط برگن و همکاران (۶) به موش‌های صحرایی سبب کاهش سطح گلوکز پلاسمایی و کاهش دفع گلوکز از ادرار در مقایسه با گروه شاهد گردید، ولی تاثیری بر میزان هورمون انسولین پلاسمایی نداشت. فوشیمی و همکاران (۱۱) که به موش‌های صحرایی جیره‌های حاوی ۰/۱ و ۰/۲۰ درصد اسید استیک را تغذیه کردند، افزایش میزان گلوکز، سیترات و انسولین خون را گزارش نمودند، ولی تاثیری بر میزان گلوکagon خون و جذب گلوکز از روده در موش‌های صحرایی گزارش نکردند. مغایرتی که در نتایج این آزمایش با پژوهش‌های دیگر وجود دارد احتمالاً ناشی از گونه حیوان و نوع اسید آلی مورد استفاده است. اسیدهای آلی اثرات خود را به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌کنند و ممکن است برخی از اسیدهای آلی سبب تغییر گلوکز خون شوند، در حالیکه برخی دیگر فاقد این ویژگی باشند (۱۱، ۱۸).

نتایج نشان که استفاده از غلظت ۰/۲ درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین سبب بهبود وزن بدن و افزایش وزن روزانه نسبت به تیمار شاهد، ۳۰ درصد و تیمار ۹ شد. استفاده از اسید بوتیریک تاثیری بر مصرف غذا، افزایش وزن روزانه، وزن بدن و ضریب تبدیل غذا به افزایش وزن در دوره‌های رشد، پایانی و کل دوره نداشت. استفاده از اسید بوتیریک تاثیری بر گلوکز، پروتئین و لیپیدهای سرم خون جوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی نداشت. استفاده از اسید بوتیریک تاثیر معنی‌داری بر میزان کلسیم پلاسمایی خون جوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی داشت ولی بر فسفر خون و کلسیم و فسفر استخوان تاثیری نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد که استفاده از ۰/۲ درصد اسید بوتیریک به عنوان افزودنی جایگزین آنتی‌بیوتیک در جیره جوجه‌های گوشتی بویژه در دوره‌ی آغازین بر عملکرد رشد مفید باشد.

تغذیه شده با سطوح ۵۲۰ پی پی ام بود. در تحقیقی با استفاده از سطوح ۰/۲۵، ۰/۵ و ۰/۷۵ درصد از مخلوط اسیدهای آلی (اسید فرمیک و پروپیونیک با نسبت ۷۰ به ۳۰) بهبود میزان کلسیم و عدم تاثیر بر فسفر خون در جوجه‌های گوشتی مشاهده شد (۱۵). رافسر و همکاران (۳۳) با افروزنده سطوح مختلف اسید سیتریک به جیره‌های حاوی فسفر قابل دسترس کمتر از حد مورد نیاز جوجه‌های گوشتی، بهبود عملکرد و جذب فسفر را ملاحظه نمودند که می‌تواند ناشی از اثر اسید سیتریک بر استفاده بهینه از فسفر فیتاته باشد. هرناندز و همکاران (۱۸) از سطوح ۵ و ۱۰ گرم در کیلوگرم مکمل اسید فرمیک در جیره جوجه‌های گوشتی استفاده نمودند و در ۴۲ روزگی تغییری در میزان کلسیم و فسفر پلاسمایی مشاهده ننمودند. اسیدهای آلی به چند طریق احتمالاً در بهبود هضم و جذب مواد معدنی موثر می‌باشند. اول، ساز و کار کاهش pH دستگاه گوارش می‌باشد. کاهش pH دستگاه گوارش مانع از تشکیل کمپلکس نامحلول اسید فایتیک با مواد معدنی می‌شود و در نتیجه فیتات به عمل فیتاز آندوزن حساس‌تر باقی می‌ماند و از مداخله آن با جذب عناصر معدنی جلوگیری می‌شود (۳۲). دومین ساز و کار موثر در بهبود جذب عناصر معدنی این است که اسیدهای آلی، خود به عنوان کلات کننده عناصر معدنی همچون کلسیم و فسفر عمل کرده و جذب آن‌ها را از دستگاه گوارش بهبود می‌بخشد (۸، ۳۲). ساز و کار موثر سوم عبارتست از افزایش طول روده که در نتیجه آن احتمالاً تعداد جایگاه‌های جذب مواد معدنی بالا رفته و جذب کلسیم و فسفر نیز بهبود می‌یابد. دلیل عدم مطابقت نتایج بدست آمده با سایر گزارشات احتمالاً مربوط به نوع اسیدهای آلی، مقدار اسید آلی مورد استفاده و غلظت کلسیم و فسفر جیره می‌باشد. هر چقدر غلظت کلسیم و فسفر جیره بالاتر باشد احتمالاً جذب آن‌ها نیز تا حدی بالا می‌رود که باعث خنثی شدن اثر اسیدهای آلی در بهبود میزان جذب عناصر معدنی می‌گردد. از طرفی دیگر افزایش مواد معدنی قدرت بافری جیره را افزایش می‌دهد که می‌تواند منجر به کاهش عملکرد اسیدهای آلی گردد. مقدار اسیدهای آلی مورد استفاده بر مقدار اسیدهای آلی موجود در محیط روده تاثیر می‌گذارد. اسیدهای آلی به عنوان کلات کننده عناصر معدنی می‌باشند و افزایش آن‌ها در محیط روده سبب بهبود جذب عناصر معدنی و افزایش غلظت آن‌ها در خون می‌شود. همانگونه که در فوق اشاره شد افروزنده اسید بوتیریک به جیره جوجه‌های گوشتی در دوره‌ای پرورشی مختلف، تاثیری بر غلظت گلوکز و پروتئین

منابع

1. Aghazadeh, A.M. and M. Tahayazdi. 2012. Effect of butyric acid supplementation and whole wheat inclusion on the performance and carcass traits of broilers, South African Journal of Animal Science, 42: 241-248.
2. Antongiovanni, M., A. Buccioni, F.Petacchi, S. Leeson, S. Minieri, A. Martini and R. Cecchi. 2007a. Butyric acid glycerides in the diet of broiler chickens: effects on gut histology and carcass composition. Italian Journal of Animal Science, 6: 19-25.
3. Antongiovanni, M., A. Buccioni, S. Minieri, F. Petacchi, A. Campagnoli, E. Fusi, R. Rebucci, G. Tosi and P. Massi. 2007b. Effect of dietary butyric glycerides on immune response and *Salmonella enteritidis* in broiler chicks. 16th European Symposium on Poultry Nutrition, August 26-30, 2007 Strasbourg-France.
4. Beaulieu, K.E. and M.I. Mcburney. 1999. Changes in pig serum lipids, nutrient digestibility and sterol excretion during cecal infusion of propionate. Jóurnal of Nutrition 122: 241-245.
5. Bedford, M. 2000. Removal of antibiotic growth promoters from poultry diets: implications and strategies to minimize subsequent problems. World's Poultry Science, 56: 185-189.
6. Berggren, A.M., E.M.G.L. Nyman, I. Lundquistb and I.M.E. Bjorck. 1996. Influence of orally and rectally administered propionate on cholesterol and glucose metabolism in obese rats. British Journal of Nutrition, 76: 287-294.
7. Boling, S.D., J.L. Snow, C.M. Parsons and D.H. Baker. 2001. The effect of citric acid on the calcium and phosphorus requirements of chicks fed corn-soybean meal diets. Poultry Science, 80: 783-788.
8. Brenes, Á., A. Viveros, I. Arija, C. Centeno, M. Pizarro and C. Bravo. 2003. The effect of citric acid and microbial phytase on mineral utilization in broiler chicks. Animal Feed Science and Technology, 110: 201-219.
9. Edmonds, M.S., S. Lohalt and S. Moreland. 2014. Effect of supplemental humic acid and butyric acid on performance and mortality in broilers raised under various environmental conditions. Journal of Applied Poultry Research, 23: 1-8.
10. Fushimi, T., K. Suruga, Y. Oshima, M. Fukiharu, Y. Tsukamoto and T. Goda. 2006. Dietary acetic acid reduces serum cholesterol and triacylglycerols in rats fed a cholesterol-rich diet. British Journal of Nutrition, 95: 916-924.
11. Fushimi, T., K. Tayama, M. Fukaya, K. Kitakoshi, N. Nakai, Y. Tsukamoto and Y. Sato. 2001. Acetic acid feeding enhances glycogen repletion in liver and skeletal muscle of rats. Journal of Nutrition, 131:1973-1977.
12. Gauthier, R. 2002. Intestinal health, the key to productivity (The case of organic acids). PrecongresoCientíficoAvicola IASA. XXVII Convencion ANECA-WPDC. Puerto Vallarta, Jal. Mexico. 30 de Abril 2002.
13. Gheisari, A. A., M. Heidari, R. K. Kermanshahi, M. Togani and S. Saraeian. 2007. Effect of dietary supplementation of protected organic acids on ilealmicroflora and protein digestibility in broiler chickens. In: Proceedings of the 16th European Symposium on Poultry Nutrition. Strasbourg, France,pp: 519-522.
14. Gunal, M., G. Yayli, O. Kaya, N. Karahan, and O. Sulak. 2006. The Effects of Antibiotic Growth Promoter, Probiotic or Organic Acid Supplementation on Performance, Intestinal Microflora and Tissue of Broilers. International Journal of Poultry Science, 5: 149-155.
15. Haghigat, M. 2007. Effect of organic acids and antibiotics on performance and serum metabolites of broilers. Ms.C. thesis, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran (In Persian).
16. HaghghiKhoshkho, P., G. Akbari Azad, I.F. Moayer and I. Pajouhandeh. 2010. Effect of dietary Butyrate on performance and small intestinal morphology of broilers. Journal of Veterinary Clinical Research, 1: 235-242. (In Persian)
17. Hara, H., S. Haga, Y. Aoyama and S. Kiriyama. 1999. Short-chain fatty acids suppress cholesterol synthesis in rat liver and intestine. Journal of Nutrition, 129: 942-948.
18. Hernández, F., V. García, J. Madrid, J. Orengo, P. Catalá and M.D. Megías. 2006. Effect of formic acid on performance, digestibility, intestinal histomorphology and plasma metabolite levels of broiler chickens. British Poultry Science, 47: 50-56.
19. Hosseini, M., N.K. Rahimpour, L. Majedi-Asl, M.A. Mohammad Nezhady, S.L. Zabihi and M. MohammadiKalhor. 2011. Effect of different level of butyric acid glycerides on performance and serum composition of broiler chickens. World Journal of Zoology, 6: 179-182.
20. Hu, Z.and Y. Guo. 2007. Effects of dietary sodium butyrate supplementation on the intestinal morphological structure, absorptive function and gut flora in chickens. Animal Feed Science and Technology, 132: 240-249.
21. Isazade, S., N. Mousavi and R. Taherkhani. 2015. Effects of organic acids with different dietary electrolyte balances on growth performance and intestinal microbial population of broilers. Research on Animal Production, 6: 49-60. (In Persian)
22. Jin, L.Z., Y.W. Ho, N. Abdullah and S. Jalaludin. 1998. Growth performance, intestinal microbial populations, and serum cholesterol of broilers fed diets containing lactobacillus cultures. Poultry Science, 77: 1259-1265.
23. Jong Woong, K., K. Jong Hyuk and K. Dong Yong. 2015. Dietary organic acids for broiler chickens: a review. RevistaColombiana de CienciasPecuarias, 28:109-123.
24. Kamal, A.M. and N.M. Ragaa. 2014. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance and serum biochemistry of broiler. Nature and Science, 12: 38-48.
25. Leeson, S., H. Namkung, M. Antongiovanni and E.H. Lee. 2005. Effect of Butyric Acid on the Performance and Carcass Yield of Broiler Chickens. Poultry Science, 84: 1418-1422.

26. Mahdavi, R. and M. Torki. 2009. Study on Usage Period of Dietary Protected Butyric Acid on Performance, Carcass Characteristics, Serum Metabolite Levels and Humoral Immune Response of Broiler Chickens. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 8: 1702-1709.
27. Miles, R.D., G.D. Butcher, P.R. Henry and R.C. Littell. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative morphology. *Poultry Science*, 85: 476-485.
28. MollaeiKandellosi, M.R. and F. MirzaeeiAghjehGgeshlagh. 2013. Effects of probiotic *Saccharomyces cervisia* and organic acids on performance and small intestinal morphology in broiler chickens, *Research on Animal Production*, 3: 25-34. (In Persian)
29. Mroz, Z. 2005. Organic acids as potential alternatives to antibiotic growth promoters for pigs. *Advances in Pork Production* 16: 169-175.
30. Panda, A.K.S.V. Rama Rao, M.V.L.N. Raju and G. Shyam Sunder. 2009. Effect of butyric acid on performance, gastrointestinal tract health and carcass characteristics in broiler chickens. *Asian-Aust. Journal of Animal Sciences*, 22: 1026-1031.
31. Pishjang, J. 2011. Comparative effect of achillea and butyric acid on performance, carcass traits and serum composition of broiler chickens. *Annals of Biological Research*, 2:469-473.
32. Rafacz-Livingston, K.A., C.M. Amezcuia, C.M. Parsons, D.H. Baker and J. Snow. 2005a. Citric acid improves phytate phosphorus utilization in crossbred and commercial broiler chicks. *Poultry Science*, 84: 1370-1375.
33. Rafacz-Livingston, K.A., C.M. Parsons, and R.A. Jungk. 2005b. The effects of various organic acids on phytate phosphorus utilization in chicks. *Poultry Science*, 84: 1356-1362.
34. ShabaniFath, A.A., R. Najafi and G. Najafi. 2011. Effects of antibiotic growth promoter replacement with organic acids, onsmall intestinal morphology, performance and carcass characteristics ofbroiler chickens. *Journal of Animal Science Researches*, 22: 113-124 (In Persian)
35. Shaiful Islam, K.M.D. 2005. Dose titration, tolerance and compatibility of some feed additives in broiler. Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree Ph.D. in Agricultural Sciences. University of Leipzig.
36. Soltan, M.A. 2008. Effect of dietary organic acid supplementation on egg production, egg quality and some blood serum parameters in laying hens. *International Journal of Poultry Sciences*, 7: 613-621.

Effect of Different Levels of Dietary Protected Butyric Acid on Growth Performance, Blood Metabolites and Minerals of Tibia in Broiler Chicken

Mohammad Amiri Andi¹ and Hashem Mansouri²

1- Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, (Corresponding author: m-amiriandi@iausdj.ac.ir)

2- Graduated M.Sc. Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

Received: May 19, 2016

Accepted: May 16, 2017

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the effects of different levels of dietary protected butyric acid (PBA) on growth performance, blood metabolites, calcium and phosphorous of tibia in broilers. Two hundred and seventy day old Ross 308 male broilers divided in 9 treatments and 3 replicates (10 chicks per replicates), in a completely randomized design. Experimental treatments included: (1) control (without additives), (2) 0.1% Bacitracin (positive control), (3) 0.2% PBA in starter period, (4) 0.2% PBA in starter and grower periods, (5) 0.2% PBA in starter, grower and finisher periods, (6) 0.3% PBA in starter period, (7) 0.3% PBA in starter and grower periods, (8) 0.3% PBA in starter, grower and finisher periods and (9) 0.5, 0.4 and 0.3% PBA in starter, grower and finisher periods, respectively. Results indicated that the highest daily weight gain in starter period was related to birds fed 0.2% PBA, having significant difference with birds fed control, 0.3 and 0.5% PBA ($p < 0.05$). Use of PBA had no effect on body weight and daily weight gain in grower, finisher and total periods. PBA levels and Bacitracin did not effect on feed intake and feed conversion ratio of broilers. PBA did not have significant effect on blood metabolites (except blood plasma calcium) and calcium and phosphorous percentage of tibia at 42 days of age. Based on the taken results, it seems that use of 0.2% PBA as a replacing additive of antibiotic in broiler's diet is useful, especially in starter period.

Keywords: Broilers, Butyric Acid, Blood Metabolites, Performance, Tibia Calcium