



"مقاله پژوهشی"

بررسی شاخص‌های تنوع ژنتیکی در یک جمعیت از گاو هلشتاین با استفاده از نشانگرهای متراکم اسنیپ

رئوف شاکری^۱, آرش جوانمرد^۲, کریم حسن‌بور^۳, مختارعلی عباسی^۴, سید مصطفی مظلوم^۵, مجید خان‌سفید^۶ و مهران رحیمی ورپشتی^۷

- دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

- استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، (تویسندۀ سپول: a.javanmard@tabrizu.ac.ir)

- استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

- دانشیار سازمان تات، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

- دانشجوی دکترا گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

- محقق و پژوهشگر موسسه اگرو بیوساینس، دپارتمان کشاورزی ویکتوریا، استرالیا

- کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، مدیر عامل شرکت آرین دلتا ژنتیک، تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

صفحه: ۱۴۰ تا ۱۴۹

چکیده

کاهش میزان تنوع ژنتیکی و به تبع آن افزایش تجمعی میزان هم‌خونی از جمله عوامل تهدید کننده صنعت پرورش گاو شیری محسوب می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص‌های تنوع ژنتیکی (توزیع عدم تعادل لینکازی، آماره هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار، آماره F_{is} ، توزیع فراوانی آل‌های نادر، میزان اتوژنیکوتی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی) در گاو هلشتاین با استفاده از نشانگرهای متراکم اسنیپ بود. داده‌های ژنتیکی متعلق به ۲۵ گاو ماده هلشتاین حاصل از تراشه اسنیپ گاوی ۵۰ هزار تایی، اهدایی از شرکت تجاری آتلادلتا ژنتیک تجزیه و تحلیل شد. محاسبات آماری شاخص‌های مولکولی مذکور از طریق نرم‌افزار معروف پلینک، نسخه ۱/۹ تحت محیط R صورت گرفت. میانگین فراوانی هتروزیگوتی مشاهده شده و هتروزیگوتی مورد انتظار به ترتیب $1/9$ ، $1/10$ (منفی $1/28$)، آماره F_{hom} ($0/0\cdot 328$) و آماره F_{is} ($0/0\cdot 328$) اندازه‌گیری شد. همچنین، نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، تنوع و پراکنش معنی دار بالایی را نشان داد که تأییدی بر مطابقت و هم‌خوانی همه آماره‌های مولکولی اندازه‌گیری شده و بالا بودن میزان تنوع ژنتیکی اندازه‌گیری شده بود. از آنجایی که، شاخص ROH، از اطلاعات توالی نوکلئوتیدی یکسان انتقال یافته به دو فرد حاصل می‌شود لذا، در مقایسه با شاخص F_{is} ، معیار آماری مناسب‌تری برای مطالعه میزان هم‌خونی، می‌باشد. نتیجه‌گیری نهایی این که، بکارگیری نشانگرهای متراکم اسنیپ می‌تواند، ابزاری مناسب برای ارزیابی وضعیت تنوع ژنتیکی و هم‌خونی جمعیت‌های دامی محسوب شود.

واژه‌های کلیدی: تراشه اسنیپ، تنوع ژنتیکی، گاو هلشتاین، هم‌خونی

گاوها هلشتاین، به عنوان یکی از نژادهای مشهور گاو شیرده در دنیا به بیشترین تولید شیر با کمترین درصد چربی شهرت یافته و منشأ پیدایش اصلی این نژاد، کشور هلند است (۴). اولین گاوها هلشتاین در سال ۱۳۳۹ وارد کشور شده (آمار مرکز اصلاح نژاد دام) که اکنون با شرایط کشورمان وفق پیدا کرده است (۴).

اصلاح نژاد گاو نژاد هلشتاین در دنیا قدمت زیادی دارد. به نظر می‌رسد بهدلیل افزایش استانداردهای تولیدی، باعث بروز یکنواختی ژنتیکی در نژاد هلشتاین شده و این مسئله باعث کاهش تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گاوها هلشتاین امروزی، شده است. مدیریت ژنتیکی گاو هلشتاین ایران، نیازمند داشتن کاشن کافی، درخصوص، شاخص‌های تنوع، منشأ ژنتیکی، اسپرم‌های توزیع شده در سطح جامعه این نژاد می‌باشد (۴، ۹، ۱۰).

با وجود آنکه نژدیک به ۵۰ سال از پرورش و اصلاح نژاد گاو هلشتاین در ایران می‌گذرد و بخش قابل توجهی از اسپرم‌های مصرفی صنعت گاو شیرده منشاء خارجی دارند. با این حال، هنوز در مسیر اصلاح نژاد هلشتاین ایرانی مشکلات عدیدهای وجود دارد (۴، ۷). برخی از راهکارهای پیشنهادی موجود برای رهایی از این معضل می‌تواند افزایش هتروزیگوتی ژئومی با

مقدمه

جهت اصلاح ژنتیکی یک جمعیت دامی به طور همزمان دو ابزار تنوع ژنتیکی و انتخاب مور دنیا است (۸، ۱۳، ۳۷). تنوع ژنتیکی در واقع وجود چند شکلی نوکلئوتیدی و به تبع آن فروانی ترکیبی آل‌های منحصر به فرد ایجاد کننده فاصله ژنتیکی در داخل و بین جمعیت‌ها می‌باشد (۳۰، ۳۱، ۳۴). در مباحث توسعه پایدار سیستم‌های تولیدی دام، تنوع ژنتیکی به عنوان ماده خام فعالیت‌های اصلاح نژادی محسوب می‌شود و وجود تنوع کافی برای رفع نیازهای آتی و تصمیمات اصلاح نژادی، ضروری است (۳۴).

اندازه‌گیری شاخص‌های تنوع ژنتیکی در یک جمعیت دامی می‌تواند، تاثیرات عواملی همچون اهلی شدن و انتخاب طبیعی، جهش، رانش ژنتیکی، نوترکیبی کروموزومی، مهاجرت، هم‌خونی و انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی یک جمعیت، قابلیت سازگاری و صفات تولیدی و تولیدمثلی تحت معیارهای عددی نمایش دهد و موضع شناسی (توبولوژی) افراد نسبت به هم را به صورت گرافیکی نشان دهد (۱۳، ۲۹، ۳۵). لذا، برنامه‌ریزی مدیریت ژنتیکی یک دام در واقع محتاج تصمیماتی هستند که باید بر مبنای درک صحیحی از ساختار وضعیت تنوع ژنتیکی آن اتخاذ گرددند (۳۴).

همکاران در سال ۲۰۱۱ ضریب هم‌خونی در جمعیت گاو هلشتاین ایران بر پایه اطلاعات شجره را در حدود ۵ درصد گزارش نمودند^(۴). میانگین ضریب هم‌خونی در سال ۲۰۱۱ در آمریکا و کانادا به ترتیب ۵/۷۵ و ۶/۲ درصد گزارش شده است^(۱۲). دادار و همکاران^(۲۰۱۱) روند افزایشی ضریب هم‌خونی در جمعیت گاو هلشتاین ایران در سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ را حدود ۳/۳ درصد در هر سال گزارش نمودند^(۳،۱۲). فروتن و همکاران^(۱۲) میزان ROH در گاوهای هلشتاین آمریکای شمالی، در دامنه عددی حدود ۵۷ تا ۸۲ بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ تخمین زد. مارتین کنین و همکاران^(۲۴) در گاوهای ایرشایر تاثیر جزایر ROH بر پسروی صفات تولید شیر و تولیدمثلی را گزارش کردند. همچنین گورگوال و همکاران^(۳۹) شاخص‌های آماری مختلف ROH و همبستگی جاکم بین آنها را در گاوهای هلشتاین لهستان را تحقیق کردند^(۲۵).

ملکای و همکاران^(۲۶) با استفاده از تراشه‌های متراکم اسینیپ شاخص‌های تنوع ژنتیکی در سه جمعیت گاوهای نژادی جرسی، براون سوئیس و هلشتاین کانادا بررسی کردند و میزان میانگین هتروزیگوتی مشاهده شده را به ترتیب ۰/۲۶، ۰/۲۷ و ۰/۳۱ درصد گزارش کردند^(۲۶).

در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص‌های تنوع ژنتیکی (توزیع عدم تعادل لینکاری، آماره هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار، آماره Fis)، توزیع فراوانی آلل نادر، میزان اتوزیگوتی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی در گاو هلشتاین با استفاده از نشانگرهای متراکم می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در پژوهش حاضر، داده‌های خام از ۲۵ گاو ماده هلشتاین بر مبنای نسخه دوم اسینیپ چیپ (تراشه) K ۵۰ کاندید از مرکز اصلاح نژاد کشور اخذ و سپس تجزیه و تحلیل شد. این جمعیت تحت پوشش برنامه تلقیح شرکت لتا ژنتیک بود.

گام اول کنترل کیفیت و فیلتراسیون

فایل نقشه اسینیپ چیپ از پایگاه داده SNPchiMp v.3 دانلود شد. کلیه جایگاه‌های واقع شده روی کروموزوم جنسی X (تنوع ببروی کروموزوم‌های اتوزومی ارزیابی می‌شود) و جایگاه‌ها با مکان کروموزومی نامشخص از مجموعه داده‌ها کنار گذاشته شدند. اسینیپ‌هایی با تعادل هارדי واینبرگ با مقدار P-value کمتر از ۱۰⁻۶، نرخ خوانش بهازی هر اسینیپ کمتر از ۰/۹۵ و SNP‌های دارای فراوانی آللی مینور کمتر از ۰/۰۵، نرخ خوانش بهازی هر حیوان کمتر از ۰/۹۰٪ فیلتر شدند^(۱۰،۸).

شاخص‌های تنوع درون جمعیتی

مجموع شاخص‌ها و آماره‌های ژنومی، همچون: هم‌خونی ژنومی، تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، آماره شاخص تثبیت Fixation-index (F_{IS}). هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار، توزیع فراوانی آلل نادر و در نهایت LD با استفاده نرم‌افزار پلینک در پنجره‌های ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ تحت محیط R اجرا و اندازه‌گیری شد.

کنترل جفتگیری‌ها، حداقل نمودن فاصله نسلی (انجماد جنبن)، حداقل نمودن اندازه مؤثر جمعیت، نظارت مستمر شاخص‌های مولکولی تنوع و هم‌خونی باشد^(۱۳،۲۹،۳۵).

در سال‌های اخیر استفاده از نشانگرهای چند شکلی تکنوکلئوتیدی (SNP) در مقایسه با سایر نشانگرها بهمیزان بیشتری گسترش یافته است. این نشانگرها دارای فراوانی بسیار زیادی در سطح ژنوم هستند و امکان استفاده هم‌زمان از تعداد بسیار زیادی از آن‌ها در قالب تراشه‌های SNP فراهم شده‌است^(۱۲،۱۳).

ریزآرایه یا تراشه (Chip) یک فناوری جهت بررسی هم‌زمان تعداد زیادی SNP در سطح کل ژنوم می‌باشد^(۴۰) که شرکت‌های افی‌متریکس ۱ و ایلومینا ۲ آن را طراحی می‌کنند^(۵). با این حال، SNP-چیپ‌های گونه‌های اهلی نظری خوک، گاو و گوسفند عمده‌تاً توسط شرکت ایلومینا عرضه شده‌اند^(۱۸).

در نتیجه برنامه‌های انتخاب ژنتیکی در گاوهاش شیرده، تعداد آلل‌ها و هتروزیگوتی کل ژنوم را به طور معنی‌داری کاهش داده است. جوج و همکاران^(۱۵) میانگین هتروزیگوتی در کل ژنوم گاو را ۵۶٪ تخمین زدند.

عدم تعادل پیوستگی در واقع ارتباط غیر تصادفی بین دو جایگاه ژنی در سطح ژنوم می‌باشد که بازده انتخاب ژنومی را به خود واپس‌های کرده است^(۲). سرگلزایی و همکاران^(۳۷) و همچنین کیم و همکاران^(۲۳) در گاوهای هلشتاین آمریکای شمالی شاخص‌های آماری مرتبط با عدم تعادل پیوستگی را با تراشه اسینیپ K ۱۰ ببرسی کردند. همچنین ختکار و همکاران^(۲۲) در گاوهای هلشتاین استرالیا، به بررسی این شاخص پرداختند. قبری و همکاران^(۳۴) در گاوهای هلشتاین آلمان، توانستند ۷۱۵ بلوک هایپوتاتیپی را که ۴/۵ درصد کل ژنوم را پوشش می‌داد، شناسایی کنند و اندازه‌گیری اندازه مؤثر جمعیت را واپس‌های به این شاخص دانستند^(۳) و عواملی همچون طول عمر جهش ایجاد شده^(۱۴)، ساختار ژنتیکی نژاد^(۶)، تاریخچه پیدایش، رانش ژنتیکی، لايه‌بندی جمعیتی و نرخ نوترکیبی را عوامل ایجاد واریانس در این شاخص در مطالعات مختلف دانستند^(۳۴).

در برنامه‌های بهنژادی گاوهاش شیرده، همواره توصیه می‌شود که بهبود صفات و پیشرفت ژنتیکی در کنار ثابت نگهداری میزان هم‌خونی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه محاسبه ضریب هم‌خونی براساس اطلاعات شجره اثرات نمونه‌گیری مندلی را در نظر نمی‌گیرد نتایج آن همیشه با اریبی همراه است بنابراین استفاده از دیدگاه جایگزین قطعات هموزیگوت دست نخورده در سطح ژنوم برای محاسبه هم‌خونی واقعی محسوب شود^(۱۶،۱۸،۳۱).

براساس مقالات پیشین گزارش منتشرشده در سال ۲۰۱۷ در نژاد هلشتاین کانادا میانگین ضریب هم‌خونی در گاوهای ماده متولد شده در سال در حدود ۷/۳۴ درصد است^(۳). بر اساس گزارش CDN، متوسط رشد سالیانه ضریب هم‌خونی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ در حدود ۰/۲۲ درصد بوده^(۱)، در حالی که متوسط افزایش هم‌خونی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در حدود ۰/۰۸ درصد بوده است. دادار و

#Ohom و E#hom به ترتیب تعداد ژنوتیپ‌های هموزیگوت مشاهده شده و مورد انتظار در نمونه است.

$$F_{\text{UNI}} = \frac{x_{i2} - (1+2pi)x_i + 2pi^2}{hi}$$

تجربه به مؤلفه‌های اصلی

تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) جهت شناسایی ساختار جمعیتی مورد استفاده قرار گرفت. PCA یک زیرمجموعه از روش‌های آمار چندمتغیره می‌باشد که قصد دارد از روش‌های آماری مختلف برای دسته‌بندی یا کلاس‌ترینگ افراد براساس n متغیر استفاده کند (۳۶). (PCA) موجب انکاس‌یافتن واریانس ناشی از ساختار جمعیتی نمونه‌ها به جمعیتی می‌شود که مؤلفه‌های اصلی بزرگ‌تر بخش بیشتری از واریانس را توجیه می‌کنند. رسم این مؤلفه‌ها در محور مختصات در مقابل یکدیگر موجب ایجاد خوشه‌های مشخصی از افراد می‌شود که نمایانگر ساختار موجود در نمونه‌های است نمودار این شاخص تحت نرم‌افزار R رسم گردید (۳۶).

آنالیز بیوانفورماتیکی و تحلیل انتیشن نقشه

با توجه به اینکه توزیع اسینیپ‌ها مناطق مختلفی از ژنوم و ترانسکریپتوم گاو را پوشش می‌دهند و همچنین ارزش واریانت‌های مورد بررسی برای تنوع به‌علت ماهیت متفاوت آن‌ها با یکدیگر فرق می‌کند (عدم تغییر یا تغییر کد اسیدآمینه، داخل منطقه کشونده یا اینترونیک، روی پرومومتور یا خارج پرومومتور) در نتیجه برای درک تنوع واقعی بررسی پلی‌مورفیسم مشاهده شده با حاشیه‌نویسی جهت پیش‌بینی تأثیر یا عملکرد یک SNP منحصر به‌فرد امری اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال، SNP‌های موجود در مناطق کدکننده ژنوم به دو دسته SNP‌های هم‌معنی (Synonymous) و ناهم‌معنی (Non-Synonymous) تقسیم می‌شوند. ندارن، در حالیکه SNP‌های ناهم‌معنی موجب تغییر توالی اسید‌های آسیدآمینه پروتئین شده و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. های واقع شده در نواحی غیر کدکننده ژنوم نیز ویرایش ژن‌ها، اتصال عوامل تنظیم کننده رونویسی، تجزیه mRNAها و توالی RNA‌های غیر کدکننده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به‌منظور بررسی پیش‌بینی تأثیر یا عملکرد یک SNP منحصر به‌فرد در داخل نقشه اسینیپ چیپ ۵۰ کی، بر اساس هر کروموزم، در ابتدا فایل Map تبدیل به فایلی با فرمت vcf شد، و سپس از طریق نرم‌افزار VEP در پایگاه Ensembl اقدام به انجام آنالیزهای مربوطه شد.

نتایج و بحث

نتایج کنترل کیفیت و اعتبارسنجی و فیلتر اسیون داده در حالی که فایل خام ما دارای ۵۴۶۰۹ اسینیپ بود در بخش کنترل کیفیت و فیلتر اسیون داده‌های خام اولیه، تعداد ۵۷۱۶ اسینیپ از MAF و ۱۵۸۹ اسینیپ با کیفیت پایین ژنوتیپ فیلتر شدند.

برای برآورد LD در یک جمعیت، دو معیار D و r² دو آماره‌ای هستند که به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. r² به علت حساسیت کمتر نسبت به اندازه نمونه و اختلاف در فراوانی‌های آللی، به عنوان معیاری باثبات بیشتر شناخته شده است. r² به عنوان ضریب همبستگی بین جفت SNP تعريف شده است و می‌توان به کمک رابطه زیر برآورده از آن بدست آورد:

$$\frac{(freqAB * freqab - freqAb * freqaB)^2}{(freqA * freqa * freqB * freqb)}$$

در رابطه بالا، freqb, freqB, freqa, freqA, a, B و b را در جمعیت نشان می‌دهند.

از آنجایی که هتروزیگوت‌ها آلل‌های متفاوتی دارند، فراوانی آنها مهم بوده و نشان‌دهنده وجود تنوع می‌باشد. هتروزایگوسیتی مشاهده شده برای یک جایگاه با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$H_o = \sum_N N_{ij}$$

که در آن N_{ij} (j ≠ i) تعداد افراد هتروزیگوت و N تعداد کل افراد در جمعیت مورد مطالعه می‌باشد. هتروزایگوسیتی مورد انتظار برای یک جایگاه نیز از فرمول زیر محاسبه شد:

$$H_E = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

که در آن عبارت $\sum_{i=1}^n p_i^2$ نسبت مورد انتظار هموزیگوت‌ها می‌باشد و p_i فراوانی آمین آلل در یک جایگاه معین می‌باشد. شاخص هم‌خونی Fis برای ارزیابی یک جمعیت منفرد بر اساس هتروزیگوتی مشاهده شده و موردناظار استفاده می‌شود و جزیيات فرمول آن عبارت است از:

$$F_{IS} [= (H_S - H_l)/H_S]$$

که اجزای داخل فرمول همان هتروزایگوتی مشاهده شده و موردناظار می‌باشد. همچنین ارزش‌های ضریب هم‌خونی براساس نشانگرها با سه روش FGRM (VanRaden2008) بر پایه واریانس ژنتیک افزایشی یا بر اساس روش F_{HOM} (Wright) و F_{UNI} طبق معادلات زیر برآورده شد:

$$F_{GRM} = \frac{(x_{i1} - E(x_{i1}))^2 - 1}{hi} = \frac{x_{i1} - 2pi}{hi} - 1$$

که در اینجا pi برابر با فراوانی مشاهده شده از آلل اول آمین لوکوس ن و (hi=2Pi)(1-Pi) تعداد کپی‌های آلل مرجع برای آمین SNP در رفانس است.

$$F_{HOM} = \frac{[0(\# hom) - E(\# hom)]}{[1 - E(\# hom)]} = 1 - \frac{x_{i1}(2 - x_{i1})}{hi}$$

جدول ۱- آمار توصیفی فیلتراسیون بعد از انجام فرایند کنترل کیفیت داده‌هی خام

Table 1. Descriptive statistics for filtering process after quality control (QC) of raw data

اتمی (تعداد)	
کل SNP در نقشه	۵۴۶۰۹
کل حذف شده در فیلتر مشترکها	۱۱۷۲۸
کل SNP باقی‌مانده	۴۲۸۸۱
حذف شده از MAF	۵۷۱۶
حذف شده از MIND	.
حذف شده از GENO	۱۵۸۹
حذف شده از HWE	.
مجموع حذف شده از QC	۷۳۰۵
مجموع باقیمانده بعد از QC	۳۵۵۷۱

می‌کند. میزان هتروزیگوتی و هموزیگوتی، هردو می‌تواند به طور غیرمستقیم تنوع را نشان دهد. قبری و همکاران (۳۴) میزان فراوانی آلل نادر و هتروزیگوتی مشاهده شده در گاوهای هلشتاین المان را به ترتیب ۰/۲۸ و ۰/۳۷ گزارش کردند که با مطالعه ما همخوانی نداشت.

در تحقیقی دیگر که بر روی گاوها بومی کشور انجام شده است، کمترین مقدار هتروزیگوتی مورد انتظار (۰/۲۴۶) در نژاد سیستانی مشاهده شد. از سوی دیگر بالاترین مقادیر هتروزیگوتی موردانه انتظار در نژادهای کردی (۰/۰۳۹) و سرابی (۰/۰۳۸) بیان شده است (۲۱).

در تحقیقی دیگر که بر روی گاوها بومی و هلشتاین پاکستان انجام شده است، متوسط فراوانی آلل کمیاب برای نژاد sindhi Red و هلشتاین به ترتیب ۰/۱۸ و ۰/۲۲ گزارش شده است (۳۰). در تحقیقی که بر روی گاوها بومی ایران انجام شده است، ضریب خویشاوندی افراد (FIS) در داخل نژادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس بالاترین میزان خویشاوندی (۰/۰۰۹) در میان گاوها نژاد کرمانی مشاهده شد. ضریب خویشاوندی افراد در داخل نژادهای سرابی، سیستانی و پارس به ترتیب ۰/۰۳، ۰/۰۳ و ۰/۰۵ محسوبه گردید. در نهایت، کمترین میزان خویشاوندی در میان گاوها کردی (۰/۰۷) مشاهده شد (۲۱). در تحقیق دیگر که بر روی چهار جمعیت گاوها افریقای جنوبی انجام شده است، بیشترین مقدار فراوانی آلل کمیاب برای نژاد هلشتاین (۰/۰۲۲) و کمترین مقدار برای Nguni (۰/۰۱۷) گزارش شده است (۳۵).

اندازه‌گیری شاخص‌های تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA)

نتایج PCA نشان داد که ۲۵ نمونه حاضر در این تحقیق تنوع ژنتیکی داخل نژادی بسیار بالایی دارند. ۸۵ درصد واریانس توسط مؤلفه اول توجیه شد. یعنی افراد ژنوتایپ شده در داخل جمعیت، ژنوتایپ متفاوت با هم را نشان می‌دهند. علت تفاوت در PCA به ساختار ژنتیکی و تاریخچه فعالیت اصلاح نژادی در آن نژاد برمی‌گردد.

آنالیز تکمیلی بیوانفورماتیکی و تحلیل انواع نشان نشان در بحث تنوع ژنتیکی ژنوم، ما براساس دانستن جایگاه اسنیپ می‌توانیم از مفید بودن نتایج آگاه شویم. زیرا اسنیپ برای ما می‌تواند سودمند باشد که در مناطقی از ژن قرار داشته باشد که در فرآیند رونویسی و ترجمه حضور داشته باشد. نتایج حاصل از این بخش پژوهش حاضر اثبات کرد بر

اندازه‌گیری شاخص‌های تنوع درون جمعیتی شاخص عدم تعادل لینکازی (LD)

میزان LD در پنجره‌های به طول ۵۰ و ۱۰۰ کیلو جفت باز محاسبه شده (مقالات رفرنس برای شناسایی‌ها هاپلوتاپی بلوک عمده‌اً پنجره کمتر از kb۱۰۰ را توصیه کرده‌اند که امکان وقوع کراسینگ اوور کمتر است) که میانگین r^2 به ترتیب ۰/۰۸ و ۰/۰۷ به دست آمد (شکل ۱). نتایج این تحقیق، با مطالعات پیشین قابلیت مقایسه دارد، به عنوان مثال، قبری و همکاران (۳۰) شاخص r^2 در بحث LD در گاوها هلشتاین آلمان در پنجره ۲۵ Kb را به طور میانگین ۰/۳۰ و طول بلوک‌های هاپلوتاپی را ۱۶۶ و kb ۱۴۴ گزارش کردند (۳۲). به هر حال بازدهی برنامه‌های انتخاب ژنومی در دام‌های اهلی تحت‌تأثیر مستقیم میزان LD می‌باشد. زمی یانز و همکاران (۳۸) تحت تحقیقات گستره‌داری ثابت کردند که در جمعیت‌های مختلف گاوستان میزان این فراسنجه متغیر می‌باشد. همان‌طوری که، می‌دانیم LD وابسته به عوامل مختلفی از فاصله نشانگرها، حجم نمونه ژنوتایپ، ساختار جمعیت مورد مطالعه و فراوانی داخل جایگاه می‌باشد. همچنان عدم تعادل پیوستگی در جمعیت‌های مختلف به دلیل تفاوت در اندازه مؤثر جمعیت، نسبت نوترکیبی، فشار انتخاب و دیگر عامل‌های دخیل در اندازه‌گیری LD متفاوت خواهد بود. داشتن اطلاعات در خصوص LD امکان محاسبه اندازه مؤثر جمعیت را میسر و دقت مناسبی را برای برآورد این آماره مهیا می‌کند.

اندازه‌گیری شاخص‌های Fis و MAF

FIS بیانگر متوسط تفاوت میزان هتروزیگوتی مورد انتظار هاردی-واینبرگ و هتروزیگوتی مشاهده بر اثر عدم آمیزش تصادفی در یک زیر جمعیت است که مقدار همبستگی بین موقعیت‌های دو آلل که به طور تصادفی از هریک از زیر جمعیت‌ها انتخاب شوند را بیان می‌دارد. فراوانی آلل نادر در جمعیت مورد مطالعه ۰/۲۸۴ بروآورد شد. همچنان، میانگین فراوانی هتروزیگوتی مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب ۰/۰۳۷۴ و ۰/۰۳۸۶ به دست آمد. همچنان ضریب خویشاوندی افراد (FIS) ۰/۰۳۲ بروآورد شد. همچنان، میانگین فراوانی آلل کمیاب (۰/۰۲۸)، برای کل دیتها بروآورد گردید. تفاوت شاخص‌های محاسبه ہم‌خونی ژنومی در نحوه محاسبه و فرم آن می‌باشد که شاخص‌های ہم‌خونی از ماتریس ہم‌خونی استفاده می‌کند ولی F-statistics از هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار و تفاصل آن‌ها به دست می‌آید. به هر حال، نتایج مجدداً وجود تنوع بالا را تأیید

ژنوم هست که به شکل هاپلوتیپ‌های مشابه هستند اما HOM میزانی از واریانت‌ها که هموزایگوت هستند را نشان می‌دهد و در نتیجه خروجی‌های به دست آمده می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را برای برنامه‌ریزی در خصوص انتخاب آتی اسپرم و کنترل جفتگیری‌ها و درک صحیحی از روابط خوبی‌شوندی بین افراد را مشخص کند. جدول شماره ۲ مقادیر F_{GRM} را برای نمونه‌ها به صورت جداگانه نشان می‌دهد.

منفی بودن ضریب هم‌خونی در این تحقیق می‌تواند به دلیل کم‌بودن تعداد نمونه‌ها باشد. همچنین می‌تواند بدلیل بزرگ بودن هموزایگوستی مشاهده شده از هموزایگوستی مورد انتظار باشد. فروتن و همکاران (۱۲) میزان ROH در گاوها هلشتاین آمریکای شمالی در حدود ۵۷ تا ۸۲ بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۶ تخمین زد.


مسترانجلو و همکاران (۲۵) میزان هم‌خونی در نژاد گاو هلشتاین ایتالیایی F_{GRM} را 0.074 ، F_{HOM} را 0.014 و F_{ROH} را 0.042 گزارش کردند که با نتایج ما همخوانی نداشت که توجیه احتمالی آن می‌تواند به دلیل عواملی همچون عمر جهش ایجاد شده، ساختار ژنتیکی نژاد، تاریخچه پیدایش، رانش ژنتیکی، لایه‌بندی جمعیتی و نرخ نوترکیبی متفاوت در جمعیت مورد مطالعه آنها باشد.

اساس اندازه کروموزومی و معناری خود چیپ تجاری طراحی شده کروموزوم‌های مختلف حاوی توزیع و وزن متفاوتی از نقاط مختلف و واریانت‌های ژنومی هستند.

شاخص‌های معرف هم‌خونی ژنومی (ROH)


در پژوهش حاضر، از روش ماتریس برای اندازه‌گیری شاخص‌های جدید هم‌خونی (F_{GRM}) استفاده شد. شاخص F_{HOM} که میزان هموزایگوستی افراد را نشان می‌دهد یکی از شاخص‌های میزان هم‌خونی است. شکل زیر F_{HOM} را نشان می‌دهد. همچنین، در تحقیق حاضر ROH یا همان طولهای به هم پیوسته ژنتیکی هموزایگوت انتقال یافته از والدین به فرزندان که منعکس کننده نواحی ژنومی همتبار است (گومز رایا و همکاران (۱۸)) صفر به دست آمد. توجیهات علمی که برای به دست آوردن این ارزش می‌توان بیان کرد، با توجه به میزان پایین ال دی که گزارش کرده‌اند و این نتایج، به علت کوچک بودن تعداد نمونه، فیلترینگ به خوبی انجام نشده است.

همچنین، در پژوهش حاضر، نتایج F_{GRM} مقادیر منفی را نشان داد. که دامنه آن از $(0/055)$ تا $(0/055)$ می‌باشد. میانگین F_{GRM} برای نمونه‌های مورد پژوهش -0.0399 به دست آمد مفهوم شاخص ROH در واقعه بیانگر میزانی از




شکل ۱- توزیع عدم تعادل لینکاژی در سطح کروموزوم‌های مختلف


Figure 1 Distribution of linkage disequilibrium (r^2) in different chromosomes level



شکل ۲- توزیع هتروزیگوتی مشاهده شده (سمت چپ) و هتروزیگوتی مورد انتظار (سمت راست)
Figure 2. Distribution of observed heterozygosity (left) and expected heterozygosity (right)




شکل ۳- توزیع شاخص ثبت (F_{is}) در مطالعه حاضر
Figure 3. Distribution of observed F -statistics (F_{is}) values in this study



شکل ۴- توزیع فراوانی آل نادر در مطالعه حاضر
Figure 4. Distribution of Minor allele frequency in the present study

جدول ۲- میانگین و دامنه هم خوئی ژنومیکی تخمین زده براساس F_{HOM} , F_{ROH} , F_{GRM} اندیس
Table 2. Mean and range of estimated genomic inbreeding based on F_{HOM} , F_{ROH} , F_{GRM} indices

دامنه	میانگین	ضریب هم خوئی
(-0.06) - 0.062	-0.0328	F_{HOM}
-	-	F_{ROH}
(-0.121) - 0.055	-0.0399	F_{GRM}



شکل ۵- گراف مقایسات درون جمعیتی بر اساس شاخص تجزیه به مؤلفه های اصلی
Figure 5. Comparison plot for intra genetic diversity based on PCA index

جدول ۳- خلاصه حاشیه نویسی و خروجی‌های واریانت‌های مختلف به تفکیک هر کروموزوم بر اساس اسنیپ چیپ ۵۰ کیلوبازی
Table 3. Summary of annotation and output of different variants per chromosome of based on bovine 50K SNPs chip

	Chr. .1	Chr. .2	Chr. .3	Chr. .4	Chr. .5	Chr. .6	Chr. .7	Chr. .8	Chr. .9	Chr. .10	Chr. .11	Chr. .12	Chr. .13	Chr. .14
3_prime_UTR_variant	۲۳	۲۱	۵۸	۸	۲۱	۱۹	۲۹	۲۳	۱۷	۱۸	۳۱	۷	۲۶	۶
5_prime_UTR_variant	۲	۱۰	۱۱	۱	۱۳	۱	۸	۸	۹	۷	۵	۲	۳	۶
Downstream_gene_variant	۰	۰	۱۱	۱	۱۳	۱	۸	۸	۹	۷	۵	۲	۳	۶
Intergenic_variant	۲۰۷	۱۸۷	۲۴۴	۱۵۷	۲۵۹	۱۳۱	۲۱۸	۱۲۳	۱۲۲	۱۸۱	۲۱۸	۷۹	۱۶۳	۷۹
Intron_variant	۱۶۶	۱۳۰	۱۰۴	۱۰۳	۱۲۴	۱۲۴	۹۸۸	۱۱۵	۱۰۴	۸۳۱	۹۱۹	۹۰۰	۷۵۸	۸۸۵
Missense_variant	۲۰۰	۲۰۷	۱۸۴	۲۰۳	۱۷۴	۱۵۰	۱۴۳	۱۶۳	۱۲۴	۱۶۴۸	۱۶۰۰	۷۶۴	۱۲۵۹	۱۰۸۵
Non_coding_transcript_exon_variant	۱۵	۳۰	۳۴	۷	۲۱	۹	۲۴	۳۳	۱۹	۱۴	۱۹	۷	۱۷	۱۲
Synonymous_variant	۴	۴	۱	۲	۳	۱	۲	۴	۴	۱۰	۷	۳	۲	۱
Upstream_gene_variant	۴۲	۴۹	۴۴	۴۲	۴۵	۳۷	۶۵	۵۰	۱۵	۴۳	۴۳	۱۱	۲۵	۲۸
3_prime_UTR_variant	۱۶۴	۱۴۶	۱۸۶	۱۵۸	۱۸۸	۱۰۵	۲۲۳	۱۰۵	۰	۱۶۸	۱۶۰	۶۴	۱۲۰	۶۸
Intron_variant,non_coding_transcript_variant	۵۲	۳۷	۲۹	۲۳	۳۹	۲۱	۳۹	۲۹	۳۴	۵۵	۵۶	۲۵	۲۴	۱۹
Missense_variant splice_region_variant	۰	۱	۴	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۱
Splice_region_variant,intron_variant	۵	۴	۳	۴	۱۱	۰	۵	۵	۰	۷	۶	۲	۹	۰
Sum	۵۷	۴۲	۳۶	۲۷	۵۱	۲۱	۴۵	۳۴	۳۴	۶۲	۶۶	۲۷	۳۳	۲۰

جدول ۳ (ادامه):

	Chr. .1۵	Chr. .1۶	Chr. .1۷	Chr. .1۸	Chr. .1۹	Chr. .2۰	Chr. .2۱	Chr. .2۲	Chr. .2۳	Chr. .2۴	Chr. .2۵	Chr. .2۶	Chr. .2۷	Chr. .2۸	Chr. .2۹
3_prime_UTR_variant	۲۱	۱۸	۹	۱۶	۳۹	۸	۱۸	۱۵	۱۴	۵	۱۷	۱۲	۳	۱۴	۲۱
5_prime_UTR_variant	۴	۴	۸	۵	۹	۰	۷	۰	۹	۱	۳	۵	۲	۱	۴
Downstream_gene_variant	۱۳۸	۱۱۱	۱۴۲	۱۶۲	۲۲۳	۵۷	۱۰۳	۱۲۱	۱۳۹	۵۱	۱۴۰	۷۴	۴۴	۶۶	۹۴
Intergenic_variant	۶۷۹	۶۶۵	۶۸۰	۴۶۲	۳۷۶	۸۴۰	۶۱۴	۴۲۹	۴۱۷	۶۳۰	۳۵۸	۴۱۸	۴۸۶	۳۶۵	۴۰
Intron_variant	۱۲۳	۱۱۰	۱۳۱	۹۳۰	۱۲۸	۸۴۶	۸۵۸	۱۲۰	۷۲۴	۸۵۲	۶۶۶	۱۰۲	۵۵۰	۷۷۷	۸۱۴
Missense_variant	۱۱	۲۴	۸	۲۹	۱۸	۷	۹	۲۳	۱۴	۸	۹	۱۰	۱۰	۲۳	۱۹
Non_coding_transcript_exon_variant	۱	۰	۱	۳	۰	۱	۵	۲	۲	۰	۳	۱	۱	۰	۲
Synonymous_variant	۷۵	۱۸	۳۹	۴۷	۷۲	۱۷	۲۴	۲۳	۳۹	۴۳	۲۶	۱۸	۱۱	۱۱	۱۸
Upstream_gene_variant	۱۵۱	۱۱۶	۱۳۳	۱۹۶	۲۱۳	۵۷	۱۰۱	۸۹	۱۳۹	۵۷	۱۱۸	۷۶	۵۹	۷۲	۱۱۱
Intron_variant,non_coding_transcript_variant	۲۸	۲۱	۳۲	۲۷	۱۵	۱۰	۳۵	۲۵	۲۸	۲۳	۱۵	۲۱	۱۵	۶	۱۱
Missense_variant splice_region_variant	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Splice_region_variant,intron_variant	۱۳	۲	۲	۳	۱۸	۲	۲	۱	۵	۰	۲	۰	۳	۱	۳
Sum	۴۱	۲۳	۳۴	۳۰	۳۳	۱۲	۳۷	۲۶	۳۳	۲۳	۱۷	۲۱	۱۸	۷	۱۴

کدشونده و کد نشونده با نیم نگاهی بر ال در ساخت چیپ رعایت شده و ال دی بسته به ژنوتیپ‌ها و ساختار هر جمعیت رفتار مختص آن جمعیت به خصوص را نشان می‌دهد. فناوری بزرگ ژنوتایپ قادر به پوشاندن کل ژنوم گاو برای ایجاد داده‌های خام درست و دقیق برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در داخل و بین جمعیت‌ها است.

تشکر و قدردانی
از مسئولین دلسوز و کارکنان زحمتکش محترم مرکز اصلاح و شرکت آلتادلتا ژنتیک که در اجرای این طرح باری رساندند و همچنین، از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز به خاطر حمایت مالی و معنوی و همکاری مجموعه دانشگاه تبریز جهت انجام این طرح در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اصلاح‌نژاد دام، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

نتایج مرحله آنالیز نشان داد که هر ۲۵ حیوان در آنالیز باقی ماندند. اما تعداد ۵۷۱۶ اسنیپ از MAF و ۱۵۸۹۰ اسنیپ با کیفیت پایین ژنوتیپ فیلتر شدند. نتایج ال دی در فاصله کمتر از ۵۰ k جفت باز عدم تعادل همبستگی بالا را در مناطق اشباع شده از نقشه و فاصله کم SNP در ژنوم گاو نشان می‌دهد. رویکردهای مولکولی بر اساس برآورد ضریب هم‌خونی حاصل از ROH (F_{ROH}) و بر اساس ماتریس خویشاوندی ژنومی (F_{GRM}) و میزان هموژیگوستی افراد (F_{HOM}) ارزش منفی را نشان می‌دهد که به‌وضوح به معنی بیش از حد هتروژیگوستی در ساختار جمعیت هلشتاین بررسی شده‌است. تجزیه و تحلیل آماری PCA و F و محاسبه هتروژیگوستی مشاهده شده و مورد انتظار در یک راستا و در یک ردیف از خروجی‌های هم‌ثُرای ژنومی بود که تمام آنالیزها یکدیگر را در راستای یک پیام تنوع بالا تأیید کردند. نتایج انواع نشان داد که در طراحی معماری اسنیپ چیپ تراکم وسیع و پوشش تمام ژنوم و ترانسکریپتوم و نواحی

منابع

1. Anonymous. 2017. Inbreeding Update- August 2017. Canadian Dairy Network.
2. Barani, S., S.M. Moradi, J.A. Nejati, M.H. Moradi, M. Gholizadeh and M. Khansefid. 2017. The pattern of linkage disequilibrium in three native Iranian sheep breeds. *Iranian Journal of Animal Science*, 48: 11-18.
3. Biegelmeyer, P., C.C. Gulias-Gomes, A.R. Caetano, J.P. Steibel and F. Cardoso. 2016. Linkage disequilibrium, persistence of phase and effective population size estimates in Hereford and Braford cattle. *BMC Genetics*, 17(1): 1.
4. Dadar, M., S.A. Mahyari, M. Rokouei and M.A. Edriss. 2014. Rates of inbreeding and genetic diversity in Iranian Holstein Cattle. *Animal Science Journal*, 85(10): 888-894.
5. Dash S, A. Singh, A.K. Bhatia, S. Jayakumar, A. Sharma, S. Singh, I. Ganguly and S.P. Dixit. 2017. Evaluation of bovine high-density SNP genotyping array in indigenous dairy cattle breeds. *Animal Biotechnology*, 29(2): 129-135.
6. Edea, Z., H. Dadi, T. Dessie, S.H. Lee and K.S. Kim. 2015. Genome-wide linkage disequilibrium analysis of indigenous cattle breeds of Ethiopia and Korea using different SNP genotyping Bead Chips. *Genes and Genomics*, 37(9): 759-765.
7. Eftekhari, M., A. Mahzoon and A. Aghashahi. 2020. Study of the Status and Causes of Culling in Dairy Cattle in Qazvin Province. *Research on Animal Production*, 11(29): 10.
8. Falconer, D.S. and T.F.C. Mackay. 1996. An introduction to quantitative genetics, 4th edition. Longman.
9. Food and Agriculture Organization (FAO). 2013. In vivo conservation of animal genetic resources. FAO Animal Production and Health Guidelines, FAO, Rome, Italy, 14.
10. Food and Agriculture Organization (FAO). 2015. The second report on the state of the world's animal genetic resources for food and agriculture. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments, FAO, Rome, Italy.
11. Forogh Ameri, N. 2017. Exploring the genomes of Iranian native cows to identify selected areas. PhD Thesis, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran, 123 (In Persian).
12. Forutan, M., S. Ansari Mahyari and C. Baes. 2018. Inbreeding and runs of homozygosity before and after genomic selection in North American Holstein cattle. *BMC Genomics*, 19(98): 2-12.
13. Gandini, G. and K. Oldenbroek. 2007. Strategies for moving from conservation to utilization. In: Oldenbroek, K. (ed.) Utilization and conservation of farm animal genetic resources. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands.
14. García-Gámez, E., G. Sahana, B. Gutiérrez-Gil and J.J. Arranz. 2012. Linkage disequilibrium and inbreeding estimation in Spanish Churra sheep. *BMC Genetics*, 13(1): 43.
15. Georges, M.D., M. Nielsen, A. Mackinnon, R. Mishra, A.T. Okimoto, L. S. Pasquino, L. S. Sargeant, A. Sorensen, M. R. Steele, X. Zhao, J.E. Womack and I. Hoeschele. 1995. Mapping quantitative trait loci controlling milk production in dairy cattle by exploiting progeny testing. *Genetics*, 139: 907-920.
16. Goddard, M.E. 2009. Genomic selection: Prediction of accuracy and maximization of long term response. *Genetica* (The Hague), 136: 245-252.
17. Goddard, M.E. 1992. Optimal effective population size for the global population of black and white dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 75: 2902-2911.
18. Gomez-Raya, L., C. Rodríguez, C. Barragán and L. Silió. 2015. Genomic inbreeding coefficients based on the distribution of the length of runs of homozygosity in a closed line of Iberian pigs. *Genetics Selection Evolution*, 47(1): 81.
19. Gomez-Roman, F., B. Villanueva, M.A.R. De Cara and J. Fernández. 2013. Maintaining genetic diversity using molecular co-ancestry: the effect of marker density and effective population size. *Genetics Selection Evolution*, 45: 38-45.
20. Bowman, P.J., A.C. Chamberlain, K. Verbyla and M.E. Goddard. 2009. Accuracy of genomic breeding values in multi-breed dairy cattle populations. *Genetics Selection Evolution*, 41(1): 51.
21. Karimi, K., K.A. Esmailizadeh and M. Asadi Fuzi. 2015. Analysis of genetic structure of Iranian indigenous cattle populations using dense single nucleotide polymorphism markers. *Animal Production Research*, 3: 93-104.
22. Khatkar, M.S., K.R. Zenger, M. Hobbs, R.J. Hawken, J.A. Cavanagh, W. Barris, A.E. McClintock, S. McClintock, P.C. Thomson, B. Tier, F.W. Nicholas and H. W. Raadsma. 2007. A primary assembly of a bovine haplotype block map based on a 15,036 single nucleotide polymorphism panel genotyped in Holstein Friesian cattle. *Genetics*, 176: 763-772
23. Kim, K.S., J.S. Yeo and C.B. Choi. 2002. Genetic diversity of North-East Asian cattle based on microsatellite data. *Animal Genetics*, 33: 201-204.
24. Martikainen, K., M. Koivula and P. Uimari. 2020. Identification of runs of homozygosity affecting female fertility and milk production traits in Finnish Ayrshire cattle. *Science Reproduction*, 10: 3804. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60830-9>
25. Mastrangelo, S., M. Tolone, R. Di Gerlando, L. Fontanesi, M.T. Sardina and B. Portolano. 2016. Genomic inbreeding estimation in small populations: evaluation of runs of homozygosity in three local dairy cattle breeds. *Animal*, 10(5): 746-754.
26. Melka, M.G., F.S. Schenkel. 2012. Analysis of genetic diversity in Brown Swiss, Jersey and Holstein populations using genome-wide single nucleotide polymorphism markers. *BMC Research Notes*, 5: 161. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-161>.

27. Meuwissen, T.H.E. 2009. Towards consensus on how to measure neutral genetic diversity? *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 126: 333-334.
28. Meuwissen, T.H.E. 1997. Maximizing the response of selection with a pre-defined rate of inbreeding. *Journal of Animal Science*, 75: 934-940.
29. Meuwissen, T.H.E. 2009. Towards consensus on how to measure neutral genetic diversity? *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 126: 333-334.
30. Mustafa, H., H. Heather, J. EuiSoo, K. Ahmad, N. Ali, A. Khan, T. Naseer Pasha, M. Zahid Farooq, K. Javed, A. Ajmal and S. Sonstegard. 2014. Comparative analysis of genome wide difference in Red Sindhi and Holstein cattle breeds using dense SNP marker. *Intentional Journal Advance Research*, 2: 300-4.
31. Naghavian, S., S. Davoudali and A. Mobaraki. 2018. Estimation of Inbreeding and Survey of the Pedigree Structure of Iranian Turkmen Horses Population. *Research on Animal Production*, 9(22): 12.
32. Oldenbroek, J.K. 2007. Utilisation and conservation of farm animal genetic resources. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands.
33. Oldenbroek, K. 2007. Utilisation and conservation of farm animal genetic resources. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands.
34. Qanbari, S. 2009. Study of genomic structure and signatures of recent positive selection in cattle. Doctor of Philosophy (PhD) at the Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August University, Göttingen, Germany.
35. Qwabe, S.O., E. VanMarle-Koster, A. Maiwashe and F.C. Muchadeyi. 2013. Evaluation of the Bovine SNP 50 genotyping array in four South African cattle populations. *South Africa Journal Animal Science*, 43: 64-67.
36. Rahmaninia, J., S.R. Miraei-Ashtiani and H. Moradi Shahrbabak. 2015. Unsupervised clustering analysis of population and subpopulation structure using dense SNP markers. *Iranian Journal of Animal Science*, 46(3): 277-287.
37. Sargolzaei, M., F.S. Schenkel, G.B. Jansen and L.R. Schaeffer. 2008. Extent of linkage disequilibrium in Holstein cattle in North America. *Journal of Dairy Science*, 91: 2106-2117.
38. Simianer, H. 2005. Decision making in livestock conservation. *Ecological Economics*, 54: 559-572.
39. Urgul, A., T. Szmatala, P. Topolski, I. Jasielczuk, K. Żukowski and M. Bugno-Poniewierska. 2016. The use of runs of homozygosity for estimation of recent inbreeding in Holstein cattle. *Journal Applied Genetics*, 57: 527-530.
40. Yang, W., X. Kang, Q. Yang, Y. Lin and M. Fang. 2013. Review on the development of genotyping methods for assessing farm animal diversity. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 4(1): 1-6.

Assessment of Genetic Diversity Within Holstein Population using Bovine SNP Chip Data

**Raoof Shakeri¹, Arash Javanmard², Karim Hasanzadeh³, Mokhtar-Ali Abbasi⁴,
Seyed Mostafa Mazlom⁵, Majid Khansefid⁶ and Mehran Rahimi Varpoushti⁷**

1- Graduated M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz,
Iran

2- Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture of Tabriz, Tabriz
(Corresponding author: a.javanmard@tabrizu.ac.ir)

3- Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture of Tabriz, Tabriz. Iran.

4- Associated Professor, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO) Iran

5- PhD Candidate, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ferdowsi, Mashhad

6- Researcher, Agri Bioscience, Agriculture Victoria Services, Bundoora, VIC, Australia

7- M.Sc. Animal Genetics and Breeding, CEO Arian Delta Gene Company, Tehran, Iran

Received: December 11, 2020 Accepted: February 20, 2021

Abstract

Historically, both significant decline of genetic diversity and simultaneously increasing rate of inbreeding are two serious threaded factors in worldwide dairy industry. With this motivation, the aim of present report was to investigate the intra genetic diversity criteria (linkage disequilibrium, observed and expected heterozygosity, F_{is} statistics, MAF distribution, autozygosity rate and population stratification using principal component analysis) in Holstein cattle population using dense markers. An Illumina Bovine 50k SNP Chip (V2) ready genotyped file for 25 Holstein cows obtained for further investigation. Here, we used Plink software for statistical analysis and measurement of molecular diversity indices. Observed outcomes results addressed average of MAF (0.28), mean frequency of observed and expected heterozygosity (0.38, 0.37), F_{is} statistic (-0.032), F_{hom} statistic (-0.028-0.328). In addition, PCA graph showed a significant indicating high population diversity, which was in accordance with all other calculated parameters. As a final conclusion, high-density SNP markers seems be as an accurate tool applicable for high-precision intra-diversity analyses.

Keywords: Holstein cows, Inbreeding, Inter population diversity, SNP chip technology