



بررسی اثرات تزریق داخل تخمرغی عصاره بره موم بر عملکرد رشد و وضعیت سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

ساحل بخشایش^۱, جمال سیف دواتی^۲, صیاد سیف زاده^۳, فرزاد میرزاچی آقجه قشلاق^۴, حسین عبدی بنمار^۵ و وحید واحدی

۱، ۳، ۴ و ۵- دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشجوی دکترای تغذیه دام و دانشیار و استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی

۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، (نویسنده مسؤول: jseifdavati@uma.ac.ir)

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲

چکیده

به منظور بررسی اثر تزریق عصاره بره موم در تخمرغ‌های مادر گوشتی بر عملکرد رشد و وضعیت سیستم ایمنی جوجه‌ها بعد از تزریق پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد. در روز ۱۴ جوجه‌کشی، عدد تخمرغ سویه راس ۳۰۸ توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۶ گروه آزمایشی با ۳ تکرار و هر تکرار شامل ۱۸ عدد تخمرغ تقسیم شد. تیمارها شامل شاهد (بدون تزریق)، شاهد با تزریق آب استریل، تزریق محلول ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌لیتر با مایع آمنیوتیک تخمرغ‌ها تزریق انجام گرفت. نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به مایع آمنیوتیک تخمرغ‌ها تاثیری بر درصد جوجه‌های تفریخ شده و نسبت وزن جوجه‌های تفریخ شده به وزن تخمرغ نشان نداد ($p > 0.05$). اما در تخمرغ‌های تزریق انجام گرفت، نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخم مرغ در روز ۱۵ جوجه‌کشی یک میلی‌لیتر به مایع آمنیوتیک تخم مرغ‌ها تزریق انجام گرفت. نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخم مرغ در روز ۱۵ انکوباسیون تاثیری بر درصد جوجه‌های تفریخ شده و نسبت وزن جوجه‌های تفریخ شده به وزن تخمرغ نشان نداد ($p > 0.05$). اما در تخمرغ‌های تزریق انجام گرفت، نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخم مرغ در میلیون عصاره بره موم به وزن تخم مرغ شده به اثر تزریق اندکی بیشتر از نظر عددی بود. تزریق داخل تخمرغی سطوح مختلف عصاره بره موم تاثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک، وزن بدن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره‌های بروزرسانی نداشت ($p > 0.05$). نتایج بدست آمدی از آنتی‌بادی‌های تولید شده در اثر تزریق SRBC در ۲۸ روزگی نشان داد گروه‌های دریافت کننده سطوح ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ قسمت در میلیون عصاره بره موم و شاهد مثبت تمایل به کاهش در آنتی‌بادی‌های تولید شده در مقایسه با گروه شاهد منفی داشتند ($p < 0.05$). در حالی که تزریق داخل تخمرغی ۱۵۰ قسمت در میلیون عصاره بره موم سبب افزایش تیتر آنتی‌بادی در مقایسه با تیمارهای دیگر شد ($p < 0.05$). همچنین نتایج مربوط به تیتر آنتی‌بادی‌های تولید شده در اثر تزریق SRBC در ۳۵ روزگی نشان داد در گروه شاهد منفی پایین بود ($p < 0.05$). نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق عصاره بره موم صورت گرفته بود تیتر آنتی‌بادی در مقایسه با گروه شاهد منفی پایین بود ($p < 0.05$). نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق عصاره بره موم بر تخم مرغ‌های بارور در روز ۱۵ انکوباسیون نتوانست سبب بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی شود.

واژه‌های کلیدی: عصاره بره موم، عملکرد رشد، سلول‌های خونی، پاسخ ایمنی، جوجه‌های گوشتی

از رزین‌های درختان و گیاهان جمع‌آوری کرده و در کیسه گرده ذخیره می‌کند. در هنگام جمع‌آوری رزین‌ها، بزاق و سایر ترشحات زنبور و همچنین موم با آن ترکیب می‌شود و سرانجام ماده‌ای رزینی تشکیل شده که تحت عنوان بره موم شناخته می‌شود (۳۴). روغون‌های فرار بره موم دارای فعالیت ضد میکروبی (۳۳)، آنتی‌اکسیدانی و تحریک‌کننده سیستم ایمنی هستند (۱۱). فعالیت ضد میکروبی بره موم به دلیل وجود مقادیر زیاد استرهای کافینات و ترکیبات فلاونوئیدی می‌باشد (۲۵). کوئی چانگوینگ (۳۰) بیان کردند که استفاده از بره موم سبب افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود. گزارش‌های از اثرات مثبت بره موم بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و تلفات در جوجه‌های گوشتی تحت استرس مشاهده شده است (۳۳). با توجه به ویژگی‌های ذکر شده برای بره موم (آنتی‌اکسیدانی، ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ...) تاکنون مطالعات کمی در باره اثرات تزریق داخل تخمرغی بره موم بر وضعیت سیستم ایمنی و عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی گزارش شده است. بنابر این در این تحقیق اثرات تزریق داخل تخمرغی بره موم بر عملکرد رشد و وضعیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه

یکی از اهداف مهم تولید کنندگان جوجه‌های یک روزه و پرورش دهنده‌گان جوجه‌های گوشتی، تولید جوجه‌های با شاخص‌های بهبود یافته از جمله نرخ جوجه در آوری، وزن جوجه یکروزه، کاهش نرخ تلفات، مقاومت در مقابل بیماری‌ها و سرعت رشد مطلوب می‌باشد. همچنین افزایش تولید در دام و طیور مستلزم سالم بودن آمها بوده که این با افزایش قدرت سیستم ایمنی به وسیله انواع محرك‌های بیولوژیکی از طریق جیره یا تزریق امکان‌پذیر می‌باشد (۱۹). تزریق داخل تخمرغی فن‌آوری جدیدی است که توسط یونی و فرکت (۳۶) مطرح شد. در این روش افودنی را برای توسعه جنین به تخم مرغ تزریق می‌کنند. در اوخر دوران جنینی، افودنی تزریق شده به مایع آمنیوتیک، هضم و توسیعه جنین قبل از تفریخ جذب می‌شود (۳۶). تغذیه داخل تخمرغ می‌تواند به بهبود ظرفیت گوارش، افزایش نرخ رشد، بهبود پاسخ ایمنی غذایی، کاهش مرگ و میر پس از تفریخ، بهبود پاسخ ایمنی به آنتی‌زن‌های روده، کاهش بروز اختلالات اسکلتی، رشد و افزایش رشد ماهیچه و عملکرد گوشت سینه منجر شود (۱۳). از افودنی‌های بیولوژیکی که در جیره دام و طیور استفاده می‌شود می‌توان آنتی‌زن‌ها، پروبیوتیک‌ها، مخمرها و بره موم را نام برد (۳۶). بره موم آنتی‌بیوتیکی طبیعی است که زنبور عسل

وزن بدن، جوجه‌ها در پایان هر هفته پس از ۴ ساعت گرسنگی جهت تخلیه دستگاه گوارش توزین شده و میانگین وزنی هر واحد آزمایشی و هر گروه محاسبه گردید. در این پژوهش برای بررسی ایمنی همورال از تست گلوبول قرمز گوسفندي استفاده شد. بدین منظور در روزهای ۲۱ و ۲۸ پرورش مقدار ۱/۰ میلی لیتر از محلول ۲ درصد گلوبول قرمز گوسفندي (SRBC) در بافر فسفات (PBS) با استفاده از سرنگ انسولین به داخل عضله سینه به سه قطعه جوجه از هر تکرار تیمار تزریق شد. برای اندازه‌گیری پاسخ ایمنی همورال در روزهای ۲۸ و ۳۵ پرورش به مقدار ۲ سی‌سی از ورید بال جوجه‌های تزریق شده خونگیری انجام گرفت. پس از لخته شدن نمونه‌های خون، سرم آن‌ها جدا و به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰ سانتی‌لیفیو و برای انجام مراحل بعدی آزمایش در دمای ۲۰-۲۰ درجه سلسیوس نگهداری شدند. برای تعیین تیتر پاسخ کل (IgG + IgM) از روش هماگلوبولیناسیون (۲۰) میکروتیتر استفاده شد. در هنگام قرائت نمونه لگاریتم در مبنای ۲ عکس آخر رقتی که در آن هماگلوبولیناسیون دیده می‌شود به عنوان عیار پادتنی ثبت شد. برای اندازه‌گیری IgM که اجزای پاسخ به SRBC هستند، با جذب‌سازی پادتن مقاوم به مرکاپتاتانول که در حقیقت IgG هست و کسر این مقدار از پاسخ کل می‌توان پادتن حساس به مرکاپتاتانول را بدست آورد که معرف IgM می‌باشد (۱۰). بعد از جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه آماری درصد جوجه‌درآوری، وزن تخم مرغ تفریخ شده و نسبت وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخم مرغ در قالب طرح کاملاً تصادفی و تجزیه آماری SRBC ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن روزانه، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی در قالب طرح اندازه‌گیری‌های مکرر (Measurement Repeat) با استفاده از نرمافزار آماری SAS انجام شد (۳۲). مقایسه میانگین تیمارها برای صفات مورد بررسی با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال آماری ۰/۰۵ / ۰/۰۵ انجام شد (۳۲).

مواد و روش‌ها

در شروع آزمایش، تعداد ۳۲۴ عدد تخم مرغ بارور از سویه گوشتی راس ۳۰۸ با میانگین وزنی ۶۹/۳۵ گرم و در سن ۴۶ هفتگی گله مادر تهیه شد و به طور انفرادی وزن کشی و به صورت تصادفی در ۶ تیمار آزمایشی و هر تیمار دارای ۳ تکرار با ۱۸ مشاهده در قالب طرح کاملاً تصادفی تقسیم شدند. در روز ۱۵ انکوباسیون ابتدا محل مایع آمینوتیک تخم مرغ‌ها با استفاده از روش نوریینی مشخص و سپس یک میلی لیتر از محلول‌های تهیه شده با سرنگ شماره ۲۲ به مایع آمینوتیک تخم مرغ‌های بارور تزریق شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون تزریق)، شاهد با تزریق آب استریل (کنترل منفی)، تزریق محلول ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میلیون عصاره بره موم در ۶۰ میلی لیتر آب استریل به مایع آمینوتیک بود. عصاره روغنی بره موم در این تحقیق به صورت آماده از شرکت تقdis مشهد تهیه شد. پس از اتمام تزریق، محل آن با الکل ضدعفونی شده و با پارافین مسدود شدند. سپس تخم مرغ‌ها دوباره در دستگاه جوجه کشی با دمای هجر ۳۷/۸ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۷۰ درصد قرار داده شدند. در روز تفریخ، جوجه‌های هر گروه آزمایشی شمارش و وزن کشی شده و به سالن پرورشی انتقال داده شدند. برای بررسی عملکرد پس از تفریخ، از هر تیمار که شامل سه تکرار بودند ۱۸ قطعه جوجه وزن شدند و هر تیمار در گروه‌های مشابه برای یک دوره ۶ هفته‌ای پرورش یافتند. پرنده‌گان مورد آزمایش در قفس به طور ردیفی قرار داده شده و تهییه و نور ارایه شدند. تمام جوجه‌ها در تیمارهای مختلف به صورت آزادانه از یک جیره آزمایشی مشترک تغذیه شدند. آب آشامیدنی به طور آزاد در اختیار جوجه‌ها گذاشته شد. مواد تشکیل‌دهنده و مواد مغذی ترکیب جیره آزمایشی بر اساس توصیه انجمن تحقیقات ملی آمریکا NRC 1994 (۲۶) در جدول ۱ ارائه شده است. مصرف خوراک روزانه (روز/ جوجه/گرم) از تفاضل خوراک باقیمانده در آخر هفته مورد نظر از وزن خوراک ابتدای همان هفته محاسبه شد. برای تعیین

جدول ۱- اجزا و ترکیب شیمیایی جوجه‌های گوشتی طبق توصیه NRC (۲۶)
Table 1. The ingredients and nutrients composition of broiler chickens diets

اجزای خوراک (%)	دوره‌های پرورش ۱۰-۱۱-۴۲ روزگی	ترکیب شیمیایی	دوره‌های پرورش ۱۰-۱۱-۴۳ روزگی	دوره‌های پرورش ۱۰-۱۱-۴۲ روزگی
دانه ذرت	۵۸/۵۰	انرژی قابل متabolism (kcal/kg)	۵۸/۸۵	۲۹۱۷/۱
کنجاله سویا	۳۴/۷۵	پروتئین خام (%)	۳۳/۳۵	۲۲/۶۱۴
روغن گیاهی	۲	فسفر قابل دسترس (%)	۲/۵۰	۰/۵۰۱۶
دی کلکسیم فسفات	۱/۸۰	متیونین+ سیستین (%)	۱/۶۰	۰/۸۹۵۹
پودر صدف	۱/۲۵	أرژینین (%)	۱/۱۰	۱/۵۱۸
مکمل ویتامینه	۰/۰۵۷	تریپتوفان (%)	۰/۰۵۲	۰/۳۹۹۷
مکمل معدنی	۰/۰۵۷	سدیم (%)	۰/۰۵۲	۰/۰۵۱۱
دی ال متیونین	۰/۰۲۳	متیونین (%)	۰/۰۱۸	۰/۰۵۸
آل لایزین	۰/۰۱۳	لایزین (%)	۰/۰۱۸	۱/۲۶۳
نمک خوارکی	۰/۰۲	-	۰/۰۲	-

ویتامین A: ۳/۶ گرم، ویتامین B₁: ۰/۰۶ گرم، ویتامین B₂: ۱/۶۵ گرم، ویتامین B₆: ۰/۰۶ گرم، ویتامین B_{۱۲}: ۰/۰۳ گرم، ویتامین D_۳: ۰/۰۰ گرم، ویتامین E: ۷/۲ گرم، ویتامین D_۳: ۰/۰۰ گرم، ویتامین K_۳: ۰/۰۸ گرم، ویتامین B_۹: ۰/۰۲۵ گرم، ویتامین H: ۰/۰۲ گرم، ویتامین B_۶: ۰/۰۰ گرم، منگنز ۳۲ گرم، آهن سولفات ۵۰ گرم، اکسید روی ۲۲ گرم، اکسید مس ۸ گرم، سلنیوم ۴ گرم، کولین کلراید ۲۰۰ گرم، آنتی اکسیدانت ۰/۰۲ گرم.

تریک شده به وزن تخم مرغ جوجه‌های گوشتی در جدول ۲ ارائه شده است.

نتایج و بحث
اثر تریک داخل تخم مرغی بره موم بر صفات جوجه‌درآوری، وزن جوجه تفیریک شده و نسبت وزن جوجه

جدول ۲- مقایسه صفات عملکرد جوجه‌ها در تیمارهای عصاره بره موم (قسمت در میلیون)
Table 2. Comparison of performance characteristics of chicks in oil-extracted propolis treatments (ppm)

P value	SEM	تیمارهای آزمایشی						درصد جوجه درآوری
		۱۲۰۰ ppm بره موم	۶۰۰ ppm بره موم	۳۰۰ ppm بره موم	۱۵۰ ppm بره موم	شاهد منفی	شاهد مثبت	
.۰/۳۳	۴/۸۴	۵۲/۲۷	۶۳/۸۹	۵۶/۸۵	۵۹/۲۶	۵۳/۷۰	۶۶/۰۳	وزن جوجه تفیریک شده
.۰/۳۷	۱/۵۱	۴۳/۷۸	۴۲/۱۹	۴۲/۰۴	۴۰/۰۰	۳۹/۷۷	۴۲/۶۱	نسبت وزن جوجه تفیریک شده به
.۰/۲۵	۲/۳۶	۶۵/۷۵	۶۱/۳۴	۶۲/۹۰	۵۸/۶۹	۵۷/۶۹	۶۲/۱۵	وزن تخم مرغ

حروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۰/۰۵ است.

شده می‌شود. ژای و همکاران (۴۰) با تریک عصاره بره موم به تخم مرغ‌های لگه‌هورن سفید در روز ۱۸ جوجه‌کشی، تاثیری بر وزن جوجه‌های تفیریک شده مشاهده نکرد. اثر تریک داخل تخم مرغی بره موم بر نسبت وزن جوجه‌های تفیریک شده به وزن تخم مرغ نشان داد تریک سطوح مختلف بره موم نسبت به گروه شاهد منفی اثر معنی‌داری نشان نداد. اما گروهی که قسمت در میلیون بره موم دریافت کرده بود افزایش غیرمعنی‌داری در مقایسه با گروه‌های دیگر داشت. یونی و فرکت (۳۷) نشان دادند که تریک داخل تخم مرغی بره موم سبب بهبود نسبت وزن جوجه تفیریک شده به وزن تخم مرغ قبل از تریک شد.

نتایج مربوط به تریک داخل تخم مرغی بره موم بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی در جدول ۳ ارائه است. نتایج نشان داد تریک سطوح مختلف بره موم به تخم مرغ‌های با راور تاثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک در سه بازه زمانی ۱۰-۱۱-۱۱-۱۲ روزگی و کل دوره پرورشی نداشت. تحقیقات نشان داده که استفاده از مقدار ۲۵۰ میلی‌گرم بره موم موجب افزایش مصرف خوارک شده که نشان دهنده عملکرد بهتر جوجه‌های گوشتی است (۱۷). در تحقیقی بونومی و همکاران (۷) با افزودن ۳۰ قسمت در میلیون بره موم به جیره غذایی مرغ‌های تخم‌گذار افزایشی در خوارک مصرفی مشاهده کردند. مطالعه قیصری و همکاران (۱۴) نشان می‌دهد که استفاده از عصاره بره موم سبب افزایش مصرف خوارک جوجه‌های گوشتی می‌شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود تریک عصاره بره موم تاثیر معنی‌داری بر درصد جوجه درآوری جوجه‌های گوشتی در مقایسه با گروه شاهد نداشت. اوهتا و همکاران (۲۷) گزارش کردند که تریک داخل تخم مرغی بره موم سبب کاهش درصد جوجه درآوری در مقایسه با گروه شاهد شده است. یونی و فرکت (۳۶) با تریک داخل تخم مرغی بره موم افزایش معنی‌داری در درصد جوجه درآوری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده کردند. کوسکون و همکاران (۹) بیان کردند که با تریک اسید آمینه‌ها، ویتامین C، کربوهیدرات‌ها و هورمون‌ها درصد جوجه درآوری تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. آیگون و همکاران (۴) گزارش کردند که تریک داخل تخم مرغی عصاره بره موم تاثیری بر درصد جوجه درآوری بلدچین‌های ژاپنی نداشت. پوررضا و همکاران (۳۹) بیان کردند که دقت و مهارت همراه با سرعت عمل بالا در مراحل تریک داخل تخم مرغی از عوامل تأثیرگذار بر درصد جوجه درآوری می‌باشد. یونی (۳۵) اعتقاد داشتند که تریک برخی مواد مغذی به داخل تخم مرغ سبب عدم تعادل مواد مغذی تخم مرغ در طی انکوباسیون شده و بدین ترتیب سبب کاهش رشد و توسعه جنین و در نهایت مرگ جنین می‌شوند. نتایج حاصل از تریک سطوح مختلف بره موم به تخم مرغ‌های با راور تاثیری بر وزن جوجه‌های تفیریک شده داشت. کادام و همکاران (۲۱) نشان دادند که تغذیه جنینی با عصاره بره موم، می‌تواند وزن جوجه‌های تفیریک شده را بهبود بخشد. همچنین در این راستا نیز یونی و فرکت (۳۷) گزارش کردند که تریک داخل تخم مرغی بره موم سبب افزایش وزن جوجه‌های تفیریک

بررسی اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد رشد و وضعیت سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. ۴

جدول ۳- اثر تزریق عصاره بره موم به تخم مرغ بر عملکرد رشد در دوره‌های مختلف پرورشی

Table 3. Effect of in ovo of oil-extracted propolis on growth performance in different periods of rearing

P value	SEM	تیمارهای آزمایشی						صرف خوارک (روز/جوچه/گرم)
		۱۲۰ ppm بره موم	۶۰۰ ppm بره موم	۳۰۰ ppm بره موم	۱۵۰ ppm بره موم	شاهد مثبت	شاهد منفی	
.۰/۱۹	۳/۲۳	۷۲/۶۱	۶۵/۲۶	۶۳/۴۳	۶۲/۸۰	۷۲/۲۶	۶۷/۹۰	دوره ۱۰-۱۱ روزگی
.۰/۴۱	۲۷/۳۸	۴۸/۱۰	۴۹/۷۳	۴۰/۸۴	۴۱/۵	۴۵/۶۸	۴۲/۱۸	دوره ۱۱-۱۲ روزگی
.۰/۷۳	۵۴/۵۶	۷۰/۰۵	۶۱/۱۶	۶۰/۴۹	۶۸/۵۷	۶۶/۳۶	۶۲۵/۷	کل دوره
					وزن بدن (گرم)			
.۰/۲۷	۲۶/۶۰	۲۶۰/۴	۲۶۲/۵	۲۵۵/۷	۲۳۴/۲	۱۹۹/۷	۲۹۵/۳	دوره ۱۰-۱۱ روزگی
.۰/۳۱	۱۶۵/۵۸	۱۷۶/۱	۱۴۶۸/۱	۱۵۰/۵۴	۱۳۳۵/۳	۱۶۳۳/۷		دوره ۱۱-۱۲ روزگی
.۰/۳۴	۲۳۰/۹۷	۲۴۸۹/۹	۲۱۴۸/۶	۲۱۹۰/۹	۲۰۵۴/۸	۱۱۶۷/۵	۲۴۰/۰۳	کل دوره
					افزایش وزن روزانه (روز/جوچه/گرم)			
.۰/۱۷	۲/۹۱	۳۱/۵	۳۳/۱	۳۱/۱	۲۷/۲	۲۶/۶	۳۷/۴	دوره ۱۰-۱۱ روزگی
.۰/۴۳	۵/۸۷	۶۱/۹	۵۶/۵۴	۶۳/۵۳	۶۸/۸۳	۵۸/۹۱	۷۲/۲۲	دوره ۱۱-۱۲ روزگی
.۰/۵۱	۴/۰۳	۴۷/۹۶	۵۰/۰۸	۵۰/۰۵	۵۲/۹۵	۴۵/۱۳	۵۶/۱۳	کل دوره
					ضریب تبدیل غذایی			
.۰/۲۹	۰/۳۳	۲/۳۲	۱/۹۷	۲/۰۴	۲/۴۸	۲/۸۹	۱/۸۲	دوره ۱۰-۱۱ روزگی
.۰/۳۲	۰/۲۱	۱/۹۸	۱/۷۹	۱/۹۱	۲/۹	۲/۵۰	۱/۷۸	دوره ۱۱-۱۲ روزگی
.۰/۵۴	۰/۲۹	۱/۹۷	۱/۹۵	۱/۲۹	۲/۴۴	۲/۴۰	۱/۷۹	کل دوره

حروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۵ است

فسفولیپاز A₂ و سیکلواکسیژنаз می‌تواند از افزایش التهاب و ضخامت روده ناشی از میکروب‌های مضر بکاهد و از این طریق سبب بهبود هضم و جذب مواد خوارکی در روده شود در نتیجه آن عملکرد رشد نیز بهبود یابد. در گزارشی نشان داده شده است دوزهای بالا از عصاره بره موم در انسان موجب افزایش پروتئین‌های سطح سلولی و گونه‌های واکنش‌پذیر اکسیژن‌زد و از طرفی سطح پتانسیل غشای میتوکندریایی کاهش می‌یابد که با سیگنال‌های واسطه‌ی پروتئین سلولی، آپوپتوز یا مرگ سلولی رخ می‌دهد (۱۸). نتایج بدست آمده از تاثیر عصاره بره موم بر ضریب تبدیل خوارک نیز نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخم مرغ‌های بارور تاثیری بر ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی در دوره‌های ۱۰-۱۱ روزگی، ۱۱-۱۲ روزگی و کل دوره پرورشی نداشت. در گزارشی استفاده از ۲۵۰ میلی‌گرم بره موم در جیره موجب بهبود در ضریب تبدیل خوارک در جوجه‌های گوشتی شده است (۱۷). مقایر با نتایج این تحقیق رودسری و همکاران (۳۱) گزارش کردند که مکمل کردن بره موم در جیره جوجه‌های گوشتی سبب بهبود ضریب تبدیل خوارک نسبت به گروه شاهد می‌شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود تزریق بره موم به تخم مرغ‌های بارور اثری بر افزایش وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشتی در دوره ۱۰-۱۱ روزگی، ۱۱-۱۲ روزگی و کل دوره نداشت. در حالی که تزریق آب مقطر (شاهد مثبت) به تخم مرغ‌ها اثر کاهشی بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه نسبت به گروه شاهد منفی داشت. همچنان گروهی که قسمت در میلیون بره موم تزریق شده بود کاهش غیرمعنی‌داری نسبت به گروه شاهد منفی نشان داد. خجسته و شیوازاد (۲۲) گزارش کردند که افروزن عصاره اتانولی بره موم در جیره غذایی، میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشتی را در کل دوره آزمایشی تحت تاثیر قرار داد. تزریق داخل تخم مرغی و بیوتامین سبب افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در سن ۲۸-۱۴ روزگی گردید (۶). اندرسون و همکاران (۲) گزارش کردند که استفاده از ۵ درصد عصاره بره موم سبب افزایش وزن جوجه‌های گوشتی شده است. آنیا و همکاران (۳) گزارش کردند که استفاده از عصاره بره موم در جیره جوجه‌های گوشتی سبب بهبود وزن بدن گردید. عزیززاده و همکاران (۵) بیان کردند که عصاره بره موم به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی سبب کاهش میکروفلورای مضر روده شده و همچنین با کاهش فعالیت

جدول ۴- تأثیر مقادیر مختلف عصاره بره موم بر میزان عیار anti-SRBC، ایمونوگلوبولین G (IgG) و M (IgM) در چicks (log₂)

P value	SEM	تیمارهای آزمایشی						Anti- SRBC
		۱۲۰ ppm بره موم	۶۰۰ ppm بره موم	۳۰۰ ppm بره موم	۱۵۰ ppm بره موم	شاهد مثبت	شاهد منفی	
.۰/۰۶	.۰/۳۶	۳/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	۴/۳۳	۳/۰۰	۴/۰۰	۲۸ روزگی
.۰/۰۳	.۰/۳۰	۳/۳۳ ^{ab}	۲/۶۶ ^b	۳/۶۶ ^{ab}	۳/۳۳ ^{ab}	۳/۰۰ ^b	۴/۳۳ ^a	۳۵ روزگی
.۰/۳۰	.۰/۳۳	۱/۳۳	۱/۳۳	۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۶۶	۱/۰۰	۲۸ روزگی
.۰/۶۶	.۰/۴۳	۱/۶۶	۱/۶۶	۲/۰۰	۱/۳۳	۱/۰۰	۱/۳۳	۳۵ روزگی
.۰/۳۶	.۰/۵۴	۱/۶۶	۱/۶۶	۲/۰۰	۲/۲۳	۱/۳۳	۳/۰۰	۲۸ روزگی
.۰/۰۱	.۰/۳۰	۱/۶۶ ^b	۱/۰۰ ^b	۱/۶۶ ^b	۲/۰۰ ^b	۲/۰۰ ^a	۳/۰۰ ^a	۳۵ روزگی

حروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۵ است

سبب افزایش غلظت ایمینوگلوبولین G نسبت به گروه شاهد می‌شود (۴۱۸). گیورگی و همکاران (۱۵) بیان کردند که استفاده از بره موم در جوجه‌های گوشته سبب افزایش سیستم ایمنی می‌شود. در مطالعه دیگر کوئی چانگووینگ و همکاران (۳۰) گزارش کردند که افزودن بره موم به جیره غذایی سیستم ایمنی جوجه‌های گوشته را افزایش می‌دهد. فلاونوئیدها که یکی از ترکیبات بره موم می‌باشند که سبب تحریک تولید آنتی‌بادی در جوجه‌های گوشته می‌شود (۱۶). در تحقیق مشاهده شده است که استفاده از بره موم سبب تقویت ایتنترلوکین ۱، ۲، ۳ شده و این نیز می‌تواند سبب افزایش تولید آنتی‌بادی‌ها شود (۲۸). قیصری و همکاران (۱۴) بیان کردند که عدم تاثیرگذاری بره موم در پاسخ سیستم ایمنی احتمالاً به دلیل سطوح کم استفاده شده باشد.

نتیجه‌گیری می‌شود که تزریق داخل تخمرنگی عصاره بره موم در سطوح مختلف تاثیری بر مصرف خوارک، وزن بدن، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد جوجه‌درآوری، وزن جوجه‌های تفریخ شده و وزن جوجه‌های تفریخ شده به وزن تخمرنگ جوجه‌های گوشته در دوره‌های ۱-۱۰ روزگی، ۱۱-۴۲ روزگی و کل دوره در شرایط این تحقیق نداشت. اما استفاده از سطوح ۱۲۰۰ قسمت در میلیون عصاره بره موم توانست سبب بهبود وزن بدن و وزن جوجه‌های تفریخ شده به وزن تخمرنگ نسبت به گروه شاهد مثبت شود. نتایج مربوط به تیتر آنتی‌بادی‌های تولید شده در اثر تزریق SRBC در ۲۸ روزگی نشان داد آنتی‌بادی‌های تولید شده در گروه‌های دریافت کننده سطوح ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ قسمت در میلیون عصاره بره موم اثر کاهشی در مقایسه با گروه شاهد (منفی) داشته است. همچنین نتایج مربوط به تیتر آنتی‌بادی‌های تولید شده در اثر تزریق SRBC در ۳۵ روزگی نیز نشان از اثر کاهشی در گروه‌های تزریق شده از عصاره بره موم در مقایسه با گروه شاهد (منفی) داشت.

نتایج مربوط به تزریق SRBC در زمان‌های ۲۱ و ۲۸ بعد از تزریق بر میزان عیار آنتی‌بادی، IgG و IgM در زمان‌های ۲۸ و ۳۵ روز بعد از تفریخ در جدول ۴ نشان داده است. تزریق داخل تخمرنگی ۱۵۰ قسمت در میلیون عصاره بره موم اثر معنی‌داری در تیتر آنتی‌بادی‌های تولید شده علیه SRBC در زمان ۲۸ داشت ($p < 0.06$). در حالی که تزریق SRBC به ورید جوجه‌های گوشته نشان داد تخمرنگ‌های که ۱۵۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ قسمت در میلیون بره موم تزریق شده بود آنتی‌بادی‌های کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند ($p < 0.05$). نتایج مربوط به تاثیر تزریق داخل تخمرنگی عصاره بره موم در طی انکوباسیون نشان داد که غلظت ایمینوگلوبولین‌های G در زمان‌های ۲۸ و ۳۵ روز بعد از تفریخ تحت تاثیر سطوح تزریق شده بود مقارن نگرفتند. همچنین نتایج نشان داد که غلظت ایمینوگلوبولین M در گروه‌های که تزریق در آن‌ها صورت گرفته بود غلظت کمتری در زمان ۳۵ از خود نشان دادند. گلbul‌های قرمز خون گوسفندی (SRBC) یک آنتی‌زن واپسنه به سلول‌های T است به طوری که هنگام وارد شدن به بدن، نیازمند همکاری سلول‌های T برای فعال سازی سلول‌های B و در نتیجه آن تولید آنتی‌بادی است. تزریق داخل رگی SRBC، تیتر آنتی‌بادی بالاتری را نسبت به تزریق عضلانی نشان می‌دهد و همچنین با افزایش درصد SRBC و دوز تزریق، تیتر آنتی‌بادی بالاتری تولید می‌شود (۳۹). قیصری و همکاران (۱۴) نشان دادند که استفاده از عصاره بره موم در جیره جوجه‌های گوشته‌ای تاثیری بر غلظت آنتی‌بادی‌های تولید شده ناشی از تزریق SRBC نداشت. انگ و همکاران (۱۲) با بررسی ۱ الی ۴ درصد عصاره بره موم در جیره جوجه‌های گوشته نشان دادند که سطوح اضافه شده نتوانست محركی برای سیستم ایمنی بدن باشد. برخی مطالعات نیز نشان می‌دهد که استفاده از عصاره بره موم در جوجه‌های گوشته

منابع

- Alitaneh, S., N. Afzali, H. Sarir and H. NaeimiPour. 2017. Screening for effects of different levels of Ajowan (*Carum Copticum L.*) and Coriander (*Coriandrum Sativum L.*) seeds on performance and carcass characteristics of Ross broiler chickens. Research on Animal Production, 7(14): 21-32 (In Persian).
- Anderson, P. and S. Palmbaha. 1970. Effect of aqueous alcohol emulsion and oil extract of propolis on the growth of chicks. Akad Rak, 25: 124-146.
- Attia, Y.A., A.E.A. Al-Hamid, M.S. Ibrahim, M.A. Al-Harthi, F. Bovera and A.S.H. Elnaggar. 2014. Productive performance, biochemical and hematological traits of broiler chickens supplemented with propolis, bee pollen, and mannan oligosaccharides continuously or intermittently. Livestock Science, 164: 87-95.
- Aygun, A. 2016. The effects of *in-Ovo* injection of propolis on egg hatchability and starter live performance of Japanese quails. Brazilian Journal of Poultry Science, 18(2): 83-89.
- Azizzadeh, N.R., S. Forag, L. Mousa and M.A. Abo-Zaid. 1998. Comparative antibacterial and antifungal effects of some phenolic compounds. Microbios, 93: 43-54.
- Bhanja, S.K., A.B. Mandal, S.K. Agraval, S. Majumdar and A. Bhattacharyya. 2007. Effect of *in Ovo* injection of vitamins on the chick weight and post-hatch growth performance in broiler chickens. Central Avian Research Institute, 243: 122-131.
- Bonomi, A., F. Marletto and F. Binachi. 1976. Propolis in feeds for laying hens. Avicoltura, 54: 43- 54.
- Çetin, E., S. Silici, N. Çetin and B.K. Güçlü. 2010. Effects of diets containing different concentrations of propolis on hematological and immunological variables in laying hens. Poultry Science, 89: 1703-1708.
- Coskun I., H. Cayan, O. Yilmaz, A. Taskin, E. Tahtabican and H.H. Samli. 2014. Effects of *in-ovo* pollen extract injection to fertile broiler eggs on hatchability and subsequent chick weight. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1: 485-489.
- Delhanty, J.J. and J.B. Salomon. 1966. The nature of antibodies to goat erythrocytes in the developing chicken. Journal of Immunology, 11: 103-113.

11. Dimov, V., N. Ivanovska, N. Manolova, V. Bankova, N. Nikolov and S. Popov. 1991. Immunomodulatory action of propolis. Influence on anti infectious protection and macrophage function. *Apidologie*, 22: 155-162.
12. Eyng, C., A.E. Murakami, T.C. Santos, T.G. Silveira, R.B. Pedroso and D.A. Lourenço. 2015. Immune responses in broiler chicks fed propolis extraction residue-supplemented diets. *Asian Austria Journal Animal Science*, 28: 135-142.
13. Ferket, P.R. 2006. Incubation and *in ovo* nutrition affects neonatal development, 33rd Annual Carolina Poultry Nutrition Conference, September 26, 2006, Sheraton Imperial Hotel, North Carolina.
14. Gheisari, A., S. Shahrvand and N. Landy. 2017. Effect of ethanolic extract of propolis as an alternative to antibiotics as a growth promoter on broiler performance, serum biochemistry and immune responses. *Veterinary World*, 10: 249-254.
15. Giurgea, R., H. Popescu, C. Polinicencu and D. Copreanu. 1982. Effect of standardized propolis extracts on the central lymphatic system and the immunological reactions of chickens. *Clujul Medical*, 55: 72-75.
16. Goodwin, J.S. and D.R. Webb. 1980. Regulation of the immune response by prostaglandins. *Clinical Immunology and Immunopathology*, 15: 106-122.
17. Haghshian Roudsari, M., M. Mehdizadeh, F. Bagherzadeh, H. Lotfollahian, F. Mousavi and A.H. Abolghasemi. 2005. Effect of oil-extracted peropolis on the performance of broiler chicks. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 18:57-65.
18. Hongzhuan, X., Z.H. Jing, M. Junying, L. Yajing, C.H. Yafang and H. Fuliang. 2011. Effect of Brazilian propolis on human umbilical vein endothelial cell apoptosis. *Food and Chemical Toxicology*. 49: 78-85.
19. Hosseini Nashli, S.M., F. Moslemipur, S. Maehsoudlou and M. Kazemi Fard. 2017. The Effects of Saturea and Thyme Medicinal Plants with or without Enzyme on Performance, Blood Parameters in Broiler Chickens. *Research on Animal Production*, 8(16): 70-78 (In Persian).
20. Isakov, N., M. Feldmann and S. Segel. 2005. The mechanism of modulation of humoral immune responses after injection of mice with SRBC. *Journal Immunology*, 128: 969-975.
21. Kadam, M.M., M.R. Barekatain, S.K. Bhanja and P.A. Iji. 2013. Prospects of *in ovo* feeding and nutrient supplementation for poultry: the science and commercial applications-a review. *Journal of Science Food Agriculture*, 93: 3654-3661.
22. Khojasteh Shalman, S. and M. Shivaazad. 2006. The effect of diet propolis supplementation on Ross broiler chick performance. *International Journal Poultry Science*, 5: 84-88
23. Kupczynski1, R., M. Adamski, D. Falta and A. Roman. 2012. The efficiency of propolis in postcolostral dairy calves. *Archiv Tierzucht*, 55: 315-324.
24. Mehdizadeh, S.M., J. PorReza, A. Jokar, H. Lotfollahian and G. Tahmasebi. 2005. Effect of propolis on performance and immune response of laying hens. *Pajouhesh & Sazandegi*, 64: 85-89 (In Persian).
25. Mohammadzadeh, S., M. Sharatiapanahi, M. Hamed, R. Ahmadkhaniha, N. Samadi and S.N. Ostad. 2007. Chemical composition of oral toxicity and antimicrobial activity of Iranian propolis. *Food Chemistry*, 3: 1097-1103.
26. NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev. Ed. Washington D.C: National Academy press.
27. Ohta, Y. and M.T. Kidd. 2001. Optimum site for *in ovo* propolis injection in broiler breeder eggs. *Poultry Science*, 80: 1425-1429.
28. Park, Y.K., J.F. Paredes-Guzman, C.L. Aguiar, S.M. Alencar and F.Y. Fujiwara. 2004. Chemical constituents in *Baccharis dracunculifolia* as the main botanical origin of southeastern Brazilian propolis. *Journal Agriculture Food Chemistry*, 52: 1100-1103.
29. Pourreza, J. and A. Karimi. 1998. Incubation. Publications Department of Education and Agriculture Organization of Economic Research Kosar.
30. Quichanqoing, L. 1995. Study of the persistent period of immunity and un-activated propolis adjuvant vaccine against the egg drop syndrome in hen. Veterinary Research Institute, CAAS, Lan Zou, China.
31. Roodsari, M.H., M. Mehdizadeh, F.B. Kasmani, H. Lotfollahian, F. Mosavi and A.H. Abolghasemi. 2004. Effects of oil-extracted propolis on the performance of broiler chicks. *Agriculture Science Technology*, 18: 57-65.
32. SAS Institute. 2003. SAS User's Guide. Statistics. Version 9.1 ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
33. Seven, I., T. Aksu and P. Tatlı Seven. 2007. Propolis ve hayvanecalmed kullanımı, İstanbul Üniveristesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18: 79-84.
34. Sforcin, J.M. and V. Bankova. 2011. Propolis: Is there a potential for the development of new drugs. *Journal of Ethnopharmacology*, 133: 253-260.
35. Uni, Z. 2014. The effects of *in-ovo* feeding [cited 2016 Jan 8]. Available from: <http://www.thepoultryfederation.com/public/userfiles/files/Zehava%20Uni%20Presentation.pdf>.
36. Uni, Z. and P.R. Ferket. 2003. Enhancement of development of oviparous species by *in ovo* feeding. US Regular Patent US 6,592,878. North Carolina State Univ., Raleigh and Yissum Res. Dev. Co. of the Hebrew Univ. Jerusalem, Jerusalem, Israel.
37. Uni, Z. and R.P. Ferket. 2004. Method for early nutrition and potential. *World's Poultry Science Journal*.
38. Uni, Z., P.R. Ferket, E. Tako and O. kedar. 2005. *In ovo* feeding improves energy status of late-term chicken embryos. *Poultry Science*, 84: 764-770.
39. Van Der Zip, W. 1980. Clostridial enteritis is an often underestimated problem. *International World Poultry*, 16: 42.
40. Zhai, S., L. Neumoan, M.A. Latour and P.Y. Hester. 2006. The effect of *in ovo* injection of propolis on hatch rate and body weight of white leghorns. *Poultry Science*, 85: 146-151.
41. Ziaran, H.R., H.R. Rahmani and J. Pourreza. 2005. Effect of dietary oil extract of propolis on immune response and broiler performance. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 8: 1485-1490.

The Effects of *in Ovo* Injection Oil-Extracted Propolis on Growth Performance and Immune Status of Broilers

Sahel Bakhshayesh¹, Jamal Seifdavati², Sayyad Seifzadeh³, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh⁴, Hosein Abdi Benmar⁴ and Vahid Vahedi⁵

1, 3, 4 and 5- Graduated M.Sc. Student, PhD Student in Animal Nutrition, Associate Professor and Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili

2- Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili

Received: May 17, 2017

Accepted: February 21, 2018

Abstract

The purpose of this study was to determine the effects of *in-ovo* injection of oil-extracted propolis on the growth performance and immune status of broiler chicks (Ross 308) after hatching. A total of 324 fresh hatching eggs were randomly distributed into six treatment groups of 54 eggs per treatment with three replicates of 18 eggs each. Treatments included sham as negative control (without injection), positive control with sterile water injection, and *in ovo* injection 4 levels (150, 300, 600 and 1200 ppm) of oil- extracted propolis solution prepared in 60 ml of sterile water, one ml into site of the embryo in sac of amniotic fluid into eggs at the 15th day of incubation. The results showed that propolis extract injected into eggs at day 15 of incubation did not show effect on hatchability, body weight and weight of the hatched chicks hatched egg weight ($p>0.05$). But in eggs, which injected 1200 ppm of oil-extracted propolis, the ratio of the weight of hatched chicks to egg weight was more numerically than the control group. Ovo injection levels of oil-extracted propolis were no significant on feed intake, body weight, average daily gain and feed conversion ratio in total rearing periods among treatments. The results obtained of the antibodies produced by the injection of SRBC at 28 days showed that groups receiving levels 300, 600 and 1200 ppm oil-extracted propolis and positive control had a tendency to decrease in antibodies produced in compared with the negative control group ($P<0.06$). While *in ovo* injection of 150 ppm of oil-extracted propolis increased the antibody titer compared with other treatments ($p<0.05$). Also the results of titer antibodies produced by the injection of SRBC in 35 days also showed the effect of decreasing in propolis extract injected groups compared with the control group ($p<0.05$). The results show that *in-ovo* injection of propolis oil extract on day 15 of incubation fertilized eggs could not improve growth performance and immune system of broiler chickens.

Keywords: Propolis extract, Growth performance, Blood cells, Immune response, Broiler chickens