



تأثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین بر جوجه‌درآوری، عملکرد رشد و کیفیت گوشه‌های گوشتی راس ۳۰۸

سمیه امیدی^۱، مرضیه ابراهیمی^۲، حسین جانمحمدی^۳، حسین تقی‌بور^۴
سیده‌هادی پیغمبردوست^۵ و حمیدرضا قاسم‌زاده^۶

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فنی‌بوزی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
(mailto:marzebrahami@tabrizu.ac.ir)
- ۲- استادیار فنی‌بوزی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
- ۳- استاد تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
- ۴- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
- ۵- استاد تکنولوژی غلات، گروه طیور و صایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
- ۶- استاد مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی، گروه مهندسی بیوپسیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
- تاریخ دریافت: ۹۸/۲/۲۸
تاریخ پذیرش: ۹۸/۳/۱۲
- صفحه: ۷۸ تا ۶۹

چکیده

پژوهش‌های پیشین تأثیر مثبت مکمل خوارکی آرژنین بر بهبود کیفیت گوشت و رشد را نشان داده‌اند، با این حال پژوهشی در مورد تأثیر تزریق درون تخم مرغی آرژنین بر کیفیت گوشت وجود ندارد. بنابراین، این آزمایش با هدف بررسی تأثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین بر جوجه‌های گوشتی راس انجام شد. در این پژوهش، ۳۰۰ تخم مرغ بارور از مزرعه مرغ مادر گروشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار آزمایشی (غلظت‌های ۰/۵ و ۱ درصد آرژنین و شاهد کل) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل ۱- تزریق درون تخم مرغی ۰/۵ درصد اسید آمینه ال-آرژنین، ۲- تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد اسید آمینه ال-آرژنین، ۳- گروه شاهد کل {مجموع شاهد اول (تزریق آب استریل) و شاهد دوم (بدون تزریق)} بودند و تزریق در روز ۱۴ دوره جوجه‌های تیمارهای آرژنین و گروه شاهد کل هر یک به چهار گروه مساوی تقسیم شده و در چهار قفس (تکرار) به صورت تصادفی قرار داده شدند. دوره پرورش از زمان تولد تا ۲۴ روزگی ادامه یافت. به‌منظور بررسی کیفیت گوشت، در روز ۲۴ تعداد ۳ قطعه جوجه از هر تکرار (۱۲ جوجه در هر تیمار) وزن کشی و کشتار شدند و ماهیچه سینه‌ای به منظور بررسی صفات کیفی گوشت استفاده شدند. بر اساس نتایج، تأثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین بر وزن جوجه، افزایش وزن روزانه، مصرف خوارک، ضریب تبدیل غذایی، وزن نسبی لاشه پوست کنده و ماهیچه سینه‌ای معنی دار نبود ($p > 0.05$). اگرچه pH گوشت، درصد چربی گوشت، درصد خاکستر و شاخن‌های رنگ گوشت (a^* , b^* , L^* و pH) تحت تأثیر تیمارهای تزریق درون تخم مرغی ال-آرژنین قرار نگرفتند ($p > 0.05$)، آب‌اندازی گوشت، مقدار D و شاخص C به طور معنی داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند ($p < 0.05$). بر اساس نتایج کلی پژوهش حاضر، تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین نتوانست تأثیر معنی دار قابل توجهی بر عملکرد رشد، تولید و یا ترکیب گوشت جوجه‌های گوشتی ۲۴ روزه داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ال-آرژنین، تزریق درون تخم مرغی، کیفیت گوشت، جوجه گوشتی

می‌دهد و موجب سفتی گوشت می‌شود (۱۲). کاهش سریع تر pH سبب تغییر شکل^۳ میوزین می‌شود. تغییر شکل سریع میوزین، ظرفیت نگهداری آب را پایین اورده و رنگ‌پریدگی گوشت را در پی دارد (۱۲). انتخاب برای وزن بدن و تولید ماهیچه سینه‌ای موجب کاهش محتوای گلیکوژن ماهیچه سینه‌ای و افزایش pH آن شده است (۱۰). نشان داده شده است که کاهش قطر فیبرهای ماهیچه‌ای با سفتی بالاتر در گوشت همراه است (۲۶). بین pH و رنگ گوشت همبستگی بالایی وجود دارد؛ به طوری که pH بالای گوشت موجب تیره‌شدن رنگ گوشت می‌شود (۲۱). این در حالی است که به طور کلی پذیرفته شده است که کاهش pH افزایش روشنی گوشت را در پی دارد (۲۱). همچنین ماهیچه سینه‌ای پرنده‌گانی با رشد سریع تر روش‌تر (L^* بالاتر) است (۱۰). از سوی دیگر، چارتین و همکاران (۱۱) گزارش کردند با افزایش چربی ماهیچه زردی و روشنی گوشت افزایش می‌یابد. تعدادی از پژوهش‌ها با تزریق درون تخم مرغی مواد غذایی بهبود رشد و کیفیت گوشت را در طیور گزارش کردند. تزریق درون تخم مرغی اسید‌اسکوربیک موجب بهبود بازده خوارک و

مقدمه

به‌دلیل این که در روند اصلاح ژنتیکی جوجه گوشتی، تنها به افزایش تولید ماهیچه (گوشت) توجه شده است، کیفیت گوشت تولیدی تا حدودی کاهش یافته است؛ بنابراین، شناسایی یک روش طبیعی برای بهبود تولید کمی و کیفی گوشت از اهمیت بالایی برخوردار است. عوامل گوناگونی بر کیفیت گوشت اثر می‌گذارند. بعد از کشتار، متabolism غیرهوایی pH ماهیچه را از $7/2$ به $5/8$ کاهش می‌دهد و جمود نعش رخ می‌دهد. سرعت جمود نعش بر تمام مراحل تولید اثر می‌گذارد (۲۲). فیبرهای گلایکولایتیک^۴ دارای جمود نعش سریع تری هستند. جمود نعش در گوشت ماهیچه سینه‌ای جوجه گوشتی در حدود یک ساعت تکمیل می‌شود (۱۳). سرعت رشد بر سرعت جمود نعش اثر می‌گذارد. مشخص شده است که کمبود پروتئین، افزایش pH را در پی دارد (۳۸). کاهش سریع pH در درجه حرارت‌های بالا، سیستم کالپین (پروتئازهای سلول‌های ماهیچه‌ای که مسؤول افزایش تردی ماهیچه پس از مرگ هستند) را از کار می‌اندازد، تردی پس از مرگ را کاهش

مواد و روش‌ها

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژین بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی راس ۳۰۸ انجام شد. در این پژوهش، سه نمونه تخم مرغ بازور از مزرعه مرغ مادر گوشتی با سن گله ۲۷ هفته تهیه شد. تخم مرغ‌ها بر اساس وزن طبقه‌بندی شده و در وزن‌های یکسان به تیمارها اختصاص داده شدند به طوری که ۱۰۰ تخم مرغ در گروه تیمار ۵/۰ درصد آرژین، ۱۰۰ تخم مرغ در گروه تیمار ۱ درصد آرژین، ۱۰۰ تخم مرغ در گروه شاهد کل ۵۰ تخم مرغ در گروه شاهد اول و ۵۰ تخم مرغ در گروه شاهد دوم) اختصاص داده شده و سپس تخم مرغ‌ها در دستگاه جوجه‌کشی قرار داده شدند. بنابراین گروه‌های آزمایشی شامل ۱- تزریق درون تخم مرغی ۵/۰ درصد اسید‌آمینه ال-آرژین (۵ میلی‌گرم ال-آرژین در میلی‌لیتر آب استریل)، ۲- تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد اسید‌آمینه ال-آرژین (۱۰ میلی‌گرم ال-آرژین در میلی‌لیتر آب استریل)، ۳- گروه شاهد کل (مجموع شاهد اول (تزریق آب استریل به تهیه) و شاهد دوم (بدون تزریق)) بودند و تزریق در روز ۱۴ دوره انکوباسیون انجام شد. دما و رطوبت و چرخش طبقات دستگاه جوجه‌کشی به صورت روزانه کنترل می‌شد. در زمان تزریق به درون تخم مرغ، ابتدا تخم مرغ‌ها با استفاده از نوریینی بررسی شدند تخم مرغ‌هایی که نطفه نداشتند یا جینین آن‌ها مرده بود حذف شدند و در تخم مرغ‌های سالم محدوده کیسه هوایی با استفاده از مداد علامت‌گذاری گردید. سپس به‌وسیله پنهان‌الکل محدوده تزریق ضد عقوفونی شده و به‌وسیله سوزن مخصوص در ۳ الی ۴ میلی‌متری بالای مرز کیسه هوایی منفذ ایجاد شده و تزریق انجام شد. در مرحله بعد، سطح منفذ ایجاد شده در تخم مرغ با پنهان‌الکل ضد عقوفونی شده و با چسب مسدود شد. سپس تخم مرغ‌ها به دستگاه جوجه‌کشی انتقال داده شدند. در ۳ روز آخر دوره جوجه‌کشی دمای دستگاه روی ۳۷ درجه سانتی‌گراد و رطوبت آن روی ۷۰ درصد تنظیم شده و تخم مرغ‌ها به سبدهای مخصوص هچری انتقال داده شدند. قبل از تفريخ تخم مرغ‌ها، ابتدا سالن جوجه‌های گوشتی واقع در ساختمان متابولیسم پرندگان در ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی خلعت پوشان (واقع در ۷ کیلومتری جاده تبریز- باسمنج) تمیزسازی شد و تعمیر قفس‌ها و بستن منافذ آن به منظور جلوگیری از خروج جوجه از قفس انجام شد. پیش از ورود جوجه‌ها دمای سالن به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسانده شد. پس از تفريخ تخم مرغ‌ها، جوجه‌های تازه هج شده وزن کشی شدند. همچنین درصد نیز شکسته شدند و بر اساس مرحله رشد، زمان تلفات جینین آنها رکوردداری. سپس جوجه‌های تیمارهای غلظت‌های ۰/۵ و ۱ درصد ال-آرژین و گروه شاهد کل (مجموع جوجه‌های شاهد اول و شاهد دوم) هر یک به چهار گروه مساوی تقسیم شده و در چهار قفس (تکرار) به صورت تصادفی قرار داده شدند (۳ تیمار با ۴ تکرار). دوره پرورش از زمان تولد تا

تولد بالاتر ماهیچه سینه‌ای در روز ۴۵ دوره پرورش شد (۴۴). در یک مطالعه تزریق درون تخم مرغی پریوتیک و سینبیوتیک اثری بر چربی شکمی و همچنین pH و کلسترول ماهیچه سینه‌ای نداشت، اما ضریب تبدیل خوارک، ماهیچه سینه‌ای و قطره فیبرهای ماهیچه‌ای را افزایش و کلارن ماهیچه و تولید لاشه را کاهش یافت، این در حالی است که تغییرات هیستوپاتولوژیکی مضاری بر ماهیچه سینه‌ای و کیفیت گوشت نداشت (۴۱). همچنین در پژوهشی دیگر تزریق درون تخم مرغی گلوکز موجب بهبود مصرف خوارک، ضریب تبدیل خوارک، نرخ رشد و ماندگاری بالاتر ازت شد و افزایش تردی گوشت، آبداری و طعم گوشت ماهیچه سینه‌ای را به‌همراه داشت (۲۹). تزریق درون تخم مرغی اسیدهای آمینه موجب افزایش وزن و مصرف خوارک در اردک شد (۲۳). در پژوهشی دیگر، تزریق درون تخم مرغی کراتین پپروات (ترکیب آلی که دارای کراتین و پپروپاکسید است) اثری بر pH، رنگ گوشت، آب‌اندازی گوشت و نیروی برش آن نداشت، با این حال موجب افزایش بالاتر وزن، مصرف خوارک و قطره میوفیریل‌های ماهیچه جوجه‌های گوشتی شد (۴۵).

آرژین یک اسید‌آمینه ضروری در طیور است که به صورت عادی در مواد خوارکی موجود است (۸). تعدادی از آزمایش‌ها با افزودن آرژین به جیره غذایی افزایش وزن، ماهیچه سینه‌ای، افزایش قطره فیبرهای ماهیچه‌ای، روشی گوشت، محتوای چربی درون ماهیچه‌ای و تردی گوشت را به‌همراه افزایش ظرفیت نگهداری آب گوشت نشان داده‌اند (۵، ۶، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۷، ۳۰، ۴۲). بر اساس پژوهش‌های پیشین، مصرف خوارکی آرژین موجب افزایش محتوای چربی، پروتئین و گلیکوژن ماهیچه شده است (۴۰، ۱۶). همچنین ابراهیمی و همکاران (۱۵) گزارش کردند که افزایش مقدار آرژین جیره غذایی جوجه‌های گوشتی موجب کاهش pH و نیروی برش گوشت ماهیچه سینه‌ای شده است. سایر پژوهش‌ها با تزریق درون تخم مرغی آرژین بهبود وزن، عملکرد رشد و تولید گوشت بالاتر را نشان دادند (۱)، ۳، ۲، ۱۸، ۲۴. تعدادی از عملکردهای مهم آرژین بهمنظور بهبود کیفیت گوشت شامل بهبود سرعت رشد، افزایش قطره میوفیریل‌ها، افزایش تعداد سلول‌های ماهواره‌ای در طی دوره جینی و افزایش محتوای چربی درون ماهیچه‌ای است که مکانیسم آن از طریق فعال کردن سیستم نیتریک اکسیدستاز و همچنین بهبود هورمون‌ها (هورمون رشد و هورمون رشد شب‌های انسولینی) (۱) و افزایش ساخت پلی‌آمین‌ها انجام می‌شود (۸). بنابراین با توجه به موارد اشاره شده انتظار می‌رود تزریق درون تخم مرغی آرژین بتواند بهبود کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی را موجب شود. از این رو و با توجه به نبود پژوهشی بهمنظور بررسی تاثیر تزریق درون تخم مرغی آرژین بر کیفیت لاشه، در پژوهش حاضر تاثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژین بر جوجه‌دارآوری، عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی بررسی شد.

جوچه‌درآوری با هر دو شیوه آزمون فیشر و رویه GLM نرم‌افزار 9.2 SAS (۳۷) آنالیز شد.

مدل آماری پژوهش حاضر به شرح ذیل بود:

$$Y_{ijk} = \mu + T_i + S_j + b (Y_{ijk} - \bar{Y}_{000}) + e_{ijk}$$

(تیمارها)
(اثر جنس)
j= 1, 2
k= 1- 12

به طوری که Y_{ijk} : λ مین مشاهده با λ مین جنسیت در λ مین تیمار؛ T_i : میانگین جمعیت؛ S_j : تیمارهای مختلف؛ b : اثر جنس؛ e_{ijk} : ضریب تابعیت خطی Y از وزن تخم مرغ‌ها؛ \bar{Y}_{000} : وزن تخم مرغ‌ها؛ λ : خطای تصادفی یا باقی مانده.

نتایج و بحث جوچه‌درآوری

تلفات جینی در مراحل مختلف جوچه‌کشی در جدول ۲ گزارش شده است. بر اساس نتایج جوچه‌درآوری، درصد جوچه‌درآوری در گروه شاهد اول ۲۸ درصد، در گروه شاهد دوم ۴۸ درصد، در گروه تزریق درون تخم مرغی ۰/۵ درصد آرژین ۴۹ درصد و در گروه تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد آرژین ۴۰ درصد مشاهده شد و تفاوت درصد جوچه‌درآوری بین گروه‌ها با استفاده از هر دو نوع آنالیز آماری معنی‌دار نبود ($p > 0.05$). برخلاف نتایج پژوهش حاضر، شماری از پژوهش‌ها با تزریق درون تخم مرغی آرژین بهبود درصد جوچه‌درآوری را گزارش کردند. ابراهیمی و همکاران (۱۸) گزارش کردند تزریق درون تخم مرغی نسبت‌های مختلف آل-آل-آرژین به ل-ل-آرژین به طور معنی‌داری بر قابلیت جوچه‌درآوری اثر گذاشت و بالاترین درصد جوچه‌درآوری در نسبت ۹۰/۷ درصد آرژین به ل-ل-آرژین مشاهده شد. آل-دراجی و همکاران (۳) با تزریق ۰/۵ میلی‌لیتر محلول ۱، ۲ و ۳ درصد آل آرژین بیشترین نرخ جوچه‌درآوری را در پی داشته است. همچنین ادوارد و همکاران (۱۹) با تزریق ۱۰ و ۱۵ میلی‌گرم آل آرژین در ۱۰۰ میکرولیتر آب مقطمر در روز ۹ جوچه‌کشی به مایع آمنیوتیک تخم مرغ بهبود جوچه‌درآوری را مشاهده کردند. دلیل تلفات زیاد بعد از ۱۴ روزگی ۱۲ ساعت قطعی بر قریب می‌باشد که به طور معنی‌داری تلفات را در روزهای آخر جوچه‌درآوری (۱۹ و ۲۰ روزگی) افزایش داد.

عملکرد رشد، وزن جوچه و وزن ماهیچه سینه‌ای

بر اساس نتایج وزن جوچه یکروزه، وزن جوچه ۱۰ روزه، وزن جوچه ۲۴ روزه، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و همچنین وزن نسبی لашه پوست کنده و وزن نسبی ماهیچه سینه‌ای هیچ یک تحت تاثیر تیمارهای تزریق درون تخم مرغی آل-آل-آرژین قرار نگرفتند ($p > 0.05$)، (جدول ۳). مخالف با نتایج پژوهش حاضر، گانو و همکاران (۲۴) با تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد آرژین افزایش جوچه یک روزه و همچنین افزایش وزن تا ۷ روزگی را گزارش کردند. ابراهیمی و همکاران (۱۸) با تزریق درون

انتهای ۲۴ روزگی در سالن پرورش طیور در ایستگاه آموزشی-پژوهشی خلعت پوشان دانشگاه تبریز ادامه یافت. در دوره پرورش همگی جوچه‌های گروه‌های آزمایشی جبره یکسانی را بر اساس جداول احتیاجات غذایی راس ۳۰۸ در طی دوره آغازین از یک الی ۱۰ روزگی و دوره رشد از ۱۱ الی ۲۴ روزگی دریافت کردند (جدول ۱).

دسترسی به آب به صورت آزاد و برنامه نوردهی در بردارنده ۲۳ ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی بود. وزن جوچه‌ها در روزهای ۱۰ و ۲۴ به صورت گروهی اندازه‌گیری شد و مصرف خوراک در پایان ۱۰ و ۲۴ روزگی اندازه گیری شدند و افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی برای کل دوره به صورت خوراک روزانه و گزارش شد. همچنین در روز ۲۴ آزمایش تعداد ۳ قطعه جوچه از هر تکرار (۱۲) جوچه در هر تیمار) با میانگین وزن نزدیک متوسط وزن گروه انتخاب و کشتار شدند. سپس وزن لاشه پوست کنده و وزن ماهیچه سینه‌ای اندازه گیری شده و وزن نسبی آنها به وزن بدن جوچه زنده محاسبه شد. به منظور بررسی کیفیت گوشت، از نمونه‌های گوشت ماهیچه سینه‌ای سمت راست استفاده شد. رنگ گوشت ماهیچه سینه‌ای (گوشت تازه و گوشت ۲۴ ساعت نگهداری شده در شرایط یخچال) با دستگاه رنگ‌سنج (مینوتلتا CR-400) ساخت (زاپن) اندازه گیری شد. برای مشخص شدن مقدار عددی رنگ، نمونه‌ها در نزدیک‌ترین فاصله به مرکز تابشی دستگاه قرار داده شد و نتایج به صورت a^* به عنوان شاخص قرمزی، b^* به عنوان شاخص زردی و L^* به عنوان شاخص روشنی گوشت گزارش شدند. همچنین زاویه رنگ (h)، مشخصه رنگ (c) و تفاوت رنگ (D) با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه و گزارش شدند:

$$h = \arctan(b^*/a^*)$$

$$c = (a^{*2} + b^{*2})^{1/2}$$

$$D = [(L^* - L^*)^2 + (a^* - a^*)^2 + (b^* - b^*)^2]^{1/2}$$

L^* : میانگین روشنی کترل، a^* : میانگین قرمزی کترل، b^* : میانگین زردی کترل، L^* : میانگین روشنی تیمار ۰/۵ یا ۱ درصد آرژین، a^* : میانگین قرمزی تیمار ۰/۵ یا ۱ درصد آرژین، b^* : میانگین زردی تیمار ۰/۵ یا ۱ درصد آرژین.

هر نمونه با ۱۵ بار تکرار مورد پژوهش قرار گرفت و متوسط این مقادیر برای آنالیز آماری داده‌ها استفاده شد. pH گوشت ۲۴ ساعت پس از کشتار با روش AOAC (۷) و با استفاده از pH متر (دیجیتال مترونوم ۸۲۷) ساخت کشور سوئد) انجام شد. برای اندازه گیری آب اندازی گوشت و تعیین مقدار شیرابه تولیدی از روش ساتماهایاک و همکاران (۳۶) استفاده شد. همچنین درصد چربی یا عصاره اتری نمونه‌های ماهیچه سینه‌ای و درصد خاکستر ماهیچه اندازه گیری و گزارش شدند (۷).

در پایان داده‌ها با استفاده از رویه GLM نرم‌افزار SAS 9.2 (۳۷) آنالیز شدند و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی-کرامر انجام شد. همچنین نتایج به صورت میانگین حداقل مربعات ± خطای استاندارد گزارش شدند.

بالای آرژین موجب بهبود عملکرد رشد، وزن جوجه‌های گوشتی و افزایش وزن ماهیچه سینه‌ای شده است (۵، ۱۴). مونیر و همکاران (۳۲) گزارش کردند که افزودن ۲ درصد آرژین به خوارک جوجه‌های گوشتی از ۱ روزگی و در طول دوره پرورش، باعث افزایش وزن بدن در جوجه‌ها شد. بنابراین به نظر می‌رسد که اثرهای مثبت تزریق درون تخم مرغی آرژین بر رشد، تنها در جوجه یکروزه قابل مشاهده باشد و این اثرهای مثبت ممکن است نتواند تا ۲۴ روزگی ادامه پیدا کند. از این رو تغذیه غلظت‌های بالای آرژین در طی دوره پرورش می‌تواند از ادامه روند رشد حمایت بیشتری کند.

تخم مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژین به ال-لایزن افزایش وزن جوجه یک روزه و وزن ماهیچه سینه‌ای را گزارش کردند. عبدالعلی زاده الونق و همکاران (۱) گزارش کردند تزریق درون تخم مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژین به ال-لایزن اثر افزایش دهنده بر وزن جوجه، وزن نسبی لاشه پوست‌کنده و وزن نسبی ماهیچه سینه‌ای داشت. از سوی دیگر، خو و همکاران (۴۳) با افزایش سطح آرژین جیره، افزایش وزن بدن را در ۲۴ و ۴۲ روزگی به همراه افزایش غلظت هورمون رشد، فاکتور رشد شباهنسولینی ۱ (IGF-I) و انسولین سرم را گزارش کردند. همچنین تغذیه غلظت‌های

جدول ۱- اجزاء و ترکیب مواد مغذی جیره آغازین و رشد جوجه‌های گوشتی (بر اساس ماده خشک)

Table 1. Ingredient composition and nutrient concentrations of the starter and grower diets (on a dry matter basis)

ترکیب جیره	دوره رشد (۳۴-۱ روزگی)	دوره آغازین (۱۰-۱ روزگی)
ذرت	۵۸/۶	۵۱/۵
گلوتن	۲/۵	۱
سوپا	۲۹/۸	۳۸/۶
پودر ماهی	۴	۲/۵
روغن	۰/۸	۱/۴
دی‌کلسیم‌فسفات	۱/۷۵	۲
کربنات‌کلسیم	۱/۱	۱/۲
نمک	۰/۱۷	۰/۱۸
جوش‌شیرین	-	۰/۰۶
مکمل ویتامین و مواد معدنی	۰/۵	۰/۶
متیوین	۰/۳۲	۰/۳۳
لیزین	۰/۲۷	۰/۲۵
D3 ویتامین	-	۰/۱
E ویتامین	-	۰/۱
کولین کلراید	-	۰/۰۸
ضدکوکسیدیبور	۰/۰۵	۰/۰۵
ضدقارچ	۰/۰۵	۰/۰۵
ترکیب مواد مغذی جیره پایه		
انرژی (کیلو کالری در کیلوگرم)	۳۰۵۰	۳۰۰۰
پروتئین کل (درصد)	۱۹/۵	۲۱/۵
لیزین (درصد)	۱/۱	۱/۳۳
متیوین (درصد)	۰/۵۲	۰/۰۵۵
فسفر قابل دسترس (درصد)	۰/۴۵	۰/۵
کلسیم (درصد)	۰/۹	۱

جدول ۲- اثر تزریق درون تخم مرغی سطوح مختلف ال- آرژینین بر جوچه در اوری
Table 2. The effect of *in ovo* injection of different levels of L-arginine on hatchability

وضیعت‌های مختلف						
تیمار	تلفات قبل از ۱۴ روزگی	تلفات بعد از ۱۴ روزگی	زنده	بدون نطفه	کل	
شاهد اول	۳	۲۶	۱۴	۷	۷	۵۰
	۱/۰۰	۸/۶۷	۴/۶۷	۲/۲۳	۱۶/۶۷	۵۰
	۶/۰۰	۵۲/۰۰	۲۸/۰۰	۱۴/۰۰	۳۲/۳۳	۱۶/۶۷
شاهد دوم	۹/۳۸	۲۱/۶۷	۱۱/۰۲	۳۳/۳۳	۵	۵۰
	۱/۳۳	۵/۶۷	۸/۰۰	۱/۶۷	۱/۰۰	۱۶/۶۷
	۸/۰۰	۳۴/۰۰	۴۸/۰۰	۲۳/۸۱	۱۸/۹۰	۲۳/۸۱
ترزیق ۰/۵ درصد آرژینین	۱۲/۵۰	۱۴/۱۷	۱۸/۹۰	۴	۴	۱۰۰
	۳/۲۳	۱۲/۳۳	۱۶/۳۳	۱/۳۳	۴/۰۰	۳۳/۳۳
	۱۰/۰۰	۳۷/۰۰	۴۹/۰۰	۱۹/۰۵	۲۸/۵۸	۱۹/۰۵
ترزیق ۱ درصد آرژینین	۳/۱۲۵	۳۰/۸۳	۲۸/۵۸	۵	۴۰	۱۰۰
	۱/۵	۴۰	۴۰	۱/۶۷	۱۲/۳۳	۱/۶۷
	۱۵/۰۰	۴۰/۰۰	۴۰/۰۰	۵/۰۰	۱۲/۳۳	۵/۰۰
کل	۴۶/۸۸	۳۳/۳۳	۳۱/۵۰	۲۳/۸۱	۵/۰۰	۳۳/۳۳
	۱۰/۵۷	۴۰/۰۰	۷/۰۰	۷/۰۰	۴۰/۰۰	۱۰۰/۰۰

در هر ستون داده‌ها به ترتیب از بالا به پایین شامل تعداد، درصد کل، درصد در هر تیمار و درصد در هر ستون می‌باشد.

آب‌اندازی ماهیچه سینه‌ای

آب‌اندازی گوشت به طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ($p<0.01$)، (جدول ۳). بر اساس نتایج، تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد آرژینین موجب افزایش درصد آب‌اندازی گوشت به مقدار $144/4/4$ درصد نسبت به گروه شاهد کل و $139/0/7$ درصد نسبت به گروه تزریق درون تخم مرغی ۰/۵ درصد آرژینین شد (گروه تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد آرژینین آب‌اندازی بیشتری نشان داد)، این در حالی است که تفاوت معنی‌داری بین گروه شاهد کل و تیمار ۰/۵ درصد آرژینین از نظر آب‌اندازی مشاهده نشد. مخالف با نتایج پژوهش حاضر، گو و همکاران (۲۵) گزارش کردند که تقدیم $\frac{1}{1}$ ٪ آرژینین و $\frac{1}{1}$ ٪ CLA در خوک تاثیری بر از دست‌ترفتن آب گوشت آرژینین با مصرف $1\text{ g}/\text{kg}$ در ۲۴ ساعت بعد از کشتار گزارش کردند. ماهیچه‌ای را در ۲۴ ساعت بعد از کشتار گزارش کردند. گزارش شده است که کاهش سریع pH موجب تغییر شکل میوزین و پایین‌آمدن ظرفیت نگهداری آب می‌شود (۱۲). بنابراین به نظر می‌رسد افزایش آب‌اندازی در گروه تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد آرژینین به دلیل pH پایین‌تر در این گروه است. این در حالی است که در گروه تزریق درون تخم مرغی ۰/۵ درصد آرژینین pH در حدی نبوده است که بتواند بر آب‌اندازی گوشت تاثیر منفی بگذارد.

چربی و خاکستر ماهیچه سینه‌ای

بر اساس نتایج، تاثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال- آرژینین بر درصد چربی و خاکستر ماهیچه سینه‌ای معنی‌دار نبود ($p>0.05$)، (جدول ۳). مخالف با نتایج پژوهش حاضر، ابراهیمی و همکاران (۱۶) با بالابردن سطح آرژینین چیره غذایی چوچه‌ای گوشتی اثر افزایش دهنده و معنی‌دار آرژینین را بر چربی ماهیچه سینه‌ای و همچنین بیان ژن‌های لیپوژنیک بافت ماهیچه گزارش کردند، در حالی که

pH ماهیچه سینه‌ای

در پژوهش حاضر، اگر چه تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال- آرژینین تاثیر معنی‌داری بر pH گوشت نداشت، pH گروههای تیماری ۰/۵ و ۱ درصد آرژینین نسبت به گروه شاهد کل روند کاهشی نشان داد ($P=0.08$)، (جدول ۳). پژوهش‌های مشابه با تقدیم جوچه‌های گوشتی با درصددهای مختلف آرژینین (۱۶۸، ۱۰۰، ۱۵۳ و ۱۸۳ درصد آرژینین قابل هضم بر اساس توصیه غذایی کمپانی راس)، کاهش pH گوشت ماهیچه سینه‌ای را در ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت پس از کشتار گزارش کردند (۱۴). این در حالی است که ما و همکاران (۳۰) با مصرف $1\text{ g}/\text{kg}$ در ۰/۵ درصد آرژینین در جیره خوک‌ها تاثیری بر pH گوشت مشاهده نکردند. در جیره خوک‌ها تاثیری بر pH گوشت مشاهده نکردند. همچنین گو و همکاران (۲۵) گزارش کردند که $\frac{1}{1}$ ٪ آرژینین و $\frac{1}{1}$ ٪ CLA در خوک تاثیری بر pH ۴۵ دقیقه و ۴۸ ساعت بعد از کشتار گوشت نداشته است. از سوی دیگر، تن و همکاران (۴۰) با مصرف ۱ درصد آرژینین افزایش pH گوشتی خوک گزارش کردند. با توجه به این که تن و همکاران (۴۰) با مصرف آرژینین، افزایش گلیکوژن ماهیچه را گزارش کردند؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش آرژینین در پژوهش حاضر ممکن است با افزایش محتوای گلیکوژن ماهیچه‌ای، همراه بوده و موجب کاهش pH ماهیچه‌ای شده است. همچنین مشخص شده است که کمبود پروتئین، افزایش pH را در پی دارد (۳۸)؛ بنابراین در پژوهش حاضر ممکن است افزایش آرژینین با افزایش پروتئین، کاهش pH را ایجاد کردد است. پژوهش‌های پیشین اهمیت pH گوشت را در مقدار فساد میکروبی نشان داده‌اند (۳۵). pH پایین گوشت موجب افزایش ماندگاری گوشت می‌شود (۴)، بنابراین انتظار می‌رود این کاهش pH در اثر تزریق درون تخم مرغی آرژینین، موجب افزایش ماندگاری گوشت شود.

نبود تاثیر معنی دار تزریق غلظت‌های مختلف ال-آرژین بر شاخص قرمزی، مشابه با نتایج مشاهده شده توسط جیانو و همکاران (۲۷) و ما و همکاران (۳۰) بود که اثری از مکمل آرژین بر قرمزی (a*) گوشت مشاهده نکردند. این در حالی است که ابراهیمی و همکاران (۱۵) افزایش شاخص قرمزی گوشت ماهیچه سینه‌ای را با افزایش آرژین جیره گزارش کردند.

در پژوهش حاضر، تزریق غلظت‌های مختلف ال-آرژین بر شاخص زردی گوشت بی تاثیر بود که مشابه با نتایج ابراهیمی و همکاران (۱۵) و جیانو و همکاران (۲۷) بود که اثری از افزودن سطح آرژین خوارکی بر شاخص زردی گوشت مشاهده نکردند.

از سوی دیگر، روشنی گوشت تحت تاثیر تزریق غلظت‌های مختلف ال-آرژین قرار نگرفت که مخالف با نتایج ابراهیمی و همکاران (۱۵) و جیانو و همکاران (۲۷) بود که افزایش روشنی را با افزایش آرژین جیره مشاهده کردند.

به طور کلی، عوامل گوناگونی مانند جیره و pH بر رنگ گوشت اثر می‌گذارند (۳۴). بر طبق پژوهش سیموئر (۳۹) روشنایی پایین با افزایش محتوای چربی درون ماهیچه‌ای همراه است. از سوی دیگر، بین pH و رنگ گوشت همبستگی بالایی وجود دارد؛ به طوری که pH بالای گوشت موجب تیره شدن رنگ گوشت می‌شود (۲۱). این در حالی است که به طور کلی پذیرفته شده است که کاهش pH افزایش روشنی گوشت را در پی دارد (۲۱). همچنین ماهیچه سینه‌ای پرنگ‌گانی با رشد سریع تر، روشن‌تر (L^* بالاتر) است (۱۰)؛ به طوری که سرعت رشد بالا با کاهش ذخیره رنگدانه، افزایش روشنی گوشت را در پی دارد (۳۳). بنابراین تزریق درون تخم مرغی آرژین به دلیل این که تاثیر معنی داری بر افزایش وزن نداشت، نتوانست تاثیر معنی داری بر بیشتر شاخص‌های رنگ گوشت بدگذرد.

بر اساس نتایج کلی پژوهش حاضر اگرچه آباندازی گوشت، تفاوت رنگ و مشخصه رنگ گوشت تحت تاثیر تیمارهای تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژین قرار گرفتند، بیشتر شاخص‌های وزنی و کیفی گوشت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. بنابراین تزریق درون تخم مرغی آرژین نتوانست تاثیر مثبت و ماندگاری بر شاخص‌های وزنی و کیفی گوشت تا ۲۴ روزگی داشته باشد.

تشکر و قدر دانی

بدین‌وسیله از همکاری جناب آقای دکتر غلامعلی مقدم، دکتر صادق علیجانی و دکتر مجید علیانی در طی انجام این پروژه تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین نویسنده‌گان قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز اعلام می‌دارند.

خاکستر تحت تاثیر آرژین قرار نگرفت. همچنین، وو و همکاران (۴۲) با مصرف آرژین در اردک، افزایش چربی درون ماهیچه‌ای را گزارش کردند. ما و همکاران (۳۰) با مصرف ۱ درصد آرژین در چیره خوک‌ها افزایش محتوای چربی داخل ماهیچه‌ای را گزارش کردند. تن و همکاران (۴۰) در پژوهش مشابهی افزایش محتوای چربی ماهیچه گزارش کردند. بنابراین، اگرچه مصرف خوارکی آرژین موجب بهبود چربی ماهیچه‌ای شده است، تزریق درون تخم مرغی آرژین نتوانست آثار مثبت مشابه با تعذیب غلظت‌های بالای آرژین در طی دوره رشد را داشته باشد.

نیروی برش ماهیچه سینه‌ای

نتایج آزمایش حاضر نشان داد تاثیر تزریق غلظت‌های مختلف ال-آرژین بر نیروی برش ماهیچه سینه‌ای معنی دار نبود (۰/۰۵ $p <$)، با این حال کاهش عددی نیروی برش در تیمار ۰/۰۵ درصد آرژین مشاهده شد (جدول ۳). ابراهیمی و همکاران (۱۵، ۱۴) گزارش کردند که افزایش آرژین در چیره غذایی جوجه‌های گوشتی کاهش نیروی برش را در پی دارد. همچنین جیانو و همکاران (۲۷) نشان دادند که با افزایش آرژین، نیروی برش کاهش یافت. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که کاهش سریع pH، سیستم کالپاین را غیرفعال می‌کند و تردی گوشت را کاهش می‌دهد (۱۲). این در حالی است که کاهش مناسب pH موجب تردی بالاتر گوشت می‌شود (۹). همچنین آثار مثبت افزایش چربی ماهیچه بر تردی نشان داده شده است (۱۱). وازنر و همکاران (۴۱) نشان دادند که افزایش چربی درون ماهیچه‌ای با افزایش فاصله بین بافت‌های پیوندی از غلظت کلاژن بافتی کاسته و بهصورت غیرمستقیم تردی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نشان داده شده است که قطر کمتر فیبرهای ماهیچه‌ای با سختی بالاتری در گوشت همراه است (۲۶). این در حالی است که افزایش قطر فیبرهای ماهیچه‌ای با افزایش آرژین خوارکی گزارش شده است (۲۰). با توجه به موارد گفته شده کاهش عددی نیروی برش در تیمار تزریق درون تخم مرغی ۰/۰۵ درصد آرژین را می‌توان به افزایش محتوای چربی درون ماهیچه‌های در این گروه، کاهش مناسب pH و یا افزایش احتمالی قطر میوپیفرها در این گروه مربوط دانست.

رنگ گوشت

تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر شاخص‌های رنگ گوشت در زمان کشتار (a*, b*, C, L*) و ۲۴ ساعت پس از کشتار (a*, a*, b*, b*, L*) نداشتند (۰/۰۵ $p <$)، (جدول ۳). شاخص C یا مشخصه رنگ ۲۴ ساعت پس از کشتار به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها کاهش یافت (۰/۰۵ $p <$) و بیشترین کاهش در تیمار ۰/۰۵ درصد آرژین مشاهده شد (جدول ۳). مقدار D یا تفاوت رنگ در زمان کشتار در تیمار تزریق درون تخم مرغی ۱ درصد آرژین بیشتر از تیمار تزریق درون تخم مرغی ۰/۰۵ درصد آرژین و ۲۴ ساعت پس از کشتار این مقدار در گروه ۱ درصد آرژین کمتر از تیمار تزریق درون تخم مرغی ۰/۰۵ درصد آرژین بود (جدول ۳).

جدول ۳- تأثیر تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، وزن بدن و کمیت و کیفیت گوشت ماهیچه سینه‌ای جوجه‌های گوشتی ۲۴ روزه

Table 3. The effect of different levels of L-arginine *in ovo* injection on growth performance, body weight and quantity and quality of breast meat in 24-day-old broiler chickens

P-value	تزریق درون تخم مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین			صفات مورد اندازه‌گیری
	تزریق ۱/ درصد آرژنین	تزریق ۵/ درصد آرژنین	شاهد کل	
.۰/۷۶	۳۸/۷۶±۰/۴۱	۳۹/۶۷±۰/۳۸	۳۹/۳۱±۰/۴۲	وزن جوجه یک روزه (گرم)
.۰/۹۵	۲۱۹/۴۵±۰/۱۸	۲۲۶/۷۷±۰/۸۸	۲۱۸/۵۰±۰/۲۰	وزن جوجه ۱ روزه (گرم)
.۰/۶۳	۸۳۰/۰۳±۰/۲۴	۸۲۱/۴۴±۰/۲۴	۸۵۴/۶۴±۰/۲۴	وزن جوجه ۲۴ روزه (گرم)
.۰/۴۲	۳۱/۵۷±۰/۱۰	۳۱/۸۶±۰/۱۰	۳۳/۴۷±۰/۱۰	افزایش وزن روزانه ۱-۲۴ روزگی (گرم)
.۰/۰۸	۶۲/۷۹±۰/۲۷	۵۴/۴۳±۰/۲۷	۶۶/۲۷±۰/۲۷	صرف خواراک ۱-۲۴ روزگی (گرم)
.۰/۱۰	۱/۸۳±۰/۰۶	۱/۶۳±۰/۰۶	۱/۷۷±۰/۰۶	ضریب تبدیل غذایی ۱-۲۴ روزگی
.۰/۹۴	۷۱/۷۹±۰/۰۵	۷۱/۵۲±۰/۰۵	۷۱/۶۴±۰/۰۵	وزن نسبی لاشه پوست‌کنده (درصد)
.۰/۱۴	۲۴/۴۰±۰/۳۰	۲۴/۰۸±۰/۳۰	۲۳/۵۵±۰/۳۰	وزن نسبی ماهیچه سینه‌ای به وزن بدن (درصد)
.۰/۰۸	۶/۱۰±۰/۰۵	۶/۲۲±۰/۰۵	۶/۲۴±۰/۰۵	pH گوشت ۲۴ ساعت پس از کشتار
<۰/۰۱	۲/۹۹±۰/۱۹ ^a	۲/۱۵±۰/۲۰ ^b	۲/۰۷±۰/۲۰ ^b	آباندازی گوشت ۲۴ ساعت پس از کشتار (درصد)
.۰/۷۵	۱۷/۹۳±۰/۴۳	۲۰/۴۹±۰/۵۶	۱۸/۳۲±۰/۵۶	چربی ماهیچه بر اساس ماده خشک (درصد)
.۰/۰۹	۴/۶۷±۰/۱۱	۴/۳۳±۰/۱۳	۴/۶۵±۰/۱۰	خاکستر بر اساس ماده خشک (درصد)
.۰/۱۶	۷/۴۰±۰/۴۳	۶/۴۶±۰/۰۴	۷/۸۸±۰/۰۸	نیترو برش (نیوتون)
				رنگ گوشت بالا فاصله پس از کشتار
.۰/۵۵	۱۶/۷۴±۰/۶۶	۱۶/۲۹±۰/۷۲	۱۵/۷۲±۰/۶۶	قرمزی گوشت (a*)
.۰/۷۲	۲۰/۷۹±۰/۷۰	۲۰/۹۸±۰/۷۷	۲۱/۵۷±۰/۷۰	زردی گوشت (b*)
.۰/۶۰	۵۷/۶۲±۰/۱۸	۵۷/۱۰±۰/۸۹	۵۸/۷۱±۰/۸۱	روشنی گوشت (L*)
.۰/۹۷	۲۶/۸۳±۰/۶۴	۲۶/۶۱±۰/۷۰	۲۶/۸۰±۰/۶۴	C
.۰/۴۲	۰/۸۹±۰/۰۳	۰/۹۱±۰/۰۳	۰/۹۴±۰/۰۳	H
	۲/۲۲	۱/۹۴		D
				رنگ گوشت ۲۴ ساعت پس از کشتار
.۰/۵۶	۱۷/۴۵±۰/۵۷	۱۶/۵۷±۰/۶۲	۱۶/۸۴±۰/۵۷	قرمزی گوشت (a*)
.۰/۱۳	۲۰/۹۹±۰/۵۷	۲۰/۲۴±۰/۶۲	۲۱/۹۸±۰/۵۷	زردی گوشت (b*)
.۰/۳۹	۵۸/۷۰±۰/۸۲	۵۸/۲۵±۰/۹۰	۵۹/۸۶±۰/۸۲	روشنی گوشت (L*)
.۰/۰۲	۲۶/۹۹±۰/۳۶ ^{ab}	۲۶/۱۹±۰/۳۹ ^b	۲۷/۸۰±۰/۳۶ ^a	C
.۰/۵۰	۰/۸۸±۰/۰۲	۰/۸۸±۰/۰۳	۰/۹۲±۰/۰۲	H
	۱/۶۵	۲/۲۷		D

*: داده‌ها شامل میانگین حداقل مربعات ± خطای استاندارد می‌باشند.
b: میانگین‌های با حروف متفاوت در هر سطر اختلاف معنی‌داری به لحاظ آماری دارند (p < 0/05).

منابع

- Abdolalizadeh Alvanagh, F., M. Ebrahimi and H. Daghigh Kia. 2017. Effect of in ovo injection of different L-arginine to L-lysine ratios on body growth, muscle production, and blood metabolite concentrations of day old Ross broilers Iranian Journal of Animal Science, 48: 207-217 (In Persian).
- Al-Daraji, H.J., A.A. Al-Mashadani, W.K. Al-Hayani, A.S. Al-Hassani and H.A. Mirza. 2011. Influence of in ovo injection of L-arginine on productive and physiological performance of quail. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, 1: 463-467.
- Al-Daraji, H.J., A.A. Al-Mashadani, W.K. Al-Mashadani, A.S. Al-Hassani and H.A. Mirza. 2012. Effect of in ovo injection with L-arginine on productive and physiological traits of Japanese quail. South African Journal of Animal Science, 42: 139-145.
- Allen, C.D., S.M. Russell and D.L. Fletcher. 1997. The Relationship of Broiler Breast Meat Color and pH to Shelf-Life and Odor Development. Poultry Science, 76: 1042-1046.
- Ansari Pirsaraei, Z., A. Rahimi, H. Deldar, A.J. Sayyadi, M. Ebrahimi, A. Zareh Shahneh, M. Shivazad and M. Tebianian. 2018. Effect of feeding arginine on the growth performance, carcass traits, relative expression of lipogenic genes, and blood parameters of Arian broilers. Brazilian Journal of Poultry Science, 20: 363-370.
- Ansari Pirsaraei, Z., M. Ebrahimi, A. Zare Shahneh, M. Shivazad and M. Tebianian. 2015. Determination of the best dietary level of L-arginine on improving growth performance, carcass traits and blood parameters in broiler chickens in the starter and grower periods. Research on Animal Production, 6: 87-95 (In Persian).
- Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 1984. Official Methods of Analysis. 14th edn. (Arlington, VA, Association of Official Analytical Chemists).
- Ball, R.O., K.L. Urschel and P.B. Pencharz. 2007. Nutritional consequences of interspecies differences in arginine and lysine metabolism. The Journal of Nutrition, 137: 1626S-1641S.
- Barbut, S. 1993. Colour measurements for evaluating the pale soft exudative (PSE) occurrence in turkey meat. Food Research International, 26: 39-43.
- Berri, C., N. Wacrenier, N. Millet and E. Le Bihan-Duval. 2001. Effect of selection for body composition on muscle and meat characteristics of broilers from experimental lines. Poultry Science, 80: 833-838.
- Chartrin, P., K. Meteau, H. Juin, M.D. Bernadet, G. Guy, C. Larzul, H. Remignon, J. Mourot, M.J. Duclos and E. Baéza. 2006. Effects of intramuscular fat levels on sensory characteristics of duck breast meat. Poultry Science, 85: 914-922.
- Dransfeld, E. 1994. Modelling post-mortem tenderization-V: Inactivation of calpains. Meat Science, 37: 391-409.
- Dransfeld, E. and A.A. Sosnicki. 1999. Relationship between muscle growth and poultry meat quality. Poultry Science, 78: 743-746.
- Ebrahimi, M., A. Zare Shahneh, M. Shivazad and Z. Ansari Pirsaraei. 2015. Evaluation of 24 days feeding L-arginine on performance, meat quality and blood metabolites in broilers. Animal Science Researches, 25: 61-72 (In Persian).
- Ebrahimi, M., A. Zare Shahneh, M. Shivazad, Z. Ansari Pirsaraei and M. Ghafari Balesini. 2016. The effects of dietary L-arginine on some parameters of meat quality, intestine histology and immune system of 46-d old broiler chickens. Animal Science Researches, 26: 81-94 (In Persian).
- Ebrahimi, M., A. Zare Shahneh, M. Shivazad, Z. Ansari Pirsaraei, M. Tebianian, C.A. Ruiz-Feria, M. Adibmoradi, K. Nourijelyani, F. Mohamadnejad. 2014a. The effect of feeding excess arginine on lipogenic gene expression and growth performance in broilers. British Poultry Science, 55: 81-88.
- Ebrahimi, M., A. Zare Shahneh, M. Shivazad, Z. Ansari Pirsaraei, M. Tebianian, M. Adibmoradi, K. Nourijelyani. 2014b. The effects of dietary L-arginine on growth, meat production, and fat deposition in broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science Researches, 5: 281-290 (In Persian).
- Ebrahimi, M., F. Abdolalizadeh Alvanagh, M. Adibmoradi, H. Jammohammadi and Z. Rajabi. 2018. The impact of in ovo feeding with different L- arginine to L- lysine ratios on small intestine histological characteristics and immune system organs in day-old chicks. Animal Science Researches, 28: 177-191 (In Persian).
- Edwards, N.M., N.D. Heberle and P.I. Hynd. 2016. The effect of in ovo administration of L-arginine on the hatchability and embryological development of broiler chicks. ASAP Animal Production 2016, Adelaide.
- Fernandes, J.I.M., A.E. Murakami, E.N. Martins, M.I. Sakamoto and E.R.M. Garcia. 2009. Effect of arginine on the development of the pectoralis muscle and the diameter and the protein: deoxyribonucleic acid rate of its skeletal myofibers in broilers. Poultry Science, 88: 1399-1406.
- Fletcher, D.L. 1999. Broiler breast meat color variation, pH, and texture. Poultry Science, 78: 1323-1327.
- Froning, G.W., A.S. Babji and F.B. Mather. 1978. The effect of pre-slaughter temperature, stress, struggle and anesthetization on color and textural characteristics of turkey muscle. Poultry Science, 57: 630-633.

23. Gaafar, K.M., S.A. Selim and S.S. El-ballal. 2013. Effect of in-ovo administration with two levels of amino acids mixture on the performance of Muscovy ducks. *Emirates Journal of Food and Agriculture*, 25: 58-65.
24. Gao, T., M.M. Zhao, Y.J. Li, L. Zhang, J.L. Li, L.L. Yu, F. Gao and G.H. Zhou. 2017. Effects of in ovo feeding of L-arginine on the development of digestive organs, intestinal function and post-hatch performance of broiler embryos and hatchlings. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 1-10.
25. Go, G.W., G. Wu and S.B. Smith. 2009. The growth performance, carcass traits, meat pH and color, and CO₂ production in pigs supplemented arginine with conjugated linoleic acid. *ASEB Journal*, 23: 732-735.
26. Hurling, R., J.B. Rodell and H.D. Hunt. 1996. Fiber diameter and fish texture. *Journal of Texture Studies*, 27: 679-685.
27. Jiao, P., Y. Guo, X. Yang and F. Long. 2010. Effect of dietary arginine and methionine levels on broiler carcass traits and meat quality. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 9: 1546-1551.
28. Jobgen, W.S., S.K. Fried, W.J. Fu, C.J. Meininger and G. Wu. 2006. Regulatory role for the arginine-nitric oxide pathway in metabolism of energy substrates. *The Journal of Nutritional Biochemistry*, 17: 571-588.
29. Letsoalo, T.M.C. 2016. Effect of in ovo injection of glucose on egg hatchability, chick hatch-weight, productivity and carcass characteristics of indigenous Potchefstroom Koekoek chickens. Doctoral dissertation, University of Limpopo.
30. Ma, X., Y. Lin, Z. Jiang, C. Zheng, G. Zhou, D. Yu, T. Cao, J. Wang and F. Chen. 2010. Dietary arginine supplementation enhances antioxidative capacity and improves meat quality of finishing pigs. *Amino Acids*, 38: 95-102.
31. Maiorano, G., A. Sobolewska, D. Cianciullo, K. Walasik, G. Elminowska-Wenda, A. Sławińska, S. Tavaniello, J. yli ska, J. Bardowski and M. Bednarczyk. 2012. Influence of in ovo prebiotic and symbiotic administration on meat quality of broiler chickens. *Poultry Science*, 91: 2963-2969.
32. Munir, K., M.A. Muneer, E. Masaoud, A. Tiwari, A. Mahmud, R.M. Chaudhry and A. Rashid. 2009. Dietary arginine stimulates humoral and cell-mediated immunity in chickens vaccinated and challenged against hydropericardium syndrome virus. *Poultry Science*, 88: 1629-1638.
33. Piedrafita, J., R. Quintanilla, C. Sañudo, J.L. Olleta, M.M. Campo, B. Panea, G. Renand, F. Turin, S. Jabet, K. Osoro and M.C. Olivan. 2003. Carcass quality of 10 beef cattle breeds of the southwest of Europe in their typical production systems. *Livestock Production Science*, 82: 1-13.
34. Priolo, A., D. Micol and J. Agabriel. 2001. Effects of grass feeding systems on ruminant meat colour and flavour. A review. *Animal Research*, 50: 185-200.
35. Rey, C.R., A.A. Kraft, D.G. Topel, F.C. Parrish and D.K. Hotchkiss. 1976. Microbiology of pale, dark and normal pork. *Journal of Food Science*, 41: 111-116.
36. Saenmahayak, B., M. Singh, S.F. Bilgili and J.B. Hess. 2012. Influence of dietary supplementation with complexed zinc on meat quality and shelf life of broilers. *International Journal of Poultry Science*, 11: 28-32.
37. SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT User's Guide, Version 9.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.
38. Schreurs, F.J.G., D. Van Der Heide, F.R. Leenstra and W. De Wit. 1995. Endogenous proteolytic enzymes in chicken muscles. Differences among strains with different growth rates and protein efficiencies. *Poultry science*, 74: 523-537.
39. Simões, J.A. 2006. Chemical and colour evaluation of meat from several Portuguese cattle breeds. *Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias*, 559: 241.
40. Tan, B., Y. Yin, Z. Liu, X. Li, H. Xu, X. Kong, R. Huang, W. Tang, I. Shinzato, S.B. Smith and G. Wu. 2009. Dietary L-arginine supplementation increases muscle gain and reduces body fat mass in growing-finishing pigs. *Amino Acids*, 37: 169-175.
41. Warner, R.D., P.L. Greenwood, D.W. Pethick and D.M. Ferguson. 2010. Genetic and environmental effects on meat quality. *Meat Science*, 86: 171-183.
42. Wu, L.Y., Y.J. Fang and X.Y. Guo. 2011. Dietary L-arginine supplementation beneficially regulates body fat deposition of meat-type ducks. *British Poultry Science*, 52: 221-226.
43. Xu, Y.Q., Y.W. Guo, B.L. Shi, S.M. Yan and X.Y. Guo. 2018. Dietary arginine supplementation enhances the growth performance and immune status of broiler chickens. *Livestock Science*, 209: 8-13.
44. Zhang, H., K.E.C. Elliott, O.A. Durojaye, S.A. Fatemi, M.W. Schilling and E.D. Peebles. 2019. Effects of in ovo injection of L-ascorbic acid on growth performance, carcass composition, plasma antioxidant capacity and meat quality in broiler chickens. *Poultry science*, doi: 10.3382/ps/pez173.
45. Zhao, M.M., D.Q. Gong, T. Gao, L. Zhang, J.L. Li, P.A. Lv, L.L. Yu, F. Gao and G.H. Zhou. 2017. In ovo feeding of creatine pyruvate increases hatching weight, growth performance, and muscle growth but has no effect on meat quality in broiler chickens. *Livestock Science*, 206: 59-64.

The Effect of *in Ovo* Injection with Different L-Arginine Levels on Hatchability, Growth, Performance and Meat Quality of Ross 308 Broiler Chickens

Somayeh Omidi¹, Marziyeh Ebrahimi², Hossein Janmohammadi³, Hossein Taghipour⁴, Seyed Hadi Peighambardust⁵ and Hamidreza Ghassemzadeh⁶

1- M.Sc. Student of Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

2- Assistant professor of Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
(Corresponding author: mailto:marzebrahimi@tabrizu.ac.ir)

3- Professor of Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

4- M.Sc. of East Azerbaijan Institute of Research and Education of Agriculture and Natural Resources, Tabriz, Iran
5- Professor of Department of Feed Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz,
Iran

6- Professor of Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Received: May 18, 2019

Accepted: June 2, 2019

Abstract

Previous studies have indicated the positive impact of dietary supplementation of arginine on meat quality and growth, though there is no report regarding the effect of *in ovo* injection of arginine on meat quality. So, the aim of this study was to evaluate the effect of *in ovo* injection of different levels of L-arginine on hatchability, growth performance, and meat quality of Ross 308 broiler chickens. In this research, 300 fertile eggs were used in a completely randomized design with three experimental treatments (levels of 0.5 and 1% of L- arginine and total control). Experimental groups included: 1) *in ovo* injection of 0.5% L-arginine, 2- *in ovo* injection of 1% L-arginine, 3) total control group {collected control 1 (injection of distilled water) and control 2 (no injection)}, which were injected on d 14 of incubation. After hatching, broiler chicks of arginine treatments and total control group were divided each into four equal groups and placed randomly into four cages (replicates of the experiment). The rearing period continued from hatching to d 24. In order to investigate the quality of meat, on day 24, three chicks from each replicate (12 chicks per each treatment) were weighed, slaughtered and their breast muscles were used for meat quality evaluation. Based on the results, *in ovo* injection of different levels of L- arginine did not significantly affect 1, 10 and 24 day-old birds' weight, daily weight gain, feed intake, feed conversion ratio, and relative weight of scalped carcass and breast muscle ($P > 0.05$). Although, meat pH, meat fat and Ash content, and meat color indexes (a^* , b^* , L^* , H) were not affected by L- arginine *in ovo* injection treatments ($P > 0.05$), meat water loss, D, and C indexes were significantly affected by experimental treatments ($P < 0.05$). Based on the overall results of this study, *in ovo* injection with different levels of L- arginine could not have a significantly noticeable effect on growth performance, meat production and/or meat quality of 24 day- old broiler chickens.

Keywords: Broiler chickens, *In ovo* injection, L- arginine, Meat quality