



"مقاله پژوهشی"

اثر سطوح کلسیم و فسفر با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، آنزیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی سویه آرین

مهدی کسرایی^۱ و علیرضا حسابی نامقی^۲

۱- فارغ‌التحصیل دکتری بیوشیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، (نویسنده مسؤول): mk.jahad@yahoo.com

۲- بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان آموزش، تحقیقات و تربیت کشاورزی، مشهد، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

صفحه: ۳۲ تا ۳۸

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی سطوح مختلف کلسیم و فسفر (با و بدون آنزیم فیتاز) بر عملکرد، آنزیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی سویه آرین انجام شد. به این منظور تعداد ۲۸۸ جوجه گوشتی یک روزه سویه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی به ۶ تیمار، ۴ تکرار، ۴ قطعه جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. تیمارهای مورد آزمایش شامل: گروه شاهد (توصیه سویه تجاری، ۱ درصد کلسیم و ۵ درصد فسفر)، ۱۵ و ۳۰ درصد کاهش (با و بدون آنزیم فیتاز) و ۱۵ درصد افزایش در سطوح کلسیم و فسفر بود. نتایج نشان داد که جیره ۱۵ درصد کلسیم و فسفر کمتر از شاهد بیشترین مصرف خوارک، اضافه وزن و بهترین ضریب تبدیل را در کل دوره (۱-۴۲ روزگی) به خود اختصاص داد که دارای اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها بود ($p < 0.05$). تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر غلظت آنزیم‌های کبدی ALP و LDH داشتند و تفاوت معنی‌داری مشاهده شد ($p < 0.05$ ، اما در غلظت آنزیم کبدی ALT تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد ($p > 0.05$)). تیمارهای آزمایشی به طور معنی‌داری سبب تغییر غلظت فراسنجه‌ها خونی شامل فسفر، سدیم و پتاسیم شدند ($p < 0.05$ ، اما تأثیر معنی‌داری بر غلظت کلسیم خون جوجه‌های گوشتی نداشت ($p > 0.05$)). غلظت مینیزیم در ۲۱ روزگی به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ($p < 0.05$ ، اما در سن ۴۲ روزگی اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ($p > 0.05$)). به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری نمود که با استفاده از سطوح ۱۵ درصد کلسیم و فسفر کمتر از جیره شاهد (احتیاجات توصیه شده سویه) منجر به بیشترین خوارک، افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل شده است.

واژه‌های کلیدی: آنزیم فیتاز، آنزیم‌های کبدی و جوجه گوشتی

نتایج مختلف در خصوص تأثیر استفاده از سطوح مختلف کلسیم و فسفر در جیره جوجه‌های گوشتی است. شیخalar و همکاران (۲۱) بیان داشتند که سطوح مختلف کلسیم و فسفر جیره تأثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک و افزایش وزن جوجه‌های گوشتی نداشت. اما پیتر (۱۶) گزارش نمود که درصد کلسیم و فسفر جیره در مرحله پایانی رشد بر ضریب تبدیل موثر است. به طوری که بهترین ضریب تبدیل در سطوح کلسیم بیش از ۷۰ درصد میزان توصیه شده به همراه حدود ۰/۲۷ درصد فسفر غیر فیتاتی می‌باشد. همچنین افزایش کلسیم جیره به میزان بیشتر از ۸۵ درصد به همراه ۰/۳۷ درصد فسفر غیر فیتاتی بین سن ۱۰-۴۵ روزگی باعث افزایش جذب بهتر فسفر شد (۱۶). افزایش نسبت کلسیم به فسفر جیره باعث افزایش ظرفیت نگهداری خاکستر استخوان ران و تعادل کلسیم شد. مصرف فیتاز، کاهش دفع فسفر فیتاتی را در جوجه‌های گوشتی به دنبال داشت. در آزمایشی استفاده از فیتازهای با منشاء متفاوت سبب بهبود در عملکرد، معدنی شدن استخوان، افزایش جذب کلسیم، فسفرکل، فسفر فیتاتی و بهبود مصرف ازت شد. در حالی که دفع فسفر را کاهش داد (۱۰).

آنزیم ALP کبدی به عنوان متالو آنزیم نقش مهمی را در معدنی شدن استخوان بازی می‌کند. در حالی که با کاهش سطوح فسفر جیره، سطح ALP سرم خون افزایش می‌یابد. گزارش شده است که خوک‌ها و جوجه‌های گوشتی تقدیم شده با فیتاز، سطوح ALP سرم کمتری را نشان دادند (۱۱). غلظت‌های فسفر سرم خون از سطوح فسفر جیره تأثیر می‌پذیرند و به صورت افزایش خطی به سطوح فسفر جیره

مقدمه

بخشی از فسفر موجود در مواد خوارکی با منشاء گیاهی به ویژه دانه غلات به صورت متصل به اسید فیتیک^۱ است، که به اصطلاح فسفر فیتاتی نامیده می‌شود. فسفر فیتاتی در دانه غلات و بقولات به ترتیب ۵۰ تا ۷۵ درصد کل فسفر موجود در دانه را به خود اختصاص می‌دهد. فیتات با تشکیل کمپلکس نامحلول با مواد معدنی همانند نیکل، کبات، منگنز، آهن و روی سبب اختلال در جذب و موجب کمبود آنها و افزایش دفع آنها می‌شود (۱۵،۸). از طرف دیگر پایین بودن قابلیت دسترسی فسفر موجود در منابع گیاهی علاوه بر افزایش استفاده از منابع فسفر غیرآلی باعث رود فسفر اضافی به آب‌های سطحی شده و موجب افزایش آلودگی آب می‌شود (۴). مطالعات انجام گرفته بیانگر این است که میزان دفع فسفر در مدفوع خوک و طبور بیشتر از فسفر موجود در مدفوع سایر دام‌ها می‌باشد، که این خود موجب افزایش حساسیت در ارتباط با آلودگی‌های زیست محیطی دفع فضولات خوک و طیور شده است (۷). یکی از روش‌های موثر درجهت بهبود قابلیت هضم فیتات در جیره حیوانات، توسعه صنعت تولید آنزیم و مکمل کردن جیره‌ها با منابع فیتاز میکروبی یا قارچی می‌باشد. افزودن مکمل فیتاز به جیره سبب افزایش قابلیت هضم، جذب و ابقاء کلسیم در جوجه‌های گوشتی می‌شود (۷،۲۲). همچنین سبب افزایش قابلیت دسترسی فسفر به میزان ۴۲ تا ۹۵ درصد می‌گردد (۲،۳). مطالعات نشان می‌دهد، وقتی که فیتاز بر ملکول فیتات اثر می‌کند باعث افزایش حلالیت و کاهش اثرات خد تغذیه‌ای آن بر اسیدهای آمینه و مواد معدنی می‌شود (۱۵،۵). بررسی‌ها نشان دهنده

شاهد همراه با آنژیم فیتاز (E) ۱۰۰۰ واحد در یک کیلوگرم
جیره، تیمار پنجم: مقدار کلسیم و فسفر ۳۰ درصد کمتر از
جیره شاهد، تیمار ششم: مقدار کلسیم و فسفر ۳۰ درصد کمتر
از جیره شاهد همراه با آنژیم فیتاز ۱۰۰۰ واحد در کیلوگرم
جیره. جیره‌های مصرفی بر اساس توصیه‌های سویه آرین
تنظیم شدن (۹) و ترکیب این جیره‌ها در جدول یک نشان
داده شده است. مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه‌های
گوشتی در دوره‌ها ۱۰۰-۲۸-۱۱ روزگی و ۴۲-۴۹ روزگی.
روزگم، اندازه‌گیری، شد.

جهت اندازه‌گیری آنژیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی، در سن ۲۱ و ۴۲ روزگی دوره آزمایش از هر تکرار دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از خونگیری از ورید بال، نمونه‌های خون به آزمایشگاه منتقل و برای جدا شدن سرم از لخته به مدت ۲ تا ۴ ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند. پس از گذشت این زمان برای اطمینان از عدم باقی‌ماندن لخته خون به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. سپس نمونه‌های سرم جداسازی شده به میکروتیپ منتقل شدند و تا زمان اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی مورد نظر در دمای -۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند (۲۲). برای اندازه‌گیری آنژیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی از کیت‌های تجاری پارس آزمون Selectra XL، Vital Scientific، و دستگاه اتوانالبیزر (Netherlands) استفاده شد.

کلیه داده‌های جمع‌آوری شده در واحد مرغداری و آزمایشگاه شامل عملکرد، فراستجه‌های خونی و آنژیمهای کبدی) وارد برنامه اکسل شدند. داده‌های درصدی قبل از آنالیز با استفاده از آرک سینوس ریشه دوم نرمال شدند (۱)، و با استفاده از نرمافزار آماری SAS (ویرایش ۹/۱) و رویه خطی (GLM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (۲۰). جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون مقایسه‌ای چند دامنه‌ای دانکن و در سطح معنی دار $\alpha = 0.05$ استفاده شد.

وابستگی دارند (۱۶). در حالی که ترکیبات فیتاز جیره به طور معنی داری غلظت‌های فسفر سرم خون را در طول آزمایش افزایش داد. ولی سطوح کلسیم سرم تنها در سه هفته اول افزایش نداشت. در آزمایشی نشان داده شد که سطوح آزمایش تاثیر پذیرفت. در آزمایشی نشان داده شد که سطوح فسفر جیره و فعالیت ALP سرم معکوس هم بودند. به طوریکه کاهش فعالیت ALP سرم در گروه دریافت کننده فیتاز افزایش سطوح فسفر جیره را نشان داد (۲۳). نورمحمدی و همکاران (۱۴) گزارش نمودند، که افزایش آنزیم فیتاز به جیره طبیور سبب کاهش غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز کبدی می‌شود. همچنین با افزایش آنزیم فیتاز در جیره طبیور کاهش

در میزان انزیم لاکتات دهیدروژناز سرم خون مشاهده شد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعات کمتری بر تاثیر سطوح مختلف کلزیم و فسفر بر آنزیم‌های کبدی و فراستجه‌های خونی در جوچه‌های گوشته سویه آرین صورت گرفته است، لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف کلزیم و فسفر (با یا بدون آنزیم فیتاژ) بر عملکرد و آنزیم‌های کبدی AST، ALT (ترانس آمینازها)، LDH (احیاء کننده پیروات به لاکتات)، ALP (آلکالین فسفاتاز آنزیم هیدرولازی که فسفات آلی را به معدنی تبدیل می‌کند) و فراستجه‌های خونی (فسفر، کلزیم، منزیم، پتاسیم و سدیم) در جوچه‌های گوشته سویه آرین بوده است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش با استفاده از ۲۸۸ جوجه یک روزه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه در هر تکرار در مرغداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و با همکاری آزمایشگاه بخش بیوشیمی بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: تیمار یک: میزان کلسیم و فسفر جیره بر اساس توصیه سویه آرین (جیره شاهد)، تیمار دوم: میزان کلسیم و فسفر ۱۵ درصد بیشتر از جیره شاهد، تیمار سوم: مقدار کلسیم و فسفر ۱۵ درصد کمتر از جیره شاهد، تیمار چهارم: مقدار کلسیم و فسفر ۱۵ درصد کمتر از جیره

جدول ۱- مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی

شد ($p < 0.05$). در کل دوره تیمار ۱۵- بیشترین افزایش وزن و تیمار ۱۵+ کمترین افزایش وزن را داشت ($p < 0.05$)، و این اختلاف با تیمار شاهد و سایر تیمارها نیز معنی‌دار بود. برخلاف نتایج این پژوهش محققین نشان دادند که افزایش ۰/۹۰-۰/۹۴ درصد کلسیم و ۰/۴۲-۰/۴۴ درصد فسفر غیرفیتاتی در مرحله اولیه باعث افزایش وزن شد و همچنین افزایش ۰/۷۵-۰/۹۰ درصد کلسیم و ۰/۴۱-۰/۴۶ درصد فسفر غیرفیتاتی در مرحله رشد باعث افزایش وزن گردید (۲۲، ۱۳). از طرفی مطالعه دیگر نشان داد که سطوح مختلف کلسیم و فسفر جیره تاثیر معنی‌داری بر اضافه وزن جوجه‌های گوشتی نداشته است (۲۱). این اختلاف نتایج می‌تواند به دلیل تفاوت در سویه‌های مورد استفاده و احتیاجات پایه آنها بوده باشد. محققین بیان داشتند که کاهش فسفر جیره با افزایش حداقل ۱۰۰۰ واحد بر کیلوگرم آنزیم فیتاز سبب جبران افزایش وزن جوجه‌های گوشتی می‌شود. ولی مقدار کمتر از ۵۰۰ واحد بر کیلوگرم فیتاز اثر کمبود فسفر را جبران نخواهد کرد (۱۲، ۱۹). اما همان گونه که مشاهده شد در این آزمایش افزودن آنزیم نه تنها سبب جبران این کاهش وزن نشد بلکه خود سبب گردید که تیمارهای مصرف‌کننده جیره‌های حاوی آنزیم افزایش وزن کمتری نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها داشته باشند که این نشان می‌دهد میزان احتیاجات بیان شده برای جوجه گوشتی آرین بیشتر از نیاز واقعی این سویه است. ضریب تبدیل خوارک جوجه‌های گوشتی مورد مطالعه در جدول ۲ آمده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در کل دوره‌ها ضریب تبدیل خوارک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ($p < 0.05$). در سن ۱-۱۰ روزگی بهترین ضریب تبدیل در تیمار E-۳۰ مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد و سایر تیمارها دارد، اما بین تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. ضریب تبدیل خوارک در سن ۱۱-۲۸ نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و تیمار ۱۵E-بهترین و تیمار ۳۰-بدترین ضریب تبدیل را داشتند ($p < 0.05$). در سن ۲۹-۴۲ روزگی تیمارهای ۱۵- بهترین ضریب تبدیل خوارک را بهتر تبدیل و تیمارهای ۱۵+ و ۱۵E- بدترین ضریب تبدیل خوارک را به خود اختصاص دادند که اختلاف آنها با تیمار شاهد و سایر تیمارها معنی‌دار بود ($p < 0.05$). در کل دوره (سن ۰-۴۲ روزگی) اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های ۱۵ و ۳۰E- با سایر تیمارهای آزمایشی مشاهده می‌شود ($p < 0.05$). بهترین ضریب تبدیل را تیمار ۱۵- و ۳۰E- در این دوره به خود اختصاص دادند. افزودن آنزیم به تیمارهای ۱۵- و ۳۰- تاثیری در بهبود ضریب تبدیل خوارک این تیمارها نداشت هر چند محققین بیان داشتند که افزودن آنزیم فیتاز به جیره می‌تواند به دلایل تاثیر آنزیم بر آزاد شدن مواد مغذی متصل شده (بهخصوص فسفر) به آسید فیتیک، افزایش قابلیت هضم مواد مغذی و تجزیه بخشی از دیواره سلولی مواد خوارکی توسط این آنزیم، کاهش زمان انتقال مواد خوارکی در دستگاه گوارش، افزایش خوارک مصرفی، هیدرولیز و بهره‌وری ثانویه فیتات در ارتباط با مواد مغذی مانند پروتئین، نشاسته، کربوهیدرات و مواد معدنی و تاثیر مثبت آنزیم بر کاهش ویسکوزیته شیره گوارشی سبب بهبود ضریب

نتایج و بحث

میانگین مصرف خوارک جوجه‌های تغذیه شده با سطوح مختلف کلسیم و فسفر مربوط به دوره‌های مختلف پرورش در جدول شماره ۲ آمده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در تمام دوره‌های مورد مطالعه، خوارک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ($p < 0.05$). در سن ۱-۱۰ روزگی اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت، و تیمار شاهد و ۱۵- همراه با آنزیم (E-) بهترین کمترین و بیشترین میانگین مصرف خوارک را به خود اختصاص دادند، اما اختلاف معنی‌داری بین سایر تیمارها با تیمار شاهد مشاهده نشد. در سن ۱۱-۲۸ روزگی اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید ($p < 0.05$)، و تیمارهای ۳۰- و ۱۵+ کمترین و بیشترین مصرف خوارک را به خود اختصاص دادند که اختلاف آنها با تیمار شاهد نیز معنی‌دار بود. در سن ۲۹-۴۲ روزگی تیمارهای ۱۵- و ۱۵+ بهترین کمترین و بیشترین خوارک مصرفی را داشتند که اختلاف آنها با تیمار شاهد و سایر تیمارها معنی‌دار بود ($p < 0.05$). در کل دوره (۱-۴۲) روزگی تیمارهای ۱۵- و ۱۵+ بهترین بیشترین و کمترین خوارک مصرفی را داشتند که اختلاف آنها با تیمار شاهد و سایر تیمارهای معنی‌دار بود ($p < 0.05$).

برخی مطالعات نشان داده اند که سطوح مختلف کلسیم و فسفر جیره تاثیر معنی‌داری بر مصرف خوارک جوجه‌های گوشتی نداشته است (۲۱). اما محققان دیگر بیان داشتند که افزایش کلسیم جیره به میزان بیشتر از ۸۵ روزگی باعث افزایش حذب بهتر فسفر شد (۱۶). همان‌طور که نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین مصرف خوارک در کل دوره در تیمار ۱۵- مشاهده گردید. که این تیمار بالاترین وزن زنده را نیز نشان داد. از آنجایی که مصرف خوارک در جوجه‌های گوشتی یکی از عواملی است که خصوصیات مرتبط با عملکرد را در اکثر موارد بهبود می‌بخشد، بنابراین احتملاً نیاز به کلسیم و فسفر در جوجه‌های آرین کمتر از سایر سویه‌های تجاری و کمتر از مقدار پیشنهادی برای این سویه می‌باشد.

در جدول شماره ۲ اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر افزایش وزن در دوره‌های مختلف پرورش اورده شده است. افزایش وزن جوجه‌های گوشتی مورد مطالعه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده شد ($p < 0.05$). در سن ۱-۱۰ روزگی اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای شاهد و ۳۰- به همراه آنزیم (-۳۰E-) مشاهده شد، که کمترین مقدار افزایش وزن مربوط به تیمار شاهد و بیشترین آن مربوط به تیمار E- ۳۰- بود. در سن ۱۱ روزگی اختلاف معنی‌داری بین گروه شاهد با ۱۵- و ۱۵E- (تیمار ۱۵- به همراه آنزیم) وجود دارد و بدین ترتیب بیشترین و کمترین افزایش وزن در تیمار E- ۱۵E- مشاهده گردید. در سن ۲۹-۴۲ روزگی بین تیمارهای ۱۵- و ۱۵E- بهترین بیشترین و کمترین مقدار افزایش وزن داشتند که اختلاف آنها با تیمار شاهد معنی‌دار بود ($p < 0.05$). افزایش وزن در کل دوره تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده

به همراه حدود ۰/۲۷ درصد فسفر غیر فیتاتی می باشد. همچنین در طی آزمایشات گذشته با ۴ تیمار (شاهد و ۲۰، ۱۰، ۴۴) درصد کلسیم و فسفر کمتر از جیره شاهد) تا سن ۳۰ روزگی جوجه های گوشتشی سویه راس در ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری مشاهده گردید (۱۸). اختلاف نتایج به دست آمده در این آزمایش با آزمایشات ذکر شده می تواند به دلیل تفاوت در سویه و میزان احتیاجات پایه بیان شده برای این سویه باشد که این آزمایش نشان می دهد احتیاجات سویه ارین ۱۵ درصد کمتر از میزان بیان شده این سویه می باشد.

جدول ۲- اثر سطوح کلسیم و فسفر (با و بدون آنزیم فیتاز) بر مصرف خوارک، اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی
Table 2. Effect of Ca and P levels (with and without Phytase enzyme) on consumed diet, weight gain and FCR of broiler chickens

۱-۴۲				۲۹-۴۳				۱۱-۲۸				۱-۱۰				سطوح کلسیم و فسفر (درصد از جیره)
ضریب تبدیل	اضافه وزن (گرم)	صرف خوارک (گرم)	ضریب تبدیل	اضافه وزن (گرم)	صرف خوارک (گرم)	ضریب تبدیل	اضافه وزن (گرم)	صرف خوارک (گرم)	ضریب تبدیل	اضافه وزن (گرم)	صرف خوارک (گرم)	ضریب تبدیل	اضافه وزن (گرم)	صرف خوارک (گرم)		
۱/۸۷ ^a	۲۱۵ ^b	۳۹۵ ^b	۲/۰ ^c	۱۱۶ ^b	۲۳۴ ^b	۱/۶ ^{ab}	۸.۹ ^c	۱۳۴ ^b	۱/۴ ^a	۱۸۵ ^b	۲۵۹ ^b	شاهد				
۱/۸۷ ^a	۲۰.۵ ^d	۳۷۶ ^d	۲/۰ ^a	۱۰۰ ^d	۲۲۱ ^c	۱/۵ ^{ab}	۸۱۹ ^{bc}	۱۲۹ ^c	۱/۴ ^a	۱۸۷ ^{ab}	۲۶۳ ^{ab}	+۱۵ ^b	+۱۵ ^b	+۱۵ ^b	+۱۵ ^b	
۱/۸۳ ^b	۲۲۴ ^a	۴۰.۱ ^a	۲/۰ ^d	۱۱۶ ^a	۲۳۸ ^a	۱/۶ ^{ab}	۸۴. ^b	۱۳۵ ^{ab}	۱/۲ ^{ab}	۱۹۷ ^{ab}	۲۶۹ ^{ab}	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	
۱/۸۵ ^a	۲۱۰. ^c	۲۸۱ ^c	۲/۰ ^a	۹۹۷ ^d	۲۱۹ ^{cd}	۱/۵ ^c	۸۷ ^a	۱۳۵ ^{ab}	۱/۴ ^a	۱۶۶ ^{ab}	۲۸۲ ^a	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	
۱/۸ ^a	۲۰.۶ ^d	۳۸۱ ^{cd}	۲/۱ ^c	۱۰۰ ^d	۲۱۶ ^d	۱/۶ ^{ab}	۸۰. ^{bc}	۱۳۷ ^a	۱/۲ ^{ab}	۱۹۴ ^{ab}	۲۶۷ ^{ab}	-۳۰ ^b	-۳۰ ^b	-۳۰ ^b	-۳۰ ^b	
۱/۸۲ ^b	۲۱۷. ^b	۳۸۶ ^c	۲/۰ ^c	۱۰۶ ^c	۲۲۳ ^d	۱/۶ ^{ab}	۸۵. ^{ab}	۱۳۶ ^{ab}	۱/۲ ^c	۲۰.۵ ^a	۲۶۰ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	-۱۵ ^b	
۰/۱۱	۱۷/۵ ^c	۱۲/۶ ^c	۰/۰۱۳۱	۶/۰۶	۱۳/۷۵	۰/۰۱۷۱	۸/۶۱	۷/۲۱	۰/۰۲۴۰	۵/۶۰	۶/۷۱	میانگین خطای استاندارد				
۰/۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	P-Value				

در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، باهم اختلاف معنی دار دارند (۰/۵۰).

مشاهده شد ($p < 0.05$) و تیمارهای شاهد و 15% به ترتیب بیشترین غلظت و کمترین غلظت این آنزیم را به خود اختصاص دادند. هر چند اختلاف تیمار شاهد با سایر تیمارها معنی دار بود، اما تیمار 15% - اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان نداد. در سن 42 روزگی آنژیم لاکتانز دهیدروژوئناز اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف نشان داد ($p < 0.05$ ، و کمترین مقدار آن در تیمار $+15\%$ و بیشترین آن در تیمار 15% مشاهده شد. مطالعات گذشته نشان می دهد که افزایش 500% واحد بر کیلوگرم آنزیم فیتاز اثر افزاینده ناچیزی بر غلظت آنژیم آسپارتات آمینوتراستافراز سرم خون جوجه های گوشتشی دارد (14). این نتایج نشان می دهد که هر چه غلظت موادمعدنی جیره غذایی جوجه های گوشتشی کمتر باشد و میزان آنزیم فیتاز در آن جیره از 500% واحد بر کیلوگرم تجاوز کند، آنژیم آسپارتات آمینوتراستافراز سرم خون افزایش ناچیزی می یابد. همچنین این مطالعات نشان داد که افزایش 1000% واحد بر کیلوگرم آنزیم فیتاز در جیره طیور باعث کاهش آن به آلتی، آمنته استفسر از شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آنریم فیتاز اثر کاهشی بر این آنریم دارد، در حالی که با توجه به یافته‌های اخیر مقدار مواد معدنی تاثیری بر مقدار این آنریم کبدی نداشت. نتایج مشابهی در مورد آنریم آکالین سففاتاز توسط نورمحمدی و همکاران (۱۴) به دست آمد، که افزایش آنریم فیتاز در جیره طیور اثر کاهشی بر این آنریم داشت. نتایج اخیر نشان داد که افزایش مواد معدنی جیره، کاهش آنریم آکالین سففاتاز سرم خون را در طیور ایجاد می‌کند. همچنین با افزایش آنریم فیتاز در حیله طیور، کاهش، در میان آنریم لاكتات دهدوزنای سرم

جدول شماره ۳ اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر آنزیم‌های کبدی در سالین ۲۱ و ۴۲ روزگی را نشان می‌دهد.

درسن ۲۱ روزگی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز (AST) به‌گونه‌ای بود که بیشترین مقدار آن در تیمار E-۳۰ مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نداشت اما اختلاف آن با سایر تیمارها معنی‌دار بود ($p < 0.05$)، و کمترین غلظت آن در تیمار ۱۵E-۳۰ مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نبیز داشت ($p < 0.05$).

درسن ۲۱ روزگی غلظت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد ($p > 0.05$). در سن ۲۱ روزگی غلظت آنزیم آکالالین فسفاتاز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای شاهد و ۱۵+ وجود داشت ($p < 0.05$ ، اما تیمار شاهد با سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت. غلظت آنزیم لاکتونت دهیدروژئنان تحت تاثیرهای تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف مشاهده گردید ($p < 0.05$). به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت این آنزیم را تیمارهای ۱۵- و ۳۰- به‌خود اختصاص دادند.

در سن ۴۲ روزگی آنژیم آسپاراتات آمینوترانسفراز اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف نشان داد ($p < 0.05$) و بیشترین مقدار در تیمار E-۳۰ و کمترین آن در تیمار +۱۵ مشاهده شد. اختلاف معنی داری در غلظت آنژیم آلانین آمینوترانسفراز بین تیمارهای مختلف در سن ۴۲ روزگی مشاهده نشد ($p > 0.05$). در سن ۴۲ روزگی اختلاف معنی داری، بین تیمارهای مختلف داشت، آنژیم الکالیز فسفاتاز؛

اثر سطوح کلسیم و فسفر با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، آنزیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی سویه آرین ۳۶

فیتاز مقدار کمتری از آنزیم‌های کبدی را نشان می‌دهند، بیانگر این است، که احتمالاً این آنزیم‌ها در حضور آنزیم فیتاز کاهش می‌یابند، که خود نشان‌دهنده اثرات مثبت آنزیم فیتاز است.

خون مشاهده شد (۱۴). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش آنزیم فیتاز اثر کاهشی بر این آنزیم دارد، از آزمایش اخیر نیز نتایج مشابهی به دست آمد. این نتایج نشان داد که افزایش مواد معدنی باعث کاهش این آنزیم در سرم خون می‌شود. توجه به این موضوع که گروه‌های دریافت‌کننده آنزیم

جدول ۳- اثر سطوح کلسیم و فسفر (با و بدون آنزیم فیتاز) بر آنزیم‌های کبدی (۲۱ و ۴۲ روزگی)

Table 3. Effect of Ca and P levels (with and without Phytase enzyme) on liver enzymes (21, 42 d)

واحد بر لیتر								سطوح کلسیم و فسفر(درصد از جیره)
LDH ^a (u/l)	ALP ^b (u/l)	ALT ^c (u/l)	AST ^d (u/l)	LDH ^a (u/l)	ALP ^b (u/l)	ALT ^c (u/l)	AST ^d (u/l)	شاهد*
۴۲ روزگی	۲۱ روزگی	۴۲ روزگی						
۲۵۵۳ ^a	۵۸۸ ^c	۸۱۲۳ ^a	۱۲/۰۰	۱۷/۲۵	۲۴۴۳ ^c	۲۹۸ ^b	۳۷۷ ^a	شاهد*
۱۳۴۶ ^b	۵۹۹ ^c	۵۰۲۵ ^b	۹۱۹۵ ^b	۱۳/۷۵	۱۷/۲۵	۲۴۴۳ ^c	۲۹۸ ^b	۱۵/۱۵%
۲۵۸۵ ^a	۹۶۸ ^a	۴۷۰۴ ^b	۱۱۴۸۲ ^a	۱۳/۳۷	۱۹/۲۵	۳۲۸۵ ^a	۳۰۱ ^b	۱۵/۱۵%
۱۶۶۷ ^b	۷۶۴ ^b	۵۹۲۳ ^b	۱۱۷۲۳ ^a	۱۲/۷۷	۱۶/۰۰	۲۹۹ ^b	۲۷۸ ^b	۱۵/۱۵%+ آنزیم
۲۴۶۵ ^a	۵۷۷ ^c	۵۸۶۳ ^b	۱۲۷۲۶ ^a	۱۲/۶۵	۱۶/۰۰	۲۸۲ ^b	۲۹۵ ^b	۱۵/۱۵%+ کمتر
۱۴۴۹ ^b	۷۵۴ ^b	۵۷۳۵ ^b	۱۲۶۱۳ ^a	۱۲/۲۵	۱۸/۷۵	۳۳۳ ^a	۳۵۱ ^a	۱۵/۱۵%+ آنزیم
۱۴۸	۲۷/۶۸	۴۴۳	۷۱۴/۷	۵۰/۶۱	۱/۱۱	۱۰/۳۶	۷/۵۲	میانگین خطای استاندارد
۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۸۱	۰/۰۷	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	P-Value

درهه ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، باهم اختلاف معنی دارند ($p < 0.05$). سطوح کلسیم و فسفر در تیمار شاهد ۱ و ۵/۰ درصد تا ۲۱ روزگی و بعد از آن ۰/۹ و ۰/۴۵ بود.

-۱- آنزیم آسپارتات آمینو ترانس‌فراز-۲- آنزیم آلبالن آمینو ترانس‌فراز-۳- آنزیم آلبالن فسفاتاز-۴- آنزیم لاکتات دهیروژنаз

غلاظت سدیم خون رو به خود اختصاص دادند. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر غلاظت پتاسیم داشتند و اختلاف معنی داری در روز ۲۱ و ۴۲ آزمایش مشاهده گردید (p < 0.05). در سن ۲۱ روزگی به ترتیب بیشترین و کمترین غلاظت پتاسیم خون را تیمار ۳۰-E و ۱۵-E به خود اختصاص دادند. در سن ۴۲ روزگی بیشترین غلاظت پتاسیم به تیمار ۳۰-E و کمترین غلاظت پتاسیم به تیمار ۱۵-E مربوط بود. در طی آزمایشات گذشته با ۴ تیمار (شاهد و ۲۰، ۲۰، ۱۰، ۴۴ روزگی درصد کمتر کلسیم و فسفر از جیره شاهد) تا سن ۴۴ روزگی جوجه‌های گوشتی راس در استفاده از جیره‌های کاهشی تقاضای در غلاظت کلسیم و فسفر سرم خون دیده نشد (۱۷).

نورمحمدی و همکاران (۱۴) نشان دادند که افزایش فیتاز به جیره طبور اثر کاهشی بر کلسیم سرم خون، اثر افزایشی بر فسفر سرم خون و همچنین اثر کاهشی ضعیفی بر منیزیم سرم خون دارد. که این متفاوت با نتایج به دست آمده در این آزمایش می‌باشد.

جدول شماره ۴ اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر فراسنجه‌های سرم خون درسن ۲۱ و ۴۲ روزگی جوجه‌های گوشتی آمده است. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر غلاظت کلسیم خون جوشهای گوشتی مورد مطالعه نداشت و اختلاف معنی داری بین تیمارهای ۱۵E و شاهد مورد فسفر اختلاف معنی داری بین تیمارهای ۱۵E و شاهد وجود داشت به این گونه که کمترین میزان فسفر در تیمار ۱۵E و بیشترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد. غلاظت منیزیم در سن ۲۱ روزگی اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف نشان داد (p < 0.05) و بیشترین مقدار آن در تیمار ۱۵E و کمترین آن در تیمار ۱۵E و ۴۲ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (p > 0.05). غلاظت سدیم در سن ۲۱ و ۴۲ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهد گردید (p < 0.05). در سن ۲۱ روزگی گروه شاهد و در سن ۴۲ روزگی تیمار ۱۵E- بیشترین

جدول ۴- اثر سطوح کلسیم و فسفر (با و بدون آنزیم فیتاز) بر املال معدنی سرم خون (۲۱ و ۴۲ روزگی)

Table 4. Effect of Ca and P levels (with and without Phytase enzyme) on minerals of blood serum

سطوح کلسیم و فسفر (درصد از جیره)								سن (روز)
K (mg/dl)	Na (mg/dl)	Mg (mg/dl)	P (mg/dl)	Ca (mg/dl)	شاهد*			
۴۲	۲۱	۴۲	۲۱	۴۲	۲۱	۴۲	۲۱	شاهد*
۵/۳۵ ^{ab}	۵/۶۰ ^b	۱۴۷ ^{bc}	۱۵۴ ^a	۲/۹۰	۲/۱۲ ^b	۷/۶۵ ^{ab}	۶/۷۷ ^a	۱۰/۳۰
۵/۰۳ ^{bc}	۴/۶۵ ^{cd}	۱۴۷ ^{bc}	۱۴۰ ^c	۲/۶۶	۱/۸۳ ^c	۷/۲۳ ^b	۵/۹۰ ^b	۸/۸۰
۴/۵۳ ^c	۰/۰ ^{bc}	۱۵ ^{ab}	۱۴۸ ^{ab}	۲/۸۷	۲/۱۰ ^b	۸/۱۳ ^a	۵/۸ ^b	۱۵/۱۵%
۴/۹۳ ^{bc}	۴/۱۰ ^d	۱۵۳ ^a	۱۴۲ ^{bc}	۲/۹۰	۲/۴۰ ^a	۷/۹۳ ^{ab}	۵/۶۰ ^b	۱۰/۳۸
۵/۰۲ ^b	۴/۴۵ ^{cd}	۱۴۸ ^{abc}	۱۵۱ ^a	۲/۸۳	۲/۱۲ ^b	۷/۷۶ ^{ab}	۵/۸۲ ^b	۱۰/۳۸
۵/۰۹ ^a	۷/۰۳ ^a	۱۴۵ ^c	۱۴۰ ^c	۲/۶۷	۲/۲۳ ^b	۷/۵۵ ^{ab}	۶/۷۰ ^{ab}	۱۱/۲۵
۰/۲۰	۰/۲۶۷۹	۱/۲۵	۲/۲۹۹۶	۰/۸	۰/۴۸۴	۰/۷۲	۲/۲۰	۰/۱۸
۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۳۱	۰/۰۲۵	۰/۸۲	۰/۰۰۱	۰/۰۴۲	۰/۰۳۴	۰/۷۲

درهه ستون اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، باهم اختلاف معنی دارند ($p < 0.05$). سطوح کلسیم و فسفر در تیمار شاهد ۱ و ۵/۰ درصد تا ۲۱ روزگی و بعد از آن ۰/۹ و ۰/۴۵ بود.

شاهد بهترین عملکرد و ضریب تبدیل را به خود اختصاص داد. این گروه دارای بیشترین مقدار غلاظت آنزیم لاکتات

در کل نتایج این آزمایش نشان داد که گروه مصرف کننده جوجه‌های مصرفی با ۱۵ درصد کلسیم و فسفر کمتر از جیره

میزان کلسیم خون اثری نداشتند و بیشترین سطح فسفر خون در گروه ۱۵ درصد کاهش در سطوح کلسیم و فسفر جیره که بیشترین وزن زنده را داشت مشاهده شد، پس شاید سطح مطلوب فسفر در اضافه وزن موثر باشد.

دهیدرورثناز بودند. این موضوع که گروههای دریافت کننده آنزیم فیتاز دارای غلظت کمتری از آنزیم‌های کبدی می‌باشند، بیانگر این است که احتمالاً این آنزیم‌ها در حضور آنزیم فیتاز کاهش می‌یابند. با توجه به اینکه اعمال تیمارها بر

منابع

- Ebrahimi, R., T. Mohammad Abadi, M. Sari, S. Sallari, M.J. Zamiri and M.T. BeygiNasiri. 2016. Effect of Pb- induced oxidative stress on performance, antioxidant status and behavioral responses in broiler chicken. *Journal of Veterinary Research*, 71(4): 453-461.
- Edgar, O., O. Rondón and P. Ferket. 2012. The effects of dietary calcium and phosphorus levels on performance, mineral retention, bone characteristics, leg abnormalities, and walking ability of heritage broilers. Master of Science Thesis. NC State University.
- Jayaprakash, G., M. Sathiyabarthi, M. Arokiarobert, T. Tamilmani, T. Chandrasekar and R. DhineshKumar. 2016. Effect of phytase enzyme on performance of broilers nutrition. *Indian Farmer*, 3(5): 330-334.
- Kathirvelan, C., S.R. Janani, J. Ramesh and M.R. Purushothaman. 2015. Significance of usage of phytase in poultry nutrition. *International Journal of Science, Environment and Technology*, 4(4): 1214-1217.
- Khan, S.A., H.R. Chaudhry, Y.S. Butt, T. Jameel and F. Ahmad. 2013. The effect of phytase enzyme on the performance of broiler flock. *Poultry Science Journal*, 1(2): 117-125.
- Kheiri, F. and H.R. Rahmani. 2008. The effect of reducing calcium and phosphorous on broiler performance. *International Journal of Poultry Science*, 5(1): 22-25.
- Kornegay, E.T. and H. Qian. 1996. Replacement of inorganic phosphorus by microbial phytase for young pigs fed on a maize-soybean-meal diet. *British Journal of Nutrition*, 75: 563-578.
- Kornegay, E.T., D.M. Denbow, Z. Yi and V. Ravindran. 1996. Response of broilers to graded levels of microbial phytase added to maize-soybean meal-based diets containing three levels of non-phytate phosphorus. *British Journal of Nutrition*, 75: 839-852.
- Lotfelaheyhan, H., A. Hoseini, A. HesabiNamghi, A. GhesariKhorasgani and A. Yaghobfar. 2019. Determination nutrient requirements of Arian (386) broiler chicks in different rearing periods. Research project. Iranian Institute of Animal Sciences Research.
- Luciana, D.P.N., B.R. Paulo, M. Camila, M.P.B. Verônica, D.O. DavidHenrique, M.S. Mariana, D.V.T. Levy and M.D.S. Luziane. 2016. Efficiency of microbial phytases in diets formulated with different calcium: phosphorus ratios supplied to broilers from 35 to 42 days of age. *Journal of applied animal research*, 44(1): 446-453.
- Mitchell, R.D. and H.M. Edwards. 1996. Effect of phytase 1,5 dihydroxycholecalciferol on phytate utilization and quantitative requirement for calcium and phosphorus in young broiler chickens. *Poulryt. Science*, 75: 95-110.
- Mondal, M.K., S. Panda and P. Biswas. 2007. Effect of microbial phytase in soybean meal based broiler diets containing low phosphorous. *International Journal of Poultry Science*, 6(3): 201-206.
- Mousavi, A., M. Rezaei, F. Niknafs and B. Shohreh. 2010. Effects of microbial phytase on performance, carcass characteristics and phosphorus and calcium content of Tibia in broiler chicks. *Research on Animal Production*, 1(1): 16-28 (In Persian).
- Nourmohammadi, R., S.M. Hosseini and H. Farhangfar. 2013. Effect of citric acid and microbial phytase on serum enzyme activities and plasma minerals retention in broiler chicks. *African Journal of Biotechnology*, 10(62): 13640-13650.
- Onyango, E.M., M.R. Bedford and O. Adeola. 2005. Efficacy of an evolved Escherichia coli phytase in diets of broiler chicks. *Poultry Science*, 84: 248-255.
- Peter, K. 2013. McMaster University, Hamilton, Canada .Clinical Biochemistry Journal: <http://www.elsevier.com/locate/clinbiochem>.
- Ravindran, V., S. Cabahug, G. Ravindran, P.H. Selle and W.L. Bryden. 2000. Response of broiler chickens to microbial phytase supplementation as influenced by dietary phytic acid and non-phytate phosphorus levels. II. Effects on apparent metabolisable energy, nutrient digestibility and nutrient retention. *British Poultry Science*, 41: 193-200.
- Ravindran, V., W.L. Bryden and E.T. Kornegay. 1995. Phytates: occurrence, bioavailability and implications in poultry nutrition. *Poultry Avian Biology*, 6: 125-143.
- Safamehr, A., A. Nobakht and Y. Mehmannavaz. 2017. Evaluation of composition, in vitro solubility rate and calcium and phosphorous digestibility of different calcium sources and their effects on performance and bone traits in broiler chickens. *Research on Animal Production*, 8(15): 1-10 (In Persian).
- SAS Institute. 2003. SAS User's Guide: Statistics. Version 8 ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
- Sheikhlar, A., A.B. Kasim, L.T. Chwen and M.H. Bejo. 2009. *International Journal of Poultry Science*, 8(7): 692-695.
- Tamim, N.M., R. Angel and M. Christman. 2004. Influence of dietary calcium and phytase on phytate phosphorus hydrolysis in broiler chickens. *Poultry Science*, 83: 1358-1367.
- Tanay, B.A., M. Selcuk and K. Onur. 2015. The Effects of microbial phytase on serum calcium and phosphorus levels and alkaline phosphatase activities in broilers fed diets containing different levels of phosphorus. *Acta Scientiae Veterinariae*, 43: 1327-1334.

**Effect of Calcium and Phosphorus Levels
(With and Without Phytase Enzymes)
on Liver Enzymes and Blood Parameters in Arian Broiler Chickens**

Mahdi Kasraei¹ and Alireza Hesabi Namaghi²

1- Former Ph.D. Student of Biochemistry, University of Guilan, Rasht, Iran
(Corresponding author: mk.jahad@yahoo.com)

2- Department of Animal Science Research, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
Khorasan Razavi Province, Agricultural Research , Education and Extention Organization, Mashhad, Iran

Received: March 1, 2020 Accepted: June 15, 2020

Abstract

An experiment was done for studying different levels of Ca & P (with and without Phytase enzyme) on liver enzymes and blood parameters in Arian broiler chickens. Two hundred eighty eight broiler chicken were used in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replicates with 12 chickens in each floor pen. Broiler chickens were fed with different levels of Ca and P (with or without Phytase enzyme). Treatments included: control group (0.1Ca, 0.5P %) and other treatments were 15% and 30% Ca and P lower than control diet (with and without Phytase enzyme), 15% Ca & P more than control diet. The results showed that in diet with 15% Ca and P lower than control group had maximum feed intake, body weight gain and minimum feed conversion ratio in total period. The liver of AST, ALP and LDH enzymes concentration were affected by different treatments. But ALT was not affected by treatments. Treatment significantly affected of blood parameter including P, N and K, but not effected on the Ca concentration in 21 and 42 days. In general, it can be concluded that the diet with 15% Ca and P lower than control group resulted highest feed consumption, body weight gain and best feed conversion ratio.

Keywords: Broiler Chickens, Liver Enzymes, Phytase Enzyme