



تأثیر منابع مختلف عنصر روی بر زیست فرآهمی روی سرم، عملکرد تولیدی و قابلیت هضم گاوهای شیرده هلستاین در اوایل دوره شیردهی

مهدی نعمت‌پور¹، کامران رضایزدی²، مهدی گنج خانلو³ و آرمین توحیدی⁴

1- دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
2- دانشیار، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، (نویسنده مسوول: rezayazdi@ut.ac.ir)
3- دانشیار، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
4- استاد، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
تاریخ دریافت: 1398/07/26 تاریخ پذیرش: 1398/10/23
صفحه: 66 تا 73

چکیده

سی و پنج راس گاو هلستاین دو شکم زایش کرده و بالاتر با هدف بررسی تأثیر منابع مختلف روی بر تولید و ترکیب شیر، پارامترهای خونی، و قابلیت هضم مورد استفاده قرار گرفت. حیوانات در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تکرار به یکی از جیره‌های آزمایشی اختصاص داده شدند که (1) جیره کنترل؛ بدون مکمل روی (2) جیره همراه با منبع گلایسینات روی (3) جیره همراه با هیدروکسی کلراید روی (4) جیره همراه با اکسید روی و (5) جیره همراه با سولفات روی، بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از منابع مختلف روی تأثیر معنی‌داری بر گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید نداشت ($P>0/10$). استفاده از منابع مختلف روی در تغذیه گاوهای شیری به‌طور معنی‌داری میزان روی موجود در سرم خون را نسبت به گروه کنترل افزایش می‌دهد ($P<0/010$). نتایج همچنین نشان داد که تولید شیر، شیر تصحیح شده برای انرژی، شیر تصحیح شده برای چربی و ترکیب شیر به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P>0/10$). شمار سلول‌های بدنی در دام‌های مصرف‌کننده گلایسینات روی ($P=0/054$) و هیدروکسی کلراید ($P=0/069$) روی نسبت به گروه شاهد تمایل به کاهش داشت. میزان ماده خشک مصرفی تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی نداشت ($P>0/10$). روی مصرفی روزانه، روی دفعی در مدفوع، روی دفعی در شیر به‌ازای هر لیتر و روزانه، روی جذب شده و همچنین روی ابقا شده به‌طور معنی‌داری در گروه‌های مصرف‌کننده مکمل روی بیشتر از گروه شاهد بود ($P<0/010$). همچنین استفاده از منابع روی تأثیر معنی‌داری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و خاکستر نداشت ($P>0/10$). بنابراین، نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌کند که استفاده از منابع گلایسینات روی و هیدروکسی کلراید روی زیست فرآهمی بالاتری از منابع معدنی اکسید روی و سولفات روی دارند و همچنین می‌توانند موجب بهبود کیفیت شیر از طریق کاهش شمار سلول‌های بدنی شوند.

واژه‌های کلیدی: روی، زیست فرآهمی، عملکرد تولیدی، قابلیت هضم، گاوهای شیرده

مقدمه

اطلاعات به‌دست آمده از شکل‌های آلی روی به شکل کامل نمی‌باشد. بر همین اساس در برخی گزارش‌ها آمده است که استفاده از شکل آلی روی در مقایسه با منابع معدنی روی موجب بهبود پاسخ‌های تولیدی نشخوارکنندگان می‌شود (31,36). با توجه به نقش تایید شده روی در حفظ ساختار سیستم ایمنی، پیشنهاد شده است که کمبود روی می‌تواند منجر به افزایش SCC¹ و در نتیجه منجر به افزایش نرخ شیوع ورم پستان شود (37). همچنین گزارش شده است که استفاده از شکل آلی کیلات روی باعث کاهش میزان SCC در گاوهای شیری پرتولید می‌شود (7).

از زمانیکه که نقش روی در تنظیم اشتها بررسی شده است (20)، پیشرفت‌هایی در پژوهش‌های انجام شده با موش‌ها حاصل شده است. بیان شده است که الگو مصرف خوراک همانند نرخ مصرف می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد و کمبود حاد عنصر روی ناشی از مصرف خوراک تقریباً عاری از عنصر روی موجب می‌شود که موش‌ها غذای کمی (لقمه لقمه خوردن) را به‌جای یک وعده غذایی کامل مصرف کنند (13).

نتایج به‌دست آمده از مطالعاتی که در خصوص مقایسه منابع آلی و غیر آلی روی انجام شده است متغیر می‌باشد و در برخی از مطالعات تفاوتی در قابلیت زیست‌فرآهمی این منابع مشاهده نشده است (31). منابع آلی روی از لحاظ نوع بایدن یا

روی به‌عنوان ماده‌ای که در عملکرد سیستم‌های آنزیمی و همچنین در فرآیندهایی همچون سنتز پروتئین، متابولیسم کربوهیدرات‌ها، و بسیاری از واکنش‌های بیوشیمیایی دیگر نقش دارد برای حیوانات عنصری ضروری می‌باشد (22,23). به‌طور معمول از شکل معدنی روی، به‌طور ویژه سولفات و اکسید روی، در جیره غذایی گاوهای شیری استفاده می‌شود و در این بین ممکن است شکل عنصر مکمل شده در مقایسه با مقدار مصرف از اهمیت بیشتری برخوردار باشد (23). آمرمن و همکاران (1) بیان کردند که دو عامل خوراکی اصلی موثر بر زیست‌فرآهمی روی شامل عوامل آلی تأثیرگذار بر زیست‌فرآهمی و نیز اثرات متقابل یون-فلز می‌باشند. منابع استاندارد مورد استفاده به‌منظور بررسی زیست‌فرآهمی روی شامل سولفات، کلراید، اکسید و استات روی می‌باشند که البته سولفات روی بیش از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد (1). براساس نتایج مشاهده شده، روی موجود در فرآورده‌های دامی به‌طور معمول قابلیت دسترسی زیستی بیشتری نسبت به فرآورده‌های گیاهی دارد (1). مطالعات صورت گرفته در طیور نشان داده است که منابع آلی روی (روی-متیونین) در مقایسه با منابع سولفات و اکسید روی زیست فرآهمی بیشتری دارند (25).

1- Somatic Cell Count

سلول‌های سماتیک مورد آنالیز قرار گرفتند. جمع‌آوری نمونه‌های TMR² و مدفوع 3 بار در طول انجام آزمایش صورت گرفت و نمونه‌ها تا زمان آزمایش در دمای 20- درجه سلسیوس نگهداری شدند.

نمونه‌های مدفوع و TMR توسط آسیاب با مقیاس 1 میلی‌متر آسیاب شدند و در نهایت اندازه‌گیری‌های مربوط به ماده خشک، ماده آلی و خاکستر توسط رویه AOAC (1) انجام شد. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و خاکستر با استفاده از خاکستر نامحلول در اسید به‌عنوان نشانگر تعیین شد (35).

نمونه‌گیری از خون سه بار در طول انجام آزمایش در زمان پیش از خوراک صبح صورت گرفت. به این شرح که نمونه‌های خون از سیاهرگ دمی توسط لوله‌های تحت خلاء حاوی هیارین برای شاخص‌های گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسرید و همچنین توسط لوله‌های فاقد ماده ضد انعقاد برای شاخص روی جمع‌آوری شد. لوله‌های حاوی خون پس از نمونه‌گیری به سرعت به فلاسک سیار حاوی کیسه‌های یخ منتقل شد و سپس سرم و پلاسما توسط سانتریفوژ با دور 1200g و به مدت 15 دقیقه جدا شد و سپس در ظروف نگهداری پلاسما تا زمان اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر نگهداری گردید. در نهایت اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید با استفاده از کیت‌های تجاری پارس آزمون و میزان روی پلاسما با استفاده از کیت تجاری بایرکس فارس و توسط دستگاه میکرو پلیریدر اتومات صورت گرفت. به‌منظور اندازه‌گیری زیست‌فراهمی منابع مختلف روی از روش نسبت میانگین استفاده گردید. در این حالت از نسبت میانگین روی موجود در سرم منبع آزمایشی (گلایسینات روی، هیدروکسی کلراید روی و اکسید روی) به میانگین روی موجود در سرم منبع استاندارد (سولفات روی) برای برآورد زیست‌فراهمی استفاده شد (1).

تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS (26) صورت گرفت. متغیرهایی که یک بار اندازه‌گیری شدند، به روش آماری GLM و متغیرهایی که چند بار اندازه‌گیری شدند، با رویه آماری MIXED مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس به‌صورت میانگین حداقل مربعات و انحراف معیار میانگین‌ها گزارش شد. سطح معنی‌داری در (P ≤ 0/05) بیان گردید.

بایندهای مورد استفاده برای کمپلکس یا کیلات با یکدیگر تفاوت دارند، که این عامل ممکن است زیست‌فراهمی را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر همین اساس گزارش شده است که بره‌های تغذیه شده با لیزین روی غلظت بالاتری روی در کبد، کلیه و پانکراس در مقایسه با آن‌هایی که از متیونین روی تغذیه کردند، داشتند (24).

بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر منابع مختلف روی بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و قابلیت هضم در گاوهای شیرده هلشتاین می‌باشد.

مواد و روش‌ها

سی پنج راس گاو هلشتاین شیرده دو شکم زایش کرده و بالاتر در قالب طرح کامل تصادفی استفاده شد. هر یک از دام‌ها به‌صورت تصادفی به یکی از پنج جیره آزمایشی شامل (1) جیره کنترل؛ بدون مکمل روی، (2) جیره همراه با منبع گلایسین روی، (3) جیره همراه با هیدروکسی کلراید روی، (4) جیره همراه با اکسید روی و (5) جیره همراه با سولفات روی اختصاص داده شدند به‌نحوی که هر یک از تیمارهای آزمایشی دارای 7 تکرار بودند.

این آزمایش در قالب 2 فاز صورت گرفت که مدت زمان کامل آن 62 روز بود. بخش اول شامل دوره تخلیه بود؛ طول مدت این بخش 42 روز بوده و حیوانات با جیره فاقد مکمل روی (جیره پایه) تغذیه شدند. بخش دوم شامل دوره نمونه‌گیری بوده که طول مدت آن 20 روز بود و از 5 جیره آزمایشی استفاده گردید (32). حیوانات به‌صورت انفرادی همراه با دسترسی آزاد به آب و خوراک نگهداری شدند. خوراک مصرفی روزانه در دو نوبت توزین شده و در اختیار حیوانات قرار گرفت. جیره پایه در تیمارهای مختلف یکسان بود (جیره شاهد؛ جدول 1-1). سایر گروه‌های تیماری علاوه بر جیره پایه مقدار 1500 میلی‌گرم در روز به‌ازای هر راس مکمل روی از منبع مورد نظر دریافت کردند.

میزان مصرف خوراک به‌صورت انفرادی و روزانه اندازه‌گیری شد و اندازه‌گیری وزن و تعیین BCS در مقیاس 1 تا 5 (38)، در ابتدا و انتهای آزمایش (دو بار) انجام شد. رکورد برداری میزان شیر و نمونه‌گیری از شیر پنج مرتبه در طول دوره نمونه‌گیری صورت گرفت و نمونه‌ها جهت اندازه‌گیری میزان چربی، پروتئین، عنصر روی و شمار

جدول 1- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی

ترکیب	مواد خوراکی مورد استفاده بر اساس درصد ماده خشک
16/75	یونجه خشک
20/47	ذرت سیلو شده
6/14	تفاله چغندر قند
15/37	دانه جو
16/14	دانه ذرت
10/98	کنجاله سویا
1/14	کنجاله گلوتن ذرت
1/16	پودر ماهی
1/49	پودر گوشت
1/73	دانه سویای کامل اکستروود شده
3/2	تخم پنبه کامل
1/57	پودر چربی کلسمی
1/13	سیوس گندم
0/94	مکمل معدنی و ویتامینه ¹
0/31	کربنات کلسمی
0/18	دی کلسمی فسفات
0/94	بی کربنات سدیم
0/12	اکسید منیزیم
0/19	نمک
0/06	توکسین بایندر
1/7	ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی
16/14	انرژی خالص شیردهی (مگا کالری بر کیلوگرم ماده خشک) ⁴
4/84	پروتئین خام (درصد) ³
30/23	چربی خام (درصد) ³
0/98	دیواره سلولی (درصد) ³
0/49	کلسمی (درصد) ³
37	فسفر (درصد) ³
	روی (میلی گرم در هر کیلوگرم) ³

1- کیلوگرم مکمل ویتامینی دارای 750000 واحد بین‌المللی ویتامین A، 200000 واحد بین‌المللی ویتامین D، 4000 واحد بین‌المللی ویتامین E، 400 میلی‌گرم آنتی‌اکسیدان، 150 گرم کلسمیم، 40 گرم فسفر، 40 گرم منیزیم، 60 گرم سدیم، 5000 میلی‌گرم منگنز، 4000 میلی‌گرم آهن، 1500 میلی‌گرم مس، 40 میلی‌گرم کبالت، 60 میلی‌گرم ید، 40 میلی‌گرم سلنیوم.

2- محاسبه شده بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات (19)

3- براساس داده‌های به‌دست آمده در آزمایشگاه

نتایج و بحث

میانگین حداقل مربعات مربوط فراسنجه‌های خون در گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف عنصر روی در جدول شماره 2 ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از منابع مختلف روی تاثیر معنی‌داری بر گلوکز، کلاسترول و تری‌گلیسرید نداشت ($P > 0/10$).

براساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، فراسنجه‌های گلوکز، کلاسترول و تری‌گلیسرید خون گاوها تحت تاثیر جیره‌ها آزمایشی قرار نگرفتند. با در نظر گرفتن این نکته که استفاده از منابع مختلف روی در این پژوهش تاثیر معنی‌داری بر ماده خشک مصرفی و بازده خوراک نداشت که به احتمال می‌تواند دلیلی بر عدم تغییر در شاخص‌های گلوکز، کلاسترول و تری‌گلیسرید باشد. همچنین گزارش شده است که استفاده از منابع مختلف روی (نانو اکسید روی، پروتئینات روی و اکسید روی) در جیره بلدرچین ژاپنی تاثیر معنی‌داری بر کلاسترول و تری‌گلیسرید پلاسما ندارد (8).

استفاده از منابع مختلف روی در تغذیه گاوهای شیری به‌طور معنی‌داری میزان روی موجود در سرم خون را نسبت به گروه شاهد افزایش داد ($P < 0/010$). بر این اساس میزان زیست فرآهمی براساس نسبت وزنی روی سرم، برای منابع گلاسیسینات روی، هیدروکسی کلراید روی و اکسید روی

نسبت به سولفات روی به ترتیب 110/05، 109/55 و 102/80 می‌باشد. همچنین استفاده از منابع گلاسیسینات روی، هیدروکسی کلراید روی، اکسید روی و سولفات روی به ترتیب باعث افزایش 24/84٪، 24/27٪، 16/61٪ و 13/44٪ در میزان روی سرم شدند. مطابق با این نتایج گزارش شده است که استفاده از سولفات روی و متیونین روی موجب افزایش روی موجود در سرم نسبت به گروه کنترل می‌شود (27). همچنین در تحقیق دیگری که توسط اووت و همکاران (21) انجام شد مشاهده شد که استفاده از مکمل روی موجب افزایش میزان روی سرم به میزان 28 درصد می‌شود.

استفاده از منابع مختلف روی تاثیر معنی‌داری بر BCS، تولید شیر، شیر تصحیح شده برای انرژی و شیر تصحیح شده برای چربی نداشت (جدول شماره 3: $P > 0/10$). همچنین درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر، کیلوگرم چربی تولید شده و کیلوگرم پروتئین تولید شده در روز تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفتند ($P > 0/10$). اگرچه استفاده از منابع مختلف روی تاثیر معنی‌داری بر شمار سلول‌های بدنی نداشت، اما میزان این شاخص در دام‌های مصرف کننده گلاسیسینات روی ($P = 0/054$) و هیدروکسی کلراید روی ($P = 0/069$) نسبت به گروه شاهد تمایل به کاهش داشت.

به‌صورت کمپلکس با لایزین (11) و چه به‌صورت کمپلکس با متیونین (31,9) می‌تواند موجب افزایش تولید شیر گردد. همچنین کوپ و همکاران (5) گزارش کردند که استفاده از فرم آلی روی موجب افزایش تولید شیر می‌شود که البته این افزایش تولید شیر، پس از هشت هفته استفاده از مکمل روی مشاهده گردید.

نتایج این پژوهش نشان‌داد که استفاده از منابع مختلف روی تاثیر معنی‌داری بر ترکیب شیر ندارد که در همین راستا گزارش شده است که استفاده از سطوح مختلف و همچنین منابع مختلف روی تاثیر معنی‌داری بر ترکیب شیر ندارد (16,5).

مطابق با این نتایج گزارش شده است که زمان استفاده از میزان برابر با 75 درصد و 100 درصد سطح توصیه‌شده براساس NRC (19) از مکمل روی چه در فرم آلی و چه در فرم غیر آلی تاثیر معنی‌داری بر میزان BCS گاوهای شیری ندارد (18). یوشیدا و همکاران (34) مشاهده کردند که مکمل کردن روی در فرم آلی و ترکیبی از فرم آلی و معدنی تاثیری در افزایش تولید شیر ندارد. همچنین در پژوهش دیگری که توسط سبحانی‌راد و همکاران (27) صورت گرفت مشاهده شد که استفاده از مکمل روی چه به شکل متیونین روی و چه به شکل سولفات روی، تاثیر معنی‌داری بر تولید شیر ندارد. در مقابل در مطالعاتی که توسط سایر محققین صورت گرفته است، بیان شده است که استفاده از فرم آلی روی چه

جدول 2- تاثیر منابع مختلف عنصر روی بر فاکتورهای خون گاوهای شیرده هلشتاین

Table 2. Effects of zinc source on blood parameters in dairy cattle

سطح معنی‌داری	انحراف معیار استاندارد	تیمار					شاهد	صفت
		سولفات روی	اکسید روی	هیدروکسی کلراید روی	گلایسینات روی	گلایسینات روی		
0/973	2/571	50/55	52/03	52/38	52/73	51/65	گلوکز (mg/dl)	
0/893	2/447	142/32	144/68	145/05	143/08	144/92	کلسترول (mg/dl)	
0/847	0/701	12/11	11/64	12/34	11/53	11/35	تری‌گلیسرید (mg/dl)	
0/004	0/055	1/393 ^a	1/432 ^a	1/526 ^a	1/533 ^a	1/228 ^b	روی (µg/mL)	

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار بین تیمارها می‌باشد (P<0/05).

بدنی در گاوهای دریافت‌کننده میزان پایین مکمل روی می‌تواند به دلیل کاهش در عملکرد لوکوسیت‌ها باشد که این شرایط در نتیجه منجر به افزایش حساسیت غدد پستانی به عفونت‌های باکتریایی خواهد شد (25). کاهش میزان سلول‌های بدنی که در نتیجه استفاده از منابع آلی روی اتفاق می‌افتد وابسته به میزان اولیه شمار سلول‌های بدنی است که در شرایط بالاتر از 400 هزار سلول در هر میلی‌لیتر در ابتدای آزمایش رخ می‌دهد (10,7). در مطالعاتی که با میزان SCC کمتر از 150 هزار سلول در هر میلی‌لیتر صورت گرفت، هیچ‌گونه تاثیری در استفاده از فرم آلی منابع روی در کاهش شمار سلول‌های بدنی مشاهده نشد (29,5).

میزان سلول‌های بدنی اگرچه به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر منابع مختلف روی قرار نگرفت ولی در تیمارهای اکسید و سولفات روی به‌طور عددی کمتر از گروه شاهد بود و در تیمارهای هیدروکسی کلراید روی و گلایسینات روی نسبت به گروه کنترل تمایل به کاهش داشت. یکی از دلایل کاهش شمار سلول‌های بدنی می‌تواند به دلیل نقش روی در تشکیل کراتین باشد که پوشش کراتینی کانال سر پستانک، باکتری‌ها را به دام انداخته و از حرکت آنها به سمت غدد پستانی جلوگیری می‌کند (17). کاهش SCC در پی استفاده از مکمل روی همچنین می‌تواند به دلیل بهبود پاسخ‌های سیستم ایمنی سلولی باشد (39). افزایش در میزان شمار سلول‌های

جدول 3- تاثیر منابع مختلف عنصر روی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین

Table 3. Effects of zinc source on milk production and composition in dairy cattle

سطح معنی‌داری	انحراف معیار استاندارد	تیمار					شاهد	صفت
		سولفات روی	اکسید روی	هیدروکسی کلراید روی	گلایسینات روی	گلایسینات روی		
0/611	0/051	3/17	3/23	3/22	3/16	3/26	BCS	
0/606	1/233	40/38	40/86	41/89	41/55	39/28	تولید شیر (kg/d)	
0/611	1/348	39/90	41/09	41/07	41/02	38/67	(kg/d) ECM	
0/670	1/426	40/19	40/94	41/64	41/26	39/00	(kg/d) FCM	
0/931	0/143	3/48	3/49	3/47	3/48	3/62	چربی %	
0/595	0/045	2/99	3/02	2/92	2/97	3/01	پروتئین %	
0/887	0/059	1/40	1/43	1/45	1/43	1/37	چربی Kg	
0/856	0/048	1/19	1/24	1/21	1/24	1/18	پروتئین Kg	
0/312	0/287	4/96	4/96	4/61	4/54	5/42	لگاریتم شمار سلول‌های بدنی	

در مدفوع به‌طور معنی‌داری در گروه‌های مصرف‌کننده مکمل روی بیشتر از گروه شاهد بود (P<0/010). درحالی‌که تفاوتی بین منابع روی مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان‌داد که

میزان ماده خشک مصرفی تفاوت معنی‌داری در بین تیمارهای آزمایشی نداشت (جدول شماره 4: P>0/10). روی موجود در خوراک و میزان روی مصرفی روزانه و روی دفعی

در بدن به طور معنی داری در تیمارهای مصرف کننده منابع مختلف روی بیشتر از گروه شاهد بود ($P < 0/010$). همچنین نتایج نشان داد که استفاده از منابع روی تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و خاکستر ندارد (جدول شماره 5: $P > 0/10$).

میزان جذب روی در دامهای مصرف کننده مکمل روی به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود ($P < 0/010$) و میزان جذب روی در تیمارهای گلایسینات روی و هیدروکسی کلراید روی به طور معنی داری بیشتر از گروه مصرف کننده سولفات روی بود ($P < 0/050$). روی دفعی در شیر به ازای هر لیتر شیر تولیدی، روی دفعی در شیر در روز و روی ابقا شده

جدول 4- تاثیر منابع مختلف عنصر روی بر ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم ظاهری و ابقای روی در گاوهای شیرده هلشتاین
Table 4. Effects of zinc source on apparent absorption and retention in dairy cattle

سطح معنی داری	انحراف معیار استاندارد	تیمار				شاهد	صفت
		سولفات روی	اکسید روی	هیدروکسی کلراید روی	گلایسینات روی		
0/830	0/796	21/281	21/517	21/987	21/405	20/648	ماده خشک مصرفی (kg/d)
0/0001	2/508	108/26 ^a	106/89 ^a	105/92 ^a	107/68 ^a	36/90 ^b	روی موجود در خوراک (mg/kg)
0/0001	29/372	2285/28 ^a	2293/97 ^a	2311/31 ^a	2289/83 ^a	761/90 ^b	روی مصرفی (mg/d)
0/0110	0/254	4/54 ^a	4/75 ^a	4/74 ^a	4/82 ^a	3/61 ^b	روی دفعی در شیر (mg/kg)
0/0258	14/521	182/74 ^a	193/04 ^a	202/07 ^a	200/21 ^a	138/74 ^b	روی دفعی در شیر (mg/d)
0/0001	25/805	1934/93 ^a	1919/74 ^a	1908/19 ^a	1906/91 ^a	606/75 ^b	روی دفعی در مدفوع (mg/d)
0/0001	10/560	350/35 ^b	374/23 ^{ab}	403/12 ^a	382/92 ^a	155/15 ^c	روی جذب شده (mg/d)
0/0001	10/791	167/61 ^a	181/19 ^a	201/05 ^a	182/71 ^a	16/42 ^b	روی ابقا شده (mg/d)

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیمارها می باشد ($P < 0/05$).

جیره کاهش دهد. در پژوهشی که توسط اسپیرز و همکاران (32) صورت گرفت مشاهده شد که استفاده از منابع مختلف مکمل روی موجب افزایش روی دفعی در مدفوع نسبت به گروه شاهد می شود، در حالیکه تفاوتی در بین منابع آلی و معدنی مشاهده نشد که مطابق با نتایج مشاهده شده در تحقیق حاضر می باشد. روی جذب شده در تیمارهای حاوی مکمل روی به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود و در بین جیره های آزمایشی میزان جذب روی در گلایسینات روی و هیدروکسی کلراید روی بیشتر از گروه سولفات روی بود. مشابه با این نتایج، گزارش شده است که میزان جذب ظاهری روی در تلیسه های مصرف کننده گلایسینات روی نسبت به گروه های مصرف کننده سولفات روی و متیونین روی تمایل به افزایش داشت (32). همچنین در پژوهشی که توسط اسپیرز (30) صورت گرفت بیان شد که میزان ابقای ظاهری روی در بره های دچار کمبود روی تغذیه شده با متیونین روی بالاتر از گروه کنترل است.

جذب روده ای عنصر روی به طور عمده در روده کوچک صورت می گیرد (6). در حیواناتی که با کمبود روی مواجه هستند، عنصر روی به راحتی وارد سلول های انتروسیست شده و توسط پروتئین روده ای (CRIP) که غنی از اسید آمینه سیستئین است، از درون سلول ها عبور کرده و وارد جریان خون می شود (19). در حیواناتی که میزان کافی عنصر روی دریافت کرده اند، متالوتیونین، دومین پروتئین سرشار از اسید آمینه سیستئین، موجود در سلول های موکوسی با CRIP برای انتقال روی از درون غشا رقابت می کند. عنصر روی متصل به متالوتیونین در انتروسیست ها باقی خواهد ماند و هنگامی که سلول انتروسیست مرده و کنده شود، عنصر روی متصل به متالوتیونین از طریق مدفوع دفع می شود (4). به وسیله تنظیم پایین یا بالای متالوتیونین در سلول های انتروسیست غشای

گزارش شده است که استفاده از مقادیر 1000 و 2000 میلی گرم در هر کیلوگرم خوراک مکمل سولفات روی موجب افزایش معنی دار در میزان غلظت روی موجود در شیر می شود (15) که موافق با نتایج مشاهده شده در این پژوهش می باشد. در مطالعه ی دیگری هم که توسط سبحانی راد و همکاران (27) انجام شد مشاهده شد که استفاده از سولفات روی و متیونین روی به ترتیب موجب افزایش 50 و 60 درصدی در غلظت روی موجود در شیر شد. در مقابل مطالعات دیگر تفاوتی در میزان روی موجود در شیر در شرایط استفاده از منابع روی مشاهده نکردند (12).

نتایج نشان داده که استفاده از منابع مختلف روی تاثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی ندارد. بیان شده است که استفاده از سطوح 40 تا 65 میلی گرم در هر کیلوگرم مکمل روی تاثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی گاوهای شیرده هلشتاین در طی 14 هفته آزمایش نداشته است (5) که مطابق با نتایج این تحقیق می باشد. همچنین بیان شده است که شکل مکمل روی چه به صورت آلی و چه به صورت معدنی تاثیرات کمی بر ماده خشک مصرفی در گاوهای شیری دارد (14.5). مالکوم-کالیس و همکاران (14) از سطوح 20، 100 و 200 میلی گرم در هر کیلوگرم ماده خشک استفاده کردند و مشاهده کردند که با افزایش سطح روی جیره ماده خشک مصرفی کاهش می یابد. این محققین بیان کردند که احتمالاً به دلیل تاثیر منفی افزایش سطح روی بر خوش خوراکی جیره، میزان ماده خشک مصرفی کاهش می یابد.

بیان شده است که استفاده از شکل آلی مواد معدنی منجر به افزایش زیست فرآهمی شده، و در نتیجه میزان جذب در سیستم هضم روده ای را افزایش می دهد (31). افزایش میزان جذب ماده معدنی از یک سو یا می تواند منجر به بهبود عملکرد و سلامتی شده و یا از سوی دیگر سطح نیاز مکمل روی را در

سطوح کمتری از مکمل روی از منابع گلايسينات روی و هیدروکسی کلراید روی به‌منظور تامین نیاز دام در مقایسه با منابع معدنی اکسید روی و سولفات روی استفاده گردد. همچنین استفاده از منابع روی موجب بهبود کیفیت شیر از طریق افزایش روی موجود در شیر و کاهش شمار سلول‌های بدنی می‌شود.

موکوسی، میزان روی جیره‌ای جذب شده کنترل می‌شود (۳۳).
با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان بیان نمود که منابع گلايسينات روی و هیدروکسی کلراید روی زیست‌فرآهمی بالاتری از منابع معدنی روی دارند و جذب روی در این تیمارها به‌طور معنی‌داری بالاتر از تیمار سولفات بوده که در نتیجه می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که می‌توان از

جدول ۵- تاثیر منابع مختلف عنصر روی بر قابلیت هضم ظاهری در گاوهای شیری

Table 5. Effects of zinc source on apparent digestibility in dairy cattle

سطح معنی‌داری	انحراف معیار استاندارد	تیمار				شاهد	صفت
		سولفات روی	اکسید روی	هیدروکسی کلراید روی	گلايسينات روی		
۰/۹۳۱	۲/۴۵۶	۵۴/۶۶	۵۴/۰۴	۵۲/۳۲	۵۱/۹۹	۵۳/۲۶	قابلیت هضم ماده خشک (%)
۰/۱۸۶۹	۲/۲۹۶	۵۹/۱۷	۵۸/۵۷	۵۶/۵۱	۵۶/۲۲	۵۷/۴۰	قابلیت هضم ماده آلی (%)
۰/۹۴۸	۳/۱۳۲	۲۰/۵۲	۲۳/۷۲	۲۲/۴۸	۲۰/۷۲	۲۱/۷۱	قابلیت هضم خاکستر (%)

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار بین تیمارها می‌باشد ($P < 0.05$).

منابع

1. Ammerman, C.B., D.P. Baker and A.J. Lewis. 1995. Bioavailability of nutrients for animals: Amino acids, minerals, vitamins, Elsevier.
2. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed., Association of Analytical Chemists, Arlington, VA.
3. Campbell, M.H., J.K. Miller and F.N. Schrick. 1999. Effect of additional cobalt, copper, manganese, and zinc on reproduction and milk yield of lactating dairy cows receiving bovine somatotropin. *Journal of Dairy science*, 82(5): 1019-1025.
4. Chesters, J. In: O'Dell B.L. and R. Sunde. 1997. Handbook of Nutritionally Essential Mineral Elements. New York: Marcel Dekker, Inc. 185-231.
5. Cope, C.M., A.M. Mackenzie, D. Wilde and L.A. Sinclair. 2009. Effects of level and form of dietary zinc on dairy cow performance and health. *Journal of Dairy Science*, 92(5): 2128-2135.
6. Flagstad, T. 1976. Lethal trait A 46 in cattle. Intestinal zinc absorption. *Nordisk Veterinaermedicin*, 28(3): 160-169.
7. Hansen, R. 1992. Effects of Bioplex Zinc supplements on somatic cell counts in three high producing dairy herds. *Biotechnol. Feed Ind., Proc. Alltech's 8th Annu. Symp. Nicholasville, KY*, 55-57.
8. Karimi, A., S.K. Hosseini, Z. Nemati and M.R. Sheikhlou. 2018. Effects of different zinc sources on productive performance and egg quality, blood parameters and immune response in Japanese layer quail. *Research on Animal Production*, 9(20): 27-35 (In Persian).
9. Kellogg, D.W., D.J. Tomlinson, M.T. Socha and A.B. Johnson. 2004. Effects of zinc methionine complex on milk production and somatic cell count of dairy cows: Twelve-trial summary. *The Professional Animal Scientist*, 20(4): 295-301.
10. Kinal, S., A. Korniewicz, D. Jamroz, R. Ziemiński and M. Slupczynska. 2005. Dietary effects of zinc, copper and manganese chelates and sulphates on dairy cows. *Journal of Food, Agriculture and Environment*, 3(1): 168-172.
11. Kincaid, R.L. and J.D. Cronrath. 1993. Effects of added dietary fat and amino acids on performance of lactating cows. *Journal of Dairy Science*, 76(6): 1601-1606.
12. Kirchgessner, M., B.R. Paulicks and H. Hagemeyer. 1994. Zinc concentration in the milk of dairy cows supplemented with high-levels of zinc methionine. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 72: 165-167.
13. Kwun, I.S., Y.E. Cho, R.A.R. Lomeda, S.T. Kwon, Y. Kim and J.H. Beattie. 2007. Marginal zinc deficiency in rats decreases leptin expression independently of food intake and corticotrophin-releasing hormone in relation to food intake. *British Journal of Nutrition*, 98(03): 485-489.
14. Malcolm-Callis, K.J., G.C. Duff, S.A. Gunter, E.B. Kegley and D.A. Vermeire. 2000. Effects of supplemental zinc concentration and source on performance, carcass characteristics, and serum values in finishing beef steers. *Journal of Animal Science*, 78(11): 2801-2808.
15. Miller, W.J., H.E. Amos, R.P. Gentry, D.M. Blackmon, R.M. Durrance, C.T. Crowe and M.W. Neathery. 1989. Long-term feeding of high zinc sulfate diets to lactating and gestating dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 72(6): 1499-1508.
16. Neathery, M.W., W.J. Miller, D.M. Blackmon and R.P. Gentry. 1973. Performance and milk zinc from low-zinc intake in Holstein cows. *Journal of Dairy Science*, 56(2): 212-217.

17. Nickerson S.C. 1990. Defense mechanisms of the cow. In Proc. 29th Annu. Mtg., Louisville, KY. 157 pp., Natl. Mastitis Council, Arlington, VA.
18. Nocek, J.E., M.T. Socha and D.J. Tomlinson. 2006. The effect of trace mineral fortification level and source on performance of dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 89(7): 2679-2693.
19. NRC. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle, 7th revised edition. National Academy, Washington, DC.
20. O'Dell, B.L. and P.G. Reeves. 1989. Zinc status and food intake. In *Zinc in human biology*. Springer, London, 173-181.
21. Ott, E.A., W.H. Smith, R.B. Harrington, H.E. Parker and W.M. Beeson. 1966. Zinc toxicity in ruminants. IV. Physiological changes in tissues of beef cattle. *Journal of Animal Science*, 25(2): 432-438.
22. Prasad, A.S. 1995. Zinc: an overview. *Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)*, 11(1 Suppl): 93-99.
23. Rink, L. and H. Kirchner. 2000. Zinc-altered immune function and cytokine production. *The Journal of Nutrition*, 130(5): 1407S-1411S.
24. Rojas, L.X., L.R. McDowell, R.J. Cousins, F.G. Martin, N.S. Wilkinson, A.B. Johnson and J.B. Velasquez. 1995. Relative bioavailability of two organic and two inorganic zinc sources fed to sheep. *Journal of Animal Science*, 73(4): 1202-1207.
25. Sahraei, M and H. Janmohammadi. 2016. Estimation of the relative bioavailability of different zinc sources in broiler chickens fed by semi-purified diets. *Research on Animal Production*, 7(13): 59-49 (In Persian).
26. SAS Institute. 2002. SAS User's Guide: Statistics. Release 9.1.3. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
27. Sobhanirad, S., D. Carlson and R.B. Kashani. 2010. Effect of zinc methionine or zinc sulfate supplementation on milk production and composition of milk in lactating dairy cows. *Biological Trace Element Research*, 136(1): 48-54.
28. Sordillo, L.M., K. Shafer-Weaver and D. DeRosa. 1997. Immunobiology of the mammary gland. *Journal of Dairy Science*, 80(8): 1851-1865.
29. Spain, J.N., B.J. Stevens, D.K. Hardin and J.G. Thorne. 1993. Effects of Bioplex Zinc or zinc oxide on mastitis incidence in lactating dairy cows. *Biotechnol. Feed Ind., Proc. Alltech's 9th Annu. Symp.*, Nicholasville, KY, 53-60.
30. Spears, J.W. 1989. Zinc methionine for ruminants: relative bioavailability of zinc in lambs and effects of growth and performance of growing heifers. *Journal of Animal Science*, 67(3): 835-843.
31. Spears, J.W. 1996. Organic trace minerals in ruminant nutrition. *Animal Feed Science and Technology*, 58(1-2): 151-163.
32. Spears, J.W., P. Schlegel, M.C. Seal and K.E. Lloyd 2004. Bioavailability of zinc from zinc sulfate and different organic zinc sources and their effects on ruminal volatile fatty acid proportions. *Livestock Production Science*, 90(2-3): 211-217.
33. Taylor, C.M., J.R. Bacon, P.J. Aggett and I. Bremner. 1991. Homeostatic regulation of zinc absorption and endogenous losses in zinc-deprived men. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 53(3): 755-763.
34. Uchida, K., P. Mandebvu, C.S. Ballard, C.J. Sniffen and M.P. Carter. 2001. Effect of feeding a combination of zinc, manganese and copper amino acid complexes and cobalt glucoheptonate on performance of early lactation high producing dairy cows. *Animal Feed Science and Technology*, 93(3-4): 193-203.
35. Van Keulen, J. and B.A. Young. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. *Journal of Animal Science*, 44(2): 282-287.
36. Wedekind, K.J., A.E. Hortin and D.H. Baker. 1992. Methodology for assessing zinc bioavailability: efficacy estimates for zinc-methionine, zinc sulfate and zinc oxide. *Journal of Animal Science*, 70(1): 178-187.
37. Whitaker, D.A., H.F. Eayres, K. Aitchison and J.M. Kelly. 1997. No effect of a dietary zinc proteinate on clinical mastitis, infection rate, recovery rate and somatic cell count in dairy cows. *The Veterinary Journal*, 153(2): 197-203.
38. Wildman, E.E., G.M. Jones, P.E. Wagner, R.L. Boman, Jr.H.F. Troutt and T.N. Lesch. 1982. A dairy cow body condition scoring system and its relationship to selected production characteristics. *Journal of Dairy Science*, 65(3): 495-501.
39. Wirth, J.J., P.J. Fraker and F. Kierszenbaum. 1984. Changes in the levels of marker expression by mononuclear phagocytes in zinc-deficient mice. *The Journal of Nutrition*, 114(10): 1826-1833.

Effects of Zinc Sources on Bioavailability, Production Performance, and Digestibility in Early Lactation of Holstein Dairy Cows

Mehdi Nematpour¹, Kamran Rezayazdi², Mehdi Ganj khanlou² and Armin Towhidi³

-
- 1- Ph.D. student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2- Associate Professors, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
(Corresponding author: rezayazdi@ut.ac.ir)
3- Associate Professors, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
4- Professors, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Received: October 18, 2019 Accepted: January 13, 2020
-

Abstract

Thirty multiparous Holstein dairy cows used to aim the investigation of the effects of zinc from different sources on bioavailability, production performance, and digestibility. Dairy cows in a complete randomized design randomly allocated to one of five dietary treatments that consist of 1) control (no supplement Zn), 2) Zn glycine complex (ZnGly), 3) Zn Hydroxychloride (ZnHcl), 4) Zn oxide (ZnO), 5) Zn sulfate (ZnSO₄). The result indicated that different sources of zinc had not affected glucose, cholesterol and triglyceride ($P>0.10$). The used of different sources of zinc significantly increased of serum zinc to compare control ($P<0.010$). Results showed that, BCS, milk, energy-corrected milk, fat-corrected milk yield and milk yield composition in dairy cows were not significantly affected by Zn source ($P>0.10$). Somatic cell count tended to decrease in ZnGly ($P=0.096$) and ZnHcl ($P=0.073$) in compare of control group. Dry matter intake was not different between treatment ($P>0.10$). Daily zinc intake, fecal zinc, the zinc concentration in milk per liter/or day, the zinc concentration in milk per liter/or day, apparent absorption and retention of zinc significantly were higher in zinc supplemented group in compare of control ($P<0.010$). Also, the used of different sources of zinc had not significantly affected on digestibility of dry matter, organic matter, and Ash ($P>0.10$). Therefore, the results of this study suggested that used of zinc sources in dairy cows diet ZnGly and ZnHcl have higher bioavailability than inorganic sources of zinc and also might improve milk quality throw decrease of somatic cell count.

Keywords: Zinc, Bioavailability, Production Performance, Digestibility, Dairy Cows